





V III
REPERTO
PRONOST
ET
HIPPOCRA
LIBELLUS
109
INCUNABULI
L
7
45
Biblioteca Nazionale
Centrale - Firenze
VENETIIS
1485











Opuſculũ repertorij pronoſticon in mutationes aeris tam via aſtrologica q̃z metheorologica vti ſapiẽtes experientia comperientes voluerunt pq̃z vtiliſſime ordinatũ incipit ſidere felici ⁊ primo prohemiũ.



Um ĩ multis voluminibus ſapientes antiqui de mutationibus aeris multa ſcripta fecerunt ⁊ diuerſimode de hac materia tractauerũt: Quidã enĩ cũ alijs a ꝓpoſito extraneis cõmiſcendo: Alij vo tractatus ſpeciales ꝓlixos tñ ⁊ obſcuros ſuper hoc faciẽdo: Alij autẽ tantũmodo recitando nullũ tñ auctoris a quo dicta ſua acceperunt allegando. Quia etiaz qui voluerit aliquid iudicare: durũ ẽ tot libros inſpicere: totienſq; verba obſcura ſm ſuum intellectum exponere. Auctores etiã ſi videant̃ diſcordes concordare: aut illa que faciũt ad ſuũ ꝓpoſitũ ab alijs ſeparare: ꝓpter que dicta auctorũ ſpecialiter in iſtis ꝑtibus remanent in exꝑta. Ideo cõſideraui ꝓ bono ſnias: aut dicta auctorũ que faciunt ad ꝓpoſitũ noſtrũ: eoſq; ſi diſcordes videant̃ ſm ꝑ poſſe cõcordare atq; libros ⁊ capitula quorũ verba aut ſententiã recitabo fideliter allegare: ut ſi aliquis mihi nõ crediderit: aut in ꝓpoſitionib⁹ in hoc repertorio poſitis addere uel minuere voluerit ad libros de quibus me iuuare intendo facilius poſſit recurrere. Utilitas autem operis in hoc cõſiſtit ut videlicet abſq; pluriũ librorũ inſpectiõe ſnias pluriũ doctorũ facili⁹ ⁊ citius poſſum⁹ ad inuicẽ compare: ⁊ collatione facta ad inuicẽ ad minus illa in quib⁹ magis cõcordare videbunt̃ tꝑib⁹ ⁊ climatib⁹ noſtris ꝑ exꝑientiã certã cõprobent̃ ⁊ approbent̃ ſi approbanda fuerint: uel ſm exigentiã exꝑientie exponantur. Aut ſi iſto tꝑe aut climate inutilia vi-



deanť qui de hac arte se intromittēt alias in suis iudicijs nō decipianť: libri enim plures de quibus nos iuuare intendim⁹ in alijs temporibus ꝛ climatibus facti sunt. Ideo certū est ꝙ nō easdem dispositiones debemus habere tam ꝑpter mutationem octaue sphere ꝛ aliarū que vix uel nunꝗ poterint similia redire: ꝗ etiā ꝑpter diuersitatē climatū in quib⁹ eadem constellatio contrarios effectus nitiť operari. ¶ Hui⁹ autē operis septē sunt partes principales ¶ Prima pars est quasi introductoria sequentiū partiū: ꝛ est de naturis partiū celi ꝛ stellarū: quattuor etiā tēporū anni ꝛ climatū atqꝫ ꝓuintiaꝝ terre. ¶ Secūda pars est de iudicijs vniuersalibus mutationū aeris ꝑ cōiunctiones magnas ꝛ eclypses: ꝛ ꝑ introitū solis in punctis equinoctialibus ꝛ solstitialib⁹ ꝛ locis alijs determinatis in zodiaco signoruꝫ. ¶ Tertia est de iudicijs vniuersalibus mutationū aeris ꝑ cōiunctiones ꝛ oppositiones luminariū. ¶ Quarta pars est de iudicijs particularib⁹ que nō solū fiunt ꝑ cōiunctiones ꝛ oppositiones luminariū sꝫ etiā ꝑ alias figuras particulares. ¶ Quinta ps est de iudicijs mutationū aeris ꝑ cōiunctiones ꝛ aspectus lune cū alijs stellis: ꝛ aliarū stellarū ad inuicē ꝛ de presentia lune ꝛ aliorum a sole in certis locis zodiaci. ¶ Sexta pars est de hora pluuie ꝛ vbi ꝛ quādo fortior ꝛ debilior fuerit: ꝛ que sint loca apta ad hoc ꝛ de duratione eiusdē. ¶ Septima pars est de mutatione aeris ꝑ signalia suꝑiora que per methauroꝝ scientiā habent cognosci. ꝛ quedā alia signalia vulgariter approbata.

¶ Prima pars libri que est quasi introductoria sequentiū de naturis partiū celi ꝛ stellarū quattuor temporū anni climatū atqꝫ prouinciarū terre incipit feliciter.

Capitulū primū de naturis ꝛ ꝓprietatibus vniuersalibus signorū ꝛ stellarum.



Dodecim sunt signa quorū qualitates vniuersaliores ꝛ nature vniuersales ſm ꝙ sol operať in quolibet eorum ꝛ intensio seu remissio eiusdeꝫ nature ꝓueniens ex ꝑpatiōib⁹ cōib⁹ stellarū fixarū existentiū tempore Ptolemei in partib⁹ predictorum signorū ſm longitudinem ꝛ latitudinem patent ꝑ hanc tabulam.

Signa	Qualitates	Nature vniuersales	Prime partes
Aries ♈	Igneus	facit ful/ gura ꝛ to nitrua.	pluuiose ventose
Taurus ♉	Terreus	duas cōple riōes hꝫ pa rū calidi sic hu. eq̄liter vicit tñ ca^m	motus ter/ re venti nu/ bes mercu/ riales.
Gemini ♊	Aerei	facit tēpe/ rantiam de nā ionis.	humide cor rñdentes sa turni.
Cancer ♋	Aquaticꝰ	serenū calidum	calide terre motus ♂ ꝛ parū ♄
Leo ♌	Igneus	calidū hu. corrñdet so lari.	calidū cor/ rñdet mor. ☉ ꝛ ♂.
Uirgo ♍	Terrea	humectat ꝛ tonat ☿ cum ♀.	maioris ca/ loris dāno/ se martis.
Libra ♎	Aerea	mutans ꝛ cambiens	tēperate io uis ꝛ veneri
Scorpius ♏	Aquaticus	igneus ꝛ to nitruosus martis	grandinosꝰ pncipiū tñ ē siccū satni
Sagictariꝰ ♐	Igneus	vētosꝰ mer curij cū ioue	humectātes veneris
Capricornꝰ ♑	Terreus	multū hu/ midum	cōburentes dānose martis
Aquarius ♒	Aereus	frigidum aquosum	multū hu mide lune
Pisces ♓	Aquatici	frigidū ventosū	temperate veneris.

	2ͤ ptes	3ͤ ptes	ſeptētrionales	meridionales	
♈	Tpate iouis ꝛ veneris	faciet mortalitatē martis putrefcōe	calefcunt martis	infrigidant ſaturnine	
♉	frigide ꝛ humide veneris	igne⁹ corruptionē ♂	Tēperate iouis	motus fortes mercurij cū ſaẗ	no
♊	Tpate iouis	ꝯmixte mercurij directi	vent⁹ terremotus mercurij	ignee cōburētes martis	
♋	Tpate iouis	vētoſe mercurij cū ♄	ignee cōburētes martis	ignee cōburētes martis	
♌	Tpate iouis	multū humide corrūpētes ſaturni	cōburentes martis	humectantes mercurij cum venere.	
♍	Tpate iouis	aquoſe ſaturni	ventoſe mercurij	Temperate iouis	
♎	Tpate iouis	aquoſe lune ꝛ ſaturni	vētoſe mercurij cū ioue	humectantes ſaturni	
♏	Tpate iouis	terremot⁹ mercurij	cōburentes martis	humectantes ſaturni	
♐	Tpate iouis	ignite martis	ventoſ⁹ cū ☿ ꝛ ♄	multū hūide ſaturni i loco humido	
♑	Tpate iouis	mouentes pluuias lūe ꝛ mercurij	multū hūide dānoſe in loco aquoſo	multū hūide dānoſe ſaẗni i loco aquoſo	
♒	Tpate veneris	facit vētos mercurij	cōburentes martis	facit grandinem ſaturni	
♓	multū humide lūe	cōburētes martis	ventoſe iouis	aquoſe lune i loco aquoſo	


Duodecim signa sunt &c. Hec pticula nō est nisi suptitul' tabule precedentis. Qualitates autē signorū vniuersaliores que versus sinistrā ponunt q̄si ab oib' auctorib' de iudicijs conceduntur. totū autem residuū tabule fruimur a Ptolemeo & Haly eius cōmentatore in secūdo capitulo secūde ptis quadripartiti sui ita q natura illius signi uel ptis eius ponit superius fm Ptolemeū. & nature stellarū fixarū que erant tpe Ptolemei ut dicit haly in illis partibus ponunt inferius fm haly. Itē ab haomar hoc idem habet quod a ptolemeo: accipit a leopaldo etiā vnde qlibet istorū fecit vnū capitulū de signorū naturis s3 totū sum pserūt a Ptolemeo nec est ibi credo discordia. ¶ Notandū fm haly vbi supra q debemus scire ppietates locorū in quibus coniunctiones uel oppositiones: uel in quibus fuerit planeta predominās: & alia ptinentia ad gubernationē pmiscendo cum virtute planete dn̄antis & cum sole & luna & alijs multis ad hoc requisitis: ut inde cognoscam' virtutem vincentē: & ad hoc est hec tabula vtilis valde. Unde sciendū q cū ppietatib' vniuersalib' signorū potes addere naturas stellarum que sūt tēpore moderno i illis signis si natura eorū fuerit cōsimilis: uel minuere si dissimilis. ¶ Item sciendū q stelle fixe que erāt tpe Ptolemei q fecit librum almagesti nō cōcordant cū stellis quas recitauit Haly fore in predictis partib' signorū tpe Ptolemei qui fecit quadriptitū. & hoc est argumentū q fuerint duo quorū qlibet vocabat Ptoleme' fm opinionē Albumazaris in introductorio suo magno. q̄re ad hoc & solue illud dubiū. ¶ Itē nota fm haly vbi supra q signa sunt que nō habent opera. opera eni sūt stellarū fixarū q̄ sūt in eis. & noiat qdlibet eorū fm q sol opat in eo. Potest etiā dici q signū accipit nomen a stellis fixis i eo existentib' qr valde diu manēt ibi. ¶ Itē illa que p pdictā tabulā habent dicū tur fm q fuerit tpe Ptolemei. oportet igit iudicia mutare qr stelle fixe iā mutauerūt loca. patet igit fm haly q qdlibet signū & sue partes recipiunt a sole & a stellis fixis virtutem cū qua operant virtutes solis & stellarū fixarū. ¶ Item haly dicit ibidem q pleiades erant tpe Ptolemei in primis gradibus tauri. tempore autē suo in medio tauri erāt. ¶ Itē notandū fm haly vbi supra q totū signū habere talē uel talē ppietatē. hoc intelligit dupliciter. vno mō q recipiat a sole vtutē q̄ ɔcordat cū suo ope cū sol illud signū ingredit. Alio mō q recipiat ab oib' stell' fixis i eo existētib' vim vnā q̄ ɔcordat cum ɔplexiōe que fit p cōmixtionē omniū stellarū illarum. Primū tamen est cōuenientius dictis Ptolemei. hec haly. Et ego dico q intentio ptolemei fuit q proprietates signorum in proposito accipiūtur fm q sol operatur in eis. Primo qr hoc magis

duo p(t)

facit ad sciendū factum anni quod est intentū principale Ptolemei in ꝓposito. Secūdo qꝛ ipse dicit ꝙ ꝓprietas arietis est facere tonitrua qꝛ equinoctiū fit in eo. Equinoctiū autē fit per solem ꝛ nō ꝑ stellas fixas. Tertio ipse dicit ꝙ nature partiū arietis in addendo uel minuendo fiūt ꝑ stellas fixas que sunt in eis. ¶ Patet igiť ꝙ signa none sphere q̄uis ꝑ se sint mansiones nō habentes opa: tñ attribuimus eis opera ſm ꝙ sol opať in eis diuersimode ꝓpter diuersitates situs ꝛ ſm ꝙ sol inuenit materiā preiacentē aliter dispositā a temporibus ꝑcedentibus. vnde aliaꝫ ꝓprietatē attribuim⁹ virgini q̄ꝫ arieti q̄uis sitū cōsimilē habeat: qꝛ alio modo sol iuenit elementa disposita ab estate q̄ꝫ ab hyeme. Et ex his satis patet qualiť in ꝓposito fiāt iudicia scꝫ vtrū ſm nonā spherā uel octauam. Patet etiā ꝙ sol in eodē signo nō operať similiter in oībus climatibus. ¶ Itē stelle fixe que erāt tpe Ptolemei in principio alicui⁹ signi sunt modo. s. anno dñi. 1338. vltra mediū eiusdē signi: ideo forsan non easdeꝫ experientias haberem⁹ de virtute solis ꝑ signa sicut Ptolemeus ꝓpter aliam mixtionē stellarū fixarū cū virtute solis nūc ꝛ tūc. ¶ Intelligendū est tñ ꝙ virtus que attribuiť alicui signo habet magnā latitudinem ita ꝙ ſm naturas stellarū fixarū intendiť uel remittiť non tñ oīno corrūpiť. ꝛ sic remanet sñia Ptolemei vtilis valde: dum tamen acuitas tui intellectus possit ad hoc sufficere. ¶ Modū autē ꝑ quem poteris te iuuare de tabula prehabita inferius te docebo. Iteꝫ iuuamentū quod possum⁹ habere ex stellis versus septētrionē uel versus austrū fit ſm ꝙ dicit haly vbi supra qñ accidit pars eclypsis aut latitudo lune tpe cōiunctionis uel oppositionis uel planete dñantis versus septētrionē uel austrum cōmiscebiť eis virtus stellarū fixarū que sūt versus illā. Itē intelligendū ſm haly ꝙ qñ diciť talis est tēperata intelligiť hoc ſm ꝙ caliditas ꝛ frigiditas cōuenit tpi ſm naturā.

Capitulū secundū de. 28. mansionibus lune.

Mansiones lune sūt. 28. ꝛ noīa eorū atqꝫ gradus none sphere i quibus incipiunt. patent ꝑ tabulam sequentem.

¶ Mansiones lune ꝛc̄. Hec tabula trahitur ex dictis Alkindi in libello suo de pluujs capitulo sexto ꝛ ponit ibi nomina nō latina. Item idem de hac materia in eodem libro in illo capitulo: Cū substantia veneris ꝛc̄. Item hyspalensis in illo capitulo Indi distribuūt circulum ꝛc̄. Item Japhar in libello suo de pluuijs versus principiū. Item abraham de seculo in illo capitulo Sapiens quidem indorū ꝛc̄. Item plures alij. ¶ Notandū ꝙ auctores ut in pluribus concordāt in numero ꝛ in qualitatibus mansionū. Unde si discordauerint in qualitatibus

mansionū lune.

Numerus	Noia ſtellarū latina	q̄litates	Initia ſm ali q̊s q̊ ad g̃d⁹.9ᵉ ſphere	Initia ſʒ byſ. ad g̃d⁹ 9ᵉ ſphē reg̃du ctis.	Initia ſʒ abra hā de ſe culo ad g̃d⁹ 9ᵉ ſphere reduct]
1	Cornua arietis	c.b.	1 ♈	24 ♈	16 ♈
2	venter arietis	.ſ.	13 ♈	6 ♉	28 ♈
3	Caput tauri	c.b.	26 ♈	19 ♉	14 ♉
4	Oculus tauri	b.c.	9 ♉	2 ♊	21 ♉
5	Caput canis	l.c.	22 ♉	15 ♊	7 ♊
6	ſid⁹ puū luc] magne	c.b.	5 ♊	28 ♊	20 ♊
7	Brachiū leonis	b.	18 ♊	11 ♋	2 ♋
8	Nebuloſa	c.	1 ♋	24 ♋	16 ♋
9	Oculus leonis	ſ.	13 ♋	6 ♌	28 ♋
10	Frons leonis	b.	26 ♋	19 ♌	11 ♌
11	Capillus	c.	9 ♌	2 ♍	24 ♌
12	Cauda leonis	b.	22 ♌	15 ♍	7 ♍
13	Canis	c.	5 ♍	28 ♍	20 ♍
14	Spica	c.	18 ♍	11 ♎	3 ♎
15	Cooperta	b.	1 ♎	24 ♎	16 ♎
16	Cornua ſcorpiōis	b.c.	13 ♎	6 ♏	28 ♎
17	Corona ſup caput	b.c.	26 ♎	18 ♏	11 ♏
18	Cor ſcorpionis	f.	9 ♏	2 ♐	24 ♏
19	Cauda ſcorpionis	b	22 ♏	15 ♐	7 ♐
20	Trabs	c.b.	5 ♐	28 ♐	20 ♐
21	Deſertum	c.b.	18 ♐	11 ♑	3 ♑
22	Paſtor	c.b.	1 ♑	24 ♑	16 ♑
23	Glutiens	c.	13 ♑	6 ♒	28 ♑
24	Fortune ſidus	c.l.	26 ♑	19 ♒	11 ♒
25	Papilio	f.	9 ♒	2 ♓	24 ♒
26	Hauriens prim⁹	l.b.	22 ♒	15 ♓	7 ♓
27	Hauriens ſecūdus	b.	5 ♓	28 ♈	20 ♓
28	Piſces	c.b.	18 ♓	11 ♈	3 ♈

hoc nō ē nisi ex vitio scriptoris: ꝛ ideo accepi illā qualitatē i quā plures vidi cōcordare: ita ꝙ tractata humida discordāt tñ i noībus: qꝛ quidā nominant eas in greco. Alij in arabico. Alij vo in latino: sꝫ nō est magna vis ad pñs. Ubi autē debem⁹ inchoare videt etiā discordia fm ꝙ pꝫ ꝑ tabulā. Dico tñ ꝙ oēs debent cōcordare in principijs mansionū: qꝛ si vnus inceperit a principio arietis none sphere. Alter a principio arietis octaue nō essent ita cōcordes in qualitatib⁹ sicut sūt. ꝛ oēs hoc acceperunt ab indis. ¶ Uidet tñ ꝙ hyspalēsis incipiat a duob⁹ siderib⁹ magnis q̄ cornua arietꝭ dicunt: quarū prima ē nūc i. 24. gradu arietꝭ none sphere fm ꝙ intellexit ex dictis indorū ꝛ vnaqueqꝫ est. 13. gradus ꝛ. 3ᵉ vni⁹ gradus ut dicit. Et ꝙ oēs alij etiā tantā qualitatē cuilibet mansioni attribuunt. Sꝫ ista cōputatio nō diuidit totū celū in. 28. partes equales: ꝛ ideo dico quēadmodū dicit abrahā de seculo. s. ꝙ quelibet mansio cōtinet. 12. gradus ꝛ. 52. minuta fere ita debet esse. 13. grad⁹ ꝛ. 51. minuta. Ipse etiā incipit cōputationē ꝑ. 8. grad⁹ ante cornua arietis sicut patet in tabula: qꝛ imago arietis ē ꝑua. hoc dicit expresse q̄uis dicat postea quō inueniat in qua mansione luna sit valde obscure. nec bene videnf sua dicta ibi cōcordare cū p̄dictis: ꝛ ideo nō indiget ibi expositiōe ¶ Uidet quibusdā modernis ꝙ debeam⁹ incipere a principio gradus primi arietis. i. a primo gradu arietꝭ none sphere. sꝫ nō videt cū noient fm stellas fixas que sūt ibi. Alij etiā volūt ꝙ incipiūt a principio octaue sphere vnde planete ꝛ luna solēt calculari ad octauā spherā. Et dicunt ꝙ iudicia a formato astronomo poti⁹ fiunt fm eā q̄ꝫ fm nonaꝫ. Et ego dico ꝙ nō sufficit eo ꝙ motus octaue sphere quē ipsi dicūt nō ē nisi correctio sua ad equationē sicut solebat distare loc⁹ solis inuent⁹ ꝑ instrumenta ꝑ. 8. grad⁹ a loco eius inuento ꝑ suas tabulas. ideo dicebant ꝙ hoc est ꝑpter motū octaue ꝛc̄. sicut debet videri in canonib⁹ tabularū ¶ Dico igit ꝙ debem⁹ incipere sicut dicit abrahā. s. ꝑ. 8. gradus añ cornua arietis. si eni inciperem⁹ a linea equalitatis. cornua arietis nō eēnt in prima mansione imo vltra mediū secūde. nec aldebaran i q̄rta sꝫ vltra mediū quinte. nec cornua scorpionis in. 16ᵃ sꝫ vltra mediū. 19ᵉ. Itē si inciperem⁹ in cornib⁹ arietis aldebaran esset in fine tertie ꝛ nō in q̄rta ꝛ cor scorpionis in fine. 18ᵉ ꝛ nō in. 18ᵃ. Si tñ incipiam⁹ ꝑ. 8. grad⁹ ante cornua arietis erūt versus mediū prime ꝛ aldebaran versus mediū q̄rte ꝛ cor scorpionis versus mediū. 18ᵉ sicut debēt inueniri. Alia incōuenientia sūt fm ꝙ id a quo mansio accipit denoīationē sit extra mansionē quā denoīant. ¶ Notandū ꝙ Iaphar versus principiū vbi facit mētionē de mansionib⁹ ꝙ qualitates ꝑueniūt ex natura stellarū in eisdem situatarū ꝛ ex stellarū dignitatib⁹ ꝛ ex radiorū fm fortes aspect⁹ in eis

dem locis piectionib⁹. ¶ Itē notandū fm albumazar in capitulo 2.° se-
cūde differentie primi tractat⁹ sui magni introductorij q multe gentiū
sciūt qcqd euenit in dieb⁹ ex calore uel frigore ventis ꝛ pluuijs ex pñtia
lune in vnaquaqꝫ. 28. mansionū. ꝛ cuꝫ viderint vnāquāqꝫ mansionū in
occidente mane. dicūt q aer mutabit p ventū pluuiā uel calorē ul' frig⁹
¶ Sciendū q Iapbar recitat q̄liter antiq nō ponebāt nisi. 27. mansio-
nes q̄ cōputabāt. 13. grad⁹ ꝛ tertiā vni⁹ p vna mansione ꝛ alij. 29. ꝛc̄. sꝫ
nō est hoc multū vtile nec est opinio sua ut dicit. dicit tn̄ postea q vna-
queqꝫ mansionū est ex. 13. gradib⁹ ꝛ. 3ᵃ vni⁹. ꝛ debet incipi cōputatio a
primo puncto arietis: sꝫ nō dicit cui⁹ arietis none videlicet uel octaue.
Ideo si volueris scire q̄ opinio sit melior ꝛ verior: oportet q p longam
expientiā hoc exptus sis. Qualiter aūt hoc sit experiendū videbit in pra-
cticis postea. ¶ Itē querit q̄re hec ptitio poti⁹ sit p. 28. q̄ꝫ p aliū numerū
ꝛ dico q hec potuit esse cā: q̄ iste numer⁹ est ppinquius dieb⁹ pagratio-
nis lune p zodiacū. sicut diuidim⁹ zodiacū in. 360. q̄ est numer⁹ abun-
dans ppinquius numero dierū pagratiōis solis p zodiacum.

Capitulū tertiū de signis pluuiosis.



Itē signa pluuiosa sūt cancer leo scorpio sagictari⁹ aqua-
rius pisces. ptes autē signorū q̄ potissime dicunt humide
sūt finis arietis. principiū tauri. finis capricorni. princi-
piū aquarij. principiū leonis. Signa aūt pauca p imbriū
sūt taurus pter ei⁹ princip iū: gemini virgo libra. Itē ca-
pricorn⁹ plus habet frigoris ꝛ siccitatis q̄ꝫ pluuie. ¶ Itē
signa pluuiosa ꝛc̄. Hec pticula extrahit a quodā libro de pluuijs q inci-
pit Cū multa in duob⁹ locis ꝛc̄. Itē haomar in vltimo ca.° Itē alkindus
in vltimo ca.° Itē hyspalensis in ca.° volēs scire. Itē Leopaldus i duob⁹
locis. Itē q vn⁹ accepit ab alio qn̄qꝫ id quidē dicit. Itē abrahā de secu-
lo in ca.° Dicit iacob. ¶ Notādū q ille auctor cui⁹ liber incipit Cū mul-
ta. enumerat capricornū inter signa pluuiosa: ꝛ postea dicit q plus ha-
bet frigoris ꝛ siccitatis q̄ꝫ pluuie. hoc exponit: q̄ cum luna in locis alijs
pluuiosis applicans veneri significet pluuias q̄uis nō ita fortit si ven⁹
nō sit in locis pluuiosis. tn̄ luna nō facit in capricorno pluuias nisi stel-
las in loco aquarū inspiciat. ꝛ cū luna ꝛ mars in capricorno aspiciunt
venerē ꝛ mercuriū. tūc eni nō obstāte marte pluuias sigret. In alijs aūt
signis pluuiosis nō ita apparet effectus resecatiōis luminis sicut intel-
ligo, istū auctorem. ¶ Item sciendū fm istum auctorē ꝛ alios qui etiaꝫ
hoc recitant q piscis est signum pluuiosum propter riuos quos habet
ꝛ flumina: ꝛ sagictarius etiam pter maria que in eius extremo existūt

⁊ scorpio propter sua loca ⁊ littora. hoc potest exponi. s. q istud signa habent ista in suis cõstellationib⁹ figurata. uel sic q ista signa habẽt mai⁹ dominiũ in locis terre aquosis sicut maria ⁊c. ¶ Sciendũ haomar dicit q pcipue aquarius ⁊ leo sunt aquatica. ⁊ hyspalensis dicit signa pluuie ⁊ signatiua aque sũt aquarius. finis capricorni aries taurus leo. his fortiora piscis aquarius scorpio. Alkindus dicit q loca pluuiosa sunt aquarius finis capricorni arietis ⁊ tauri principium leonis: ⁊ amplius illis scorpi⁹ piscis ⁊ aquarius ita q hysaplẽsis ab alkindo hoc accepit. ¶ Item abrahaz de seculo dicit q signũ aquarij significat aquas ꝑpter stellas que effusor appellanẽ. Similiter etiã signum leonis ꝑpter figuram nauis que in eo existit. ¶ Dubitaẽ vtrũ iste nature signorũ debeantur signis octaue uel none sphere: ⁊ videẽ q in nona quia dom⁹ capiuntur in nona. ⁊ ille auctor Cũ multa ⁊c. dicit vtraqꝫ domus saturni ẽ pluuiosa ⁊c. oppositum patet: quia causa quare sũt pluuiosa est ꝑpter stellas fixas que sunt in eis ut dictum est. Stelle autem fixe sunt in octaua quere de hoc.

Capitulũ quartũ de mutatione signorũ nature.

Item nature signorum mutanẽ ꝑpter motus eorũ in circũferentia quia eorũ calidum efficitur frigidum ⁊ humidum siccũ. Taurus in oriente est tepidus: in occidẽte frigidus. Gemini est in oriente calidus ⁊ siccus: in occidente frigidus ⁊ humidus. Cancer in oriente calid⁹ ⁊ siccus in occidente frigidus ⁊ humidus. Leo est in oriente calidus ⁊ siccus. in occidente frigidus ⁊ humidus. Uirgo in oriente calida ⁊ tepida. in occidente frigida ⁊ humida. Sagictarius in oriente frigidus ⁊ humidus. in occidente calidus ⁊ siccus. Capricornus in oriente frigidus ⁊ siccus. in occidente frigidus ⁊ humidus. Aquarius in oriente ⁊ piscis ambo sunt in oriente frigidi ⁊ sicci: ⁊ in occidẽte frigidi ⁊ humidi ⁊c. ¶ Item nature signorum ⁊c. hec habenẽ in libro haly abenragel capitulo primo prime partis. hoc etiam exponitur sic verbi gratia: Sole existente in aliquo signorũ que sunt calida in oriente ⁊ occidente frigida. si fuerit significatio sup caliditatem plus apparebit illa die calor in mane q̃ʒ vespere ceteris paribus ⁊ sic de alijs. uel sic. Quando significatores temporũ fuerint in aliquo signo qđ fuerit calidũ in oriẽte ⁊ frididũ in occidente si significauerũt caliditatẽ prius apparebit effectus in partibus terre versus orientem q̃ʒ versus occidentem. ſm vero econuerso frigiditatem fiet econuerso. Uel sic. Si aliquod signum esset in oriente hora coniunctionis uel oppositionis uel alijs temporibus

significationũ: magis apparebit effectus caliditatis si fuerit calidus in oriente ꝛ frigiditatis in occidente ꝙ si esset i alia domo. s. in parte occidentali ꝛ sic de alijs. Primi autem duo modi magis mihi videnť ad ꝓpositum. ¶ Item sciendũ ꝙ nõ facit mentionẽ de ariete ꝛc̃. qꝛ forte effectus eorũ nõ sunt ita fortes uel inuariabiles uel qꝛ non habemus librum correctũ.

Capitulũ quintum de dignitatibus planetarũ.



Ignitates essentiales planetarũ ꝛ quis eorũ sit almutez in vnaquaqꝫ partiũ celi atqꝫ vent⁹ triplicitatis cuiuslibet s. signi patent ex tabula sequẽti. ¶ Dignitates essentiales ꝛc̃. hoc est titulus tabule dignitatũ essentialiũ: ꝛ extrahiť ex itroductorio Alchabicij: ex quadripartito Ptolemei in. 18º. 19º. 20º. 21º. 22º. capitulis prime partis: ex quinto tractatu introductorij magni quasi ꝑ totum: ꝛ ẜm plures alios. Tabulam autẽ almutez cõposui ꝑ computationẽ pluriũ dignitatũ ẜm ꝙ domin⁹ domus habet quinqꝫ fortitudines: exaltationis quattuor: triplicitatis tres: termini duas: faciei vnã. Tabulam autẽ ventorũ ẜm Ptolemeum extraxi ex dictis Ptolemei ꝛ Haly. 19º. capitulo prime ꝑtis quadripartiti: tabulã aũt ẜm Albumazar ex. 27ª differentia sexti tractat⁹ sui magni introductorij. Tabulã autẽ ẜm Japhar accepi ex libro Japhar de pluuijs in fine libri in parte que incipit: Aut occurrit. ¶ Sciendũ ꝙ Ptolemeus posuit totũ arietẽ ꝓ exaltatione solis ꝛ sic de alijs. Alij autẽ plures ponũt exaltationes planetarũ in determinatis gradib⁹ illorũ signorũ. ¶ Item dñi triplicitatũ que supius ponunť ad modum glose interlinearis ẜm opinionẽ Ptolemei sicut ꝛ illud qđ directe scribiť ẜm alios. Item termini egyptiorũ a plurib⁹ approbanť ꝛ ꝓpter hoc tm̃ ponunť. ¶ Item magna est discordia in situationib⁹ ventorũ. quere de hoc inferius vbi facit mentionẽ de planetarũ ventis ꝛ de qualitatibus habitationũ. ¶ Sciendũ ẜm quendã de imaginib⁹ ꝙ quando aliqua triplicitas ꝛ eius dñi sunt fortes ꝛ incipit ventus illi⁹ triplicitatis flare ille ventus est durabilis. Si autẽ inceperit illis existentib⁹ debilib⁹ nõ durabit. Item qualitates ventorũ sunt ẜm qualitates locorũ a quibus veniunt ẜm ꝙ patebit inferius. ¶ Item sciendũ ẜm Japhar ꝙ solis conuersio ꝑ signa temporis mutationes reducit. vnde quã partẽ de quattuor mundi partib⁹ obtineat sũmopeꝫ notandũ nõ quoqꝫ lunaris a sole receptio ꝛ quis fuerit in eius oppositione notandus. Solis nãqꝫ in ariete discursus orientalẽ ventũ vsqꝫ in finẽ geminorũ generat. Que hic tabulantur qñqꝫ in ꝓcessu facient ad ꝓpositũ. Et oẽs etiã cõcedũt ꝙ aries sit masculinus taur⁹ vo feminin⁹ ꝛ sic de alijs ꝯsequẽter. Seqť tabula dignitatũ.

Tabula digni·

	5	4	3		
	Domus	exaltatio	domini triplicitatis		
			primus	2°	3°
Aries	Mars	Solis	Sol	Jupiter	Saturnꝰ
Taurus	Venus	Lune	Venus	Luna	Mars
gemini	Mercuriꝰ		saturnꝰ	Mercuriꝰ	Jupiter
Cancer	Luna	Jouis	Venus	Mars	Luna
Leo	Sol		Sol	Jupiter	Saturnꝰ
Virgo	Mercuriꝰ	mercurij	Venus	Luna	Mars
Libra	Venus	Saturni	Saturnꝰ	Mercuriꝰ	Jupiter
Scorpio	Mars		Venus	Mars	Luna
Sagictarius	Jupiter		Sol	Jupiter	Saturnꝰ
Capricornꝰ	Saturnꝰ	Martis	Venus	Luna	Mars
Aquarius	Saturnꝰ		Saturnꝰ	Mercuriꝰ	Jupiter
Pisces	Jupiter	Veneris	Venus	Mars	Luna
			in die	in nocte	ꝑticeps.

Tabula graduū puteorū.

Aries	6	11	16	23	29			
Taurus	5	12	24	30				
Gemini	2	12	17	26	30			
Cancer	12	17	23	24	30			
Leo	6	13	15	22	23	28		
Virgo	8	13	16	21	25			
Libra	1	11	20	30				
Scorpius	9	10	22	23	27			
Sagictarius	1	12	15	24	27	30		
Capricornꝰ	2	7	11	22	24	28		
Aquarius	1	12	17	24	29			
Pisces	4	7	24	27	28			

tatum planetarũ

	2					1		
	Domini terminorũ					Domini facierũ		
						prime	2e	tertie
♈	♃ 1.6	♀ 7.14	☿ 15.21	♂ 22.26	♄ 27.30	♂	☉	♀
♉	♀ 1.8	☿ 9.15	♃ 16.22	♄ 23.24	♂ 25.30	☿	☽	♄
♊	☿ 1.7	♃ 8.13	♀ 14.20	♂ 21.26	♄ 27.30	♃	♂	☉
♋	♂ 1.6.	♃ 7.13	☿ 14.20	♀ 21.27	♄ 28.30	♀	☿	☽
♌	♄ 1.6	☿ 7.13	♂ 14.18	♀ 19.24	♃ 25.30	♄	♃	♂
♍	☿ 1.7	♀ 8.13	♃ 14.18	♄ 19.24	♂ 25.30	☉	♀	☿
♎	♄ 1.6	♀ 7.12	☿ 13.17	♃ 14.23	♂ 24.30	☽	♄	♃
♏	♂ 1.6	♀ 7.13	♃ 14.21	☿ 22.27	♄ 28.30	♂	☉	♀
♐	♃ 1.8	♀ 9.14	☿ 15.19	♄ 20.25	♂ 26.30	☿	☽	♄
♑	♀ 1.6	☿ 7.12	♃ 13.19	♄ 20.25	♂ 26.30	♃	♂	☉
♒	♄ 1.6	☿ 7.12	♀ 13.21	♂ 22.26	♃ 27.30	♀	☿	☽
♓	♀ 1.8	♂ 9.14	☿ 15.20	♃ 21.25	♄ 26.30	♄	♃	♂

Tabula graduũ lucidorũ ⁊ tenebrosorũ vacuorũ ⁊ fumosorum.

♈	te. 1. 3	lu. 4. 8	te. 9.17	lu. 18.20	va.21.24	lu. 25.29	va. 30
♉	te. 1. 3	lu. 4. 7	va. 8.12	lu. 13.15	va. 16.20	lu. 21.28	te. 29.30
♊	lu. 1. 4	te. 5. 7	lu. 8.12	va. 13.16	lu. 17.22	te. 23.27	va. 28.30
♋	lu. 1.12	te.13.14	va. 15.17	fu. 18.19	lu. 20. 28	va.29.30	
♌	te. 1.10	fu.11.20	va.21.30	(fu.23	lu.24.26	va.27	te.28.30
♍	te. 1. 5	lu. 6. 8	va. 9.13	lu. 14.17	fu. 18	va. 19	lu.20.22,
♎	lu. 1. 5	te. 6.10	lu. 11.18	te. 19.21	lu. 22.27	va. 28.30	
♏	te. 1. 3	lu. 4. 8	va. 9.14	lu. 15.20	fu. 21.22	va. 23.27	te.28.30
♐	lu. 1. 4	te. 5. 7	lu. 8.13	fu. 14. 17	lu. 18.24	te. 25.30	
♑	te. 1. 7	lu. 8.11	fu.12.15	lu. 16. 19	te. 20.22	va. 23.26	te.27.30
♒	fu. 1. 4	lu. 5. 9	te. 10.13	lu. 14. 21	va. 22.25	lu. 26.30	
♓	te. 1. 6	lu. 7.12	te.13.18	lu. 19. 22	va. 23.25	lu. 26.28	te. 29.30

Capitulū sextū de aspectibus planetarū.


Telle dicunt esse in gradibus in quib⁹ fiunt accordamenta qñ sunt cōiuncti uel oppositi uel cū de tertio uel quarto aut sextili dextro uel sinistro se aspiciūt aut in gradib⁹ equaliter elongati ab altero equinoctiorū uel ab altero tropicorū ⁊c. ¶ Stelle dicunt esse ⁊c. Pars hui⁹ habet a Ptolemeo ⁊ Haly in. 14º capitulo prime partis quadripartiti. Et alia pars ex. 15º capitulo eiusdē prime partis. Itē etiā Albumazar in tertia differentia sexti tractat⁹ ⁊ breuiter omēs concedūt istos aspectus imo quasi tota astronomia est ex istis principalib⁹ magis q̄ de quibuscūq; alijs. ¶ Notandū ſm Ptolemeū in quarto capitulo prime partis q̄ p rectificationē figurarū quā faciunt planete in respectu solis ⁊ lune cognosces virtutes omniū planetarū q: tunc mutant aerē augendo uel minuēdo a virtute luminariū. ¶ Item sciendū Ptolemeū ⁊ haly in. 14º capitulo prime partis quadripartiti. q̄ si semicirculus diuidat in tales partes ſm quas caderent accordamenta musicalia in partibus cōsimilib⁹ diametri inuenient qualitates circuli in quib⁹ aspect⁹ supradicti. Cā autē quare hec cōputatio fit tantūmodo in semicirculo est q: ꝯsimiles aspectus uel ꝯsimiles distantie post oppositionē sicut p⁹ ꝯiunctionē nisi q̄ sint in vna parte dextri ⁊ in alia parte sinistri etiā tota diameter correspondet cuilibet medietati circuli. ¶ Si igit capiatur medietas diametri hic cadit accordamentū ipsi⁹ dyapason que fit ſm pportionē duplam. Similiter si capiat medietas semicirculi fit distantia. 90. graduū ſm quā fit aspectus quartus. Si vo capiant due partes diametri hic cadet accordamentū ipsius dyapenthe que est proportio sesq altera seu tria ad duo. Simili si capiant due tertie semicirculi fiet distantia. 120. graduū ſm quā fit aspectus trinus. Item si capiat tertia diametri hic cadit accordamentū dyapenthe cum dyapason. s. pportio vni⁹ ad. 3. Similiter si capiatur tertia pars semicirculi fiet distantia. 60. graduū ſm quā fit sextilis aspectus. Cōiunctio autē ⁊ oppositio sūt ad similitudinē vnius soni. vnde qñ sūt cōiuncti duo planete uel oppositi pijciunt radios suos p eandē lineā. s. p eandē dyametrū mūdi. Et sicut inter cōsonātias seu pportiones musicales. De sunt principaliores: ita in istis distantijs aspectuū principali⁹ reseruat celestis armonia. ¶ Ulterius sciendū ſm Ptolemeū ⁊ haly in eodē capitulo. 14º prime partis. q̄ trinus ⁊ sextilis aspectus sūt amicabiles pter conuenientiā signorū Quartus autē ⁊ oppositus inimicabiles pter discōuenientiā. De gradibus etiam dicunt Ptolemeus ⁊ haly in capitulo. 15º prime partis q̄

Una pars illorũ graduuz est alta ꝛ alia bassa ꝛ qñ equedistant troipicis tũc sunt arcus diurni equales. ꝛ hec de se nota sunt. ¶ Sciendũ ſm Albumazar vbi supra ꝙ oppositio est fortior aspectuũ: deinde qrtus: deinde trinus: vltimo sextilis. ¶ Dubitat̃ vtrũ ſm gradus equales uel ſm gradus ascensionũ in circulo recto uel obliquo debeãt sumi isti aspect⁹ Itẽ potest queri ſm quã distantiã incipit applicatio ad aspectum ꝛ ſm quã durat fortitudo aspectus. Uide in tertia differentia septimi tractatus Albumazaris ꝛc̃.

Capitulũ septimũ de centro aspectuũ planetarũ uel zenith uel athazir.

Item stelle dicunt̃ esse i centro respectu alteri⁹ cũ vna fuerit in cõiunctione uel oppositiõe eiusdẽ aut in altero predictorũ aspectuũ aut p. 12. grad⁹ ante coniunctionẽ uel p 12. gradus post cõiunctionẽ: aut p. 12. gradus ante oppositionẽ aut p. 12. grad⁹ post. Aut ſm distantiã. 45. graduũ uel. 125. uel. 225. uel. 315. ¶ Itẽ stelle dicunt̃ esse ꝛc̃. Alkindus in. 4º. capitulo. Haomar in caº. Quotiens itaqȝ. Haly abenragel i 29º. caº. octaue partis. ꝛ plures alij faciũt mentionẽ de huiusmodi cẽtris ¶ Sciendũ ꝙ Leopaldus Haomar ꝛ Haly abenragel nõ ponunt aspectũ trinũ esse de centris. Sciendũ etiã ꝙ Alkindus quẽ credo sic habere correctũ ponit ꝙ iste partes debent sumi ſm ascensiões climatũ. Sciendum etiã ꝙ potius dicunt̃ centra lune ꝙ̃ alteri⁹ planete qr cum luna tñ distat a sole fiũt ut in plurib⁹ iudicia ſm ista centra. Itẽ a quibusdã vocant̃ athazir: ab alijs zenith. s; nõ est vis de nominib⁹.

Capitulũ octauũ. Quid agant planete.

Sol calefacit ꝛ aliquantulum desiccat. Luna humectat ꝛ parũ calefacit. Saturnus infrigidat ꝛ modicuz desiccat. Jupiter temperate calefacit ꝛ humectat ꝛ facit ventos generatiuos. Mars ꝓprie desiccat ꝛ cõburit. Uenus calefacit parũ ꝛ humectat multũ. Mercuri⁹ qñqȝ desiccat qñqȝ humectat ſm planetã cũ quo īuoluit̃. ¶ Sol calefacit ꝛc̃ Hoc principalit̃ a Ptolemeo. 4º. caº. Et facit ventos. ꝓme ꝑtis quadripartiti. ꝛ quasi oẽs hoc concedũt ꝙ̃uis aliũ modũ cognoscẽdi virtutes planetarũ uel aliã causaz quare saturnus est frigidus. ꝛ sic de alijs ponant plures ꝙ̃ Ptolemeus. ¶ Sciendũ ſm Ptolemeũ ibidẽ ꝙ luna modicũ calefacit ꝓpter lumen receptũ a sole ꝛ ꝓpter hoc facit putrescere. ¶ Dubitatur vtrum saturnus possit infrigidare ꝛ vtrũ per radiũ uel per motũ uel quomodo. Item vtrũ sit calidior sole.

Capitulũ nonũ Qualitates planetarũ quõ mutant̃

Tem saturnus est frigidus semꝑ: tñ ſm magis ꝛ minus. ſꝫ siccitas eius q̃nq; mutat̃ in humiditatẽ. Mars ẽ semꝑ calidus ſm magis ꝛ minus. siccitas tamen eius nõ semꝑ manet in eo. verbi gratia Cũ fuerit planeta descendens in circulo augis ꝛ in signo humido ꝛ in termino humidi planete: ꝛ in quarta humida a sole. tunc est humidus ſm ꝙ plura uel pauciora humiditatis habuerit testimonia ꝛ ecõtra. ¶ In quantitatibꝰ vo actiuis confortat̃ cum fuerit ascendẽs in circulo augis uel cũ similibꝰ ꝛ ecõuerso si descendens. uel cũ dissimilibꝰ. ¶ Jupiter ꝛ venus tẽperate calefaciũt ꝛ humectant. Ascendentes tñ confortat̃ tẽperamentũ caloris eorũ. Descendentes vo fortificat̃ temperamentũ humiditatis. i. incendit̃ humiditas. Similiter est de sole suo modo. Considera etiã signa ꝛ terminos planetarũ etiam sicut primo. ¶ De mercurio specialiter est dicendũ qui ꝛ si sit parũ siccus ꝛ parum frigidus per se tamen si est ascendens tunc est parũ calidus ꝛ grauitate siccitate siccus Et si descendens est humidus cum modico frigoris: tamen plus q̃ȝ alij mutat̃ ſm complexionẽ loci in quo est ꝛ planete cui cõiungit̃. ¶ Item saturnus est ꝛc̃. A. 7º. capitulo uel septima differentia quarti tractatꝰ magni introductorij. Albumazar. Notandũ ꝙ non oportet considerare in qua quarta a sole sint venus ꝛ mercurius qꝛ nõ multũ elongant̃ ab eo. ¶ Sciendũ ſm Ptolemeũ. 12º. capitulo prime partis ꝙ virtutes quibꝰ operant̃ stelle mutant̃ ꝑ statum temporis ꝛ angulorũ. vnde cũ suo simili confortant̃ ꝛ cum suo dissimili debilitant̃.

Capitulũ decimũ Qualitates planetarũ quõ mutant̃ .i. suis habitudibꝰ diuersis.

Tem planete superiores ab ortu uel a cõiunctione solis vsq; ad stationem primam sunt humidi. Deinde vsq; ad oppositionẽꝫ solis sunt calidi. Deinde vsq; ad stationem secundam sicci. Deinde vsq; ad combustionẽ uel cõiunctionem solis frigidi. ¶ Inferiores retrogradi ab ortu quousq; dirigant̃ sunt calidi. Deinde ad cõiunctionẽ solis sunt humidi. Et abinde vsq; ad retrogradationem sicci. Et abinde a retrogradatione vsq; ad coniunctionẽ solis frigidi. Uel sic. Inferiores vo ab ortu quousq; retrogradant̃ sunt humidi. Deinde ad coniunctionem solis calidi. Et abinde vsq; ad retrogradationem sicci. Deinde vsq; ad retrogradationẽ frigidi. ¶ Aliter adhuc de inferioribus sic: venus ꝛ mercurius postq̃ȝ separant̃ a sole ꝛ sunt directi donec sũt in medio sue directionis humectant. Postea vsq; ad stationem primam calefaciunt. Deinde vsq; ad medium retrogradationis desiccãt. Deinde vsq; ad cõ-

bustionem infrigidant. Postq etiã sepantur a sole retrogradi existen-tes z apparent in mane donec eorũ retrogradatio compleat z fiant di-recti. habẽt similiter quattuor status similes istis zc. ¶ Luna vo in pri-ma quarta mensis est humida principaliter. in secunda calida. in tertia sicca. in quarta frigida. ita q suo modo q̃ttuor quarte lunationis quat-tuor quartis anni correspondent. ¶ Item planete supiores zc. Ab al-bumazare quarta differẽtia septimi tractatus sui magni introductorij. Itẽ venus z mercuri' zc. Habet ab haly in glosa penultie ꝓpositiõis. 8' ca. prime ptis. Luna vo i pa q̃rta zc. hoc a Ptolemeo. 8o ca. prime parti.

Capitulũ vndecimũ Qñ planete magis augent in suis operationib'

Item fortior est calor planetarũ quando sunt retrogradi. Item quãdo fuerit planeta a capite cancri ad caput libre est in sũmo caliditatis sue z fortior caliditas si cum hoc fuerit in longitudi ne propiori epicycli. ¶ Itẽ caliditas illic est duob' modis: aut a statione prima ad oppositionẽ cũ caliditate: aut ab oppositione ad stationẽ secundam cum caliditate vincente que est fine siccitatis. Sz a statione secũda vsq ad absconsionẽ sub radijs debilitatur calor eius: z cum fuerit sub radijs nõ apparet in eo effectus caliditatis: quando exit de radijs vsq ad stationẽ primam incipit calor eius crescere ita q dixe runt multi grecorũ q tunc est significatio humiditatis. ¶ Itez ex parte eccentrici iudica calorẽ fm appropinquationẽ a terra. Qñ igit planeta fuerit in sũmo epicycli z in sũmo eccentrici z fuerit in prima q̃rta circuli illud est sũmũ debilitatis caloris initiũ: q nõ apparet effect' caliditatis sue in terra sz frigiditatis. Sz qñ fuerit in secũda q̃rta circuli z i infimo epicycli z eccẽtrici erit sũma vis sue caliditatis quousq accidat magna siccitas in terra. ¶ Itẽ nota q effect' calidorũ sunt fortiores versus ze-nith capitũ. z versus meridiẽ debiliores fm distantiã a zenith capitum Similiter z de frigidis sz effectus eorũ aliquantulũ fortiores in pte me ridiei. ¶ Itẽ fortior est calor zc. Alkindus in primo ca. ¶ Itẽ nota q effectus fortiores zc. Alkindus in quinto ca.

Capitulũ. 12m

De diuersis opatiõib' in aere pla℞ in diuersis locis i circulo discurrẽtiũ.

Item oẽs planete ponderosi a statione sua ad oppositionẽ hu-mectant z ab oppositiõe vsq ad stationẽ desiccãt. Itẽ a statiõe 2a ad cõbustionẽ infrigidãt z a cõbustiõe vsq ad stationẽ cale-scunt. ¶ Itẽ fortior caliditas ẽ in retrogradatiõe. Itẽ fortior siccitas z hũiditas ẽ in declinatiõe septẽtrionali. minor vo in meridio-nali z in facto hyemis ꝓ similitudine temporis. ¶ Venus z mercurius orientales z retrogradi humectãt. orientales directi desiccant. occiden tales retrogradi infrigidant. occidentales directi desiccant.

¶Luna in prima quarta a sole calida & humida & si cū hoc fuerit ascēdens in circulo breui erit humida multū & fortius in prima & secūda 4ª circuli quam in tertia & q̄rta 4ª. In secunda q̄rta mensis est calida & sicca si ascendens est sicca sm istā naturā. si descendens calida equalis In tertia q̄rta mensis est frigida & sicca. si ascendēs minuet frigiditas si descēdens minuet natura sua. In q̄rta q̄rta a sole frigida & hūida. In ascensu frigiditas vincit. in descensu humiditas. Itē omnes planete ponderosi &c. hoc Alkindus.

Capitulū. 13m. Quando planete sint maxime significationis pluuiarū.

Item scito q planete retrogradi significant sup pluuiam & eo magis inferiores qui sūt sub sole & eo magis siue inferiores siue supiores in signis femineis. Et est testimoniū magis clarū si signū fuerit de signis frigidis siue terreis siue aqueis. ¶ Itē scito q planete retrogradi &c. hoc Abraham de seculo.

Capitulū. 14. qn̄ planeta est iterū maioris significationis p pluuijs.

Item planeta cum est retrogradus a statione prima ad oppositionē notat plus pluuiā quam ab oppositione ad stationē secundā Item planeta cū est retrogradus &c. hec hyspalensis.

Capitulū. 15. planeta in quolibet signo qualē aurā dat.

Item saturnus in ariete sub radijs facit pluuias & radiositates & nebulas pluuias. Uesptinus ventos frigidissimos. Matutinus orientalis cōplexionē bonā ostendit. Stationari9 & fulgura. Jupiter in ariete sub radijs facit pluuias. Uesptinus nebulas uel rores spargit. Matutinus orientalis serenū. Stationarius tonitrua facit. Mars in ariete sub radijs facit serenū. Uesptinus contrariū. Matutinus turbationē temporū. Stationari9 fulgura & tonitrua. Uenus in ariete sub radijs nihil erit venti. Uesptina ventū facit. Matutina tonitrua & pluuias. Mercurius in ariete sub radijs tempestuosus ē. Uesptinus parū bene cōplexionatus. Matutinus mundū aerē significat. ¶ Saturnus in tauro sub radijs bonā complexionē facit. Uesptin9 siccitatē. Matutinus bonā complexionē. Stationarius vmbrosus tēpestuosus & tonitruos9 ē. Jupiter i tauro sub radijs mediocritatē aeris significat. Uesptinus vmbras. Matutin9 abundantiā fructuū & pascue Stationarius defectū fructuu3. Mars in tauro sub radijs tempus sine vento facit. Uesptinus serenū. Matutinus ventos. Stationarius desiccat aerē. Uenus in tauro sub radijs tonitrua significat. Uesptina serenum. Matutina bonam complexionē. Mercurius in tauro sub radijs

tempestuos⁹ ē ꝛ ymbrosus. Uesptinus bone cōplexionis. Matutinus roridus ꝛ madidus ꝛc. ¶ Saturn⁹ in geminis sub radijs siccus. Uespertinus aridus. Matutinus roridus bone cōplexionis. Stationarius infirmitates crescūt. Jupiter in geminis sub radijs bonā complexionem Uesptinus sanitatem. Matutinus sanitatē. Stationarius sanitatem. ¶ Mars in geminis sub radijs infirmitatē significat. Uesptinus calidissimus. Matutinus contrarietatez in hoībus. Stationarius calidus ꝛ siccus. Uenus in geminis sub radijs ad min⁹ desiccat. Uesptina ventosa. Matutina bonā complexionē. Mercurius in geminis sub radijs ventos excitat in mari ꝛ in terra. Uesptinus desiccat. Matutin⁹ bonaz complexionem. ¶ Saturnus in cancro sub radijs obscuros dies ꝛ validos ventos ꝛ pcellas in mari. Uesptinus mare reddit apertū ad nauigandū. Matutinus bone complexiōis. Sationari⁹ diuturnas infirmitates. Jupiter in cancro sub radijs tranquillū mare significat ꝛ abundantiā piscium. Uesptinus bonam complexionē ꝛ sanitatem. si matunus cū bona complexione. Stationarius facilitatē in rebus. Mars in cancro sub radijs combustionez. Uesptinus infirmitates. Matutinus lites inter homines. Uenus in cancro sub radijs tempus absqꝫ vento. Uesptina bonam complexionē. Matutina serenū. Mercurius in cancro sub radijs mare eleuat. Uesptinus tranquillitatē. Matutinus bonam complexionē ꝛ sanitatē. ¶ Saturnus in leone sub radijs in corpore reumatismos ꝛ ex humiditate turbationē: ꝛ in aere siccitatem facit. Uesptinus ariditatem. Matutinus bonā complexionē. Stationarius ariditatem ꝛ siccitatē. Jupiter in leone sub radijs annuales ventos inducit. Uesptinus bonaz complexionē. Matutinus robur in impatore ꝛ puenit ex fortitudine. Stationarius infirmitatū remissionem ꝛ minutionē Mars in leone sub radijs infirmitates impatoris. Uesptinus ardorem determinat. Matutinus destructiones. Stationarius infirmitates. Uenus in leone sub radijs ardorem facit. Uesptina iumentoruz infirmitates. Matutina bonam complexionē. Mercurius i leone sub radijs ab occidente ventū educit. Uesptinus suffocationē. Matutinus serenū. ¶ Saturnus in virgine sub radijs nocens est ꝛ infirmitates facit seu infert. Uesptinus difficultatem aeris. Matutinus siccitatē. Stationarius infirmitatez. Jupiter in virgine sub radijs abundantiā significat. Uesptinus bonam complexionē. Matutinus sanitatem. Stationarius bonum ꝛ gaudiū. Mars in virgine sub radijs nocumentū infirmitatum. Uesptinus suffocationis est. Matutinus vo lites. Stationarius siccitatem. Uenus in virgine sub radijs desiccat. Uesptina bonaz

conditionem dat. Matutina humiditatē. Mercurius in virgine sub radijs procellas in mari validas significat. Uespertinus siccitatē. Matutinus super humidos ꝛ bene complexionatos. ¶ Saturnus in libra sub radijs occultas infirmitates infert. Uespertinus inequalitatē aeris Matutinus frigidos ꝛ siccos ventos facit. Stationarius febrem quartanam inducit. Jupiter in libra sub radijs bonā complexionē aeris. Uespertinus sanitatem. Matutinus infirmitates expellit. Stationarius bonum tempus facit. Mars in libra sub radijs siccum ꝛ aridū aerē facit. Uespertinus pluuiosus. Matutinus turbationes ꝛ tonitrua Stationarius aridus ꝛ siccus est. Uenus in libra sub radijs est humida. Uespertina bene complexionata. Matutina fantastica est ꝛ humiditates facit. Mercurius in libra sub radijs fortissimos ꝛ cōtrarios ventos. Uespertinus bene complexionatus. Matutinus semper humidus ꝛ vtilis est. ¶ Saturnus in scorpione sub radijs frigidum aerem significat. Uespertinus congelationem. Matutinus septentrionaliū ꝛ frigidorum ventorum est significator. Stationarius obscuros dies. Jupiter in scorpione sub radijs frigidam pluuiā significat. Uespertinus bonam complexionem. Matutinus bonum ꝛ augmentationem pisciū significat. Stationarius tranquillitatem. Mars in scorpione sub radijs tranquillitatem in mari. Uespertinus
Matutinus ventos. Stationari⁹ tonitrua ꝛ fulgura. Uenus in scorpione sub radijs sine pluuia est. Uespertina pluuiosa. Matutina multe pluuie. Mercurius in scorpione sub radijs tempestuosus. Uespertinus sine pluuia. Matutinus pluuiosus. ¶ Saturnus in sagictario sub radijs pluuiā ꝛ nebulositatem. Uespertinus frigiditatem ꝛ ariditatem. Matutinus frigiditatem ꝛ congelationē. Stationarius infirmitates hominū. Jupiter in sagictario sub radijs bonam complexionē. Uespertinus pluuias multas. Matutinus serenū. Stationarius imꝑfectionem ꝛ nocumentum. Mars in sagictario sub radijs sine humiditate est. Uespertinus infirmitatem ꝛ pestilentiā. Matutinus multorū militum cōmotionem. Stationarius imꝑfectionem ꝛ nocumentum. Uenus in sagictario sub radijs pluuiosa. Uesꝑtina ventosa ꝛ frigida. Matutina bone complexionis. ¶ Mercurius in sagictario sub radijs multam pluuiā significat. Uespertinus sine humiditate. Matutinus bonā complexionem significat. ¶ Saturnus in capricorno sub radijs significat ventos boreales cum aeris obscuritate. Uespertinus frigiditates. Matutinus frigiditatem boream. Stationarius obscuros dies facit.

Jupiter in capricorno sub radijs humidũ aerem significat. Uespertinus pluuiam. Matutinus tranquillitatẽ in mari ꝛ in fluminibꝰ significat. Stationarius aquarũ est signator. Mars in capricorno sub radijs nutrit. Uespertinus bonam complexionez. Matutinus hyemales dies ꝑ loca facit. Stationarius tranquillitatez ꝛ ꝑfectionem. Uenus in capricorno sub radijs gelida est. Uespertina frigida. Matutina pluniosa. Mercurius in capricorno sub radijs semꝑ est pluuiosus. Uespertinus ¶ Saturnus in aquario sub radijs hyemẽ facit duram. Uesꝑtinus timorẽ in mari ꝛ in fluminibus. Matutinus pluuiam ꝛ hyemẽ. Stationarius frigus ꝛ glatiosus. Jupiter in aquario sub radijs bonam complexionẽ. Uesꝑtinus multã pluuiã. Matutinus multã infirmitatem repellit. Stationarius pluuiã ꝛ nutrimentũ affert. Mars in aquario sub radijs ariditatem. Uesꝑtinus absentiã ventorum. Matutinus incisionem eorũ. Stationarius nocumentũ ꝛ motionem significat in mari. Uenus in aquario sub radijs nebulosa. Uespertina calida ꝛ ventosa. Matutina pluuiosa ꝛ caliginosa. Mercurius in aquario sub radijs niuosus. Uesꝑtinus calidus aut gelidus turbulentꝰ. Matutinꝰ pluuiosus. ¶ Saturnus in piscibꝰ sub radijs vinosus. Uesꝑtinus pluuiosus. Matutinus bonã complexionem. Stationarius inequalitatem significat. Jupiter in piscibus sub radijs augmentũ piscium. Uesꝑtinus bonam complexionem. Matutinus tranquillitatẽ in mari ꝛ fluminibus. Stationarius bonã ꝛ temperatã pluuiam. ¶ Mars in piscibus sub radijs raritatem pisciũ. Uesꝑtinus ariditatem. Matutinus fulgura ꝛ tonitrua. Stationarius inequalitates i corporibus significat. Uenus in piscibus sub radijs gelidũ tempus. Uesꝑtina aquosa ꝛ ventosa. Matutina bonã complexionem ꝛ germina ꝛ feces nutrit. Mercurius in piscibus sub radijs tempestuosus ꝛ pluuiosus. Uesꝑtinus bonam complexionẽ. Matutinus tranquillitatem ꝛ bonam complexionẽ significat. ¶ Jtẽ saturnus in ariete sub radijs ꝛc̃. hoc totum ponit̃ in quodam paruo tractatu quẽ composuit dñ haly. ¶ Sciendũ ẜm haly abenragel in quarto capitulo prime partis Jn naturis planetarũ. Per solem fit decursus aquarũ: motus ventorũ nascunt̃ nubes ꝛ veniunt pluuie. ¶ Luna ẽ vnus planetarũ significantiũ pluuias. similiter venus ꝛ mercurius. Per iouẽ clarificatur aer currunt venti ꝛ salutifere pluuie. s. temporibus debitis ꝑ equalitatẽ ꝛ temperiẽ. calor estatis ꝛ frigus hyemis remittunt̃. Per martẽ ꝛ eiꝰ accessũ ꝛ recessum in suo circulo crescit ꝛ decrescit calor estatis ꝛ hyemis frigiditas omni anno. Et est mutabilis qꝛ vna vice humidꝰ ꝛ alia siccus. vnde

quando erigitᷣ in circulo suo ⁊ sepat se ac retrahit se a fumositatibꝰ terre ⁊ humoribus. fortificatur eius caliditas ⁊ siccitas. quando vͦ descēdit humectatᷣ ⁊ minuitᷣ calor eius. Et qñ est significator pluuie facit scintillationes ⁊ tonitrua ⁊ radios ⁊ facit mirabilia i aere. debilitatᷣ in signis aqueis ⁊ fortificatur in signis igneis. De venere dicunt sapientes ꝙ qñ retrogradatᷣ a sole in capricorno aquario uľ in piscibꝰ existente: hyems illius anni erit humida ⁊ pluuiosa. Et si retrograditur quando sol est i ariete uel tauro erunt pluuie ⁊ humiditates in vere illius anni, ꝓpter retrogradationē veneris ⁊ accessum eius erga solem ⁊ introitum sub corpore ⁊ radijs solis. ¶ Mercurius est vnus triū planetarū pluuias significantiū. ꝑ eum ⁊ ꝑ mutationē suam de signo in signum ⁊ ꝑ statum eius ⁊ retrogradationem ⁊ directionē ipsius ⁊ ꝑ oppositiones ⁊ coniunctiones suas scientᷣ motus ventorū ⁊ eorum fortitudines in omnibus temporibus illius anni: quoniam quando exit de vno signo ⁊ intrat aliud: uel quando est stationariꝰ uel, retrogradus significat ventos fortes humiditates ⁊ pluuias ⁊ in aere, accidentia de nubibꝰ ⁊ turbationes ⁊ his similia. Similiter quando est in oppositione lune luna existente in aliquo signorum aqueorū significat qđ prediximus. ¶ Itē ꝑ hyspalensem in primo capitulo volens scire ⁊c̄. luna in pluuia habet posse. Et sol nūc pluuiā nunc serenitatē significat. Nam cum est in loco inferiori circuli pluuiā significat. In supiori vͦ serenitatē. sic est iudicium omniuꝫ planetarū. Et luna accipit virtutem a planetis dans terre, put natura eorū existit ⁊ ut planete ꝑmutantᷣ a dextro in sinistrū uel econuerso. Uel a velocitate, in tarditatē ⁊ econuerso: uel egreditᷣ aliquē angulorūꝫ sic aeris ꝑmutatio erit. nā si mobilis est mouetur econuerso motu ventorū. Similiter facit cōiunctio planets uel aspectue. sic etiaꝫ significat aspectus astrorū fixorū. ¶ Item ꝺm Albumazar in primo capitulo secūde differentie primi tractatus sui introductorij nisi fieret participatio planetarū cū sole ⁊ luna, vna estas alia calidior. Et similiter suo modo de hyeme. ¶ Item ꝺm albumazar tertio tractatu sui magni introductorij plura bona habentᷣ de accessibus ⁊ recessibus maris ꝺm motū lune. Sꝫ de hoc quere ⁊c̄. ¶ Item de virtutibꝰ planetaꝝ multa bona dicit Albumazar in sexta differentia quarti tractatus. Sꝫ modicū aut nihil est ibi faciens ad ꝓpositum quin virtualiter hic contineatᷣ. ¶ Itē sciendū Saturnus in ariete sub radijs ⁊c̄. non omnes cōbinationes que possunt poni ponuntᷣ semꝑ qꝛ forte hoc erit nimis nō possum plus.

Capitulũ.16.De augmento virtutũ planetarũ.



Tem virtutes planetarũ augent̃ qñ distãt a sole uel a luna eo modo quo domus earũ distant a domib⁹ luminariũ. Tũc eni dicunt̃ pticipare facie ad faciem. Item fortificant̃ si sint in suo haiz. Itẽ illi qui sunt in angulis uel succedentib⁹ sunt vincentes. qui vo in cadentibus sũt retrocedentes. ⁋ Item planeta exaltat̃ sup alterum qñ est dexter ab illo igit̃ q sit respectu alterius supra terraz. Item generaliter quotiens vnus planeta dat vim alteri ita q habuerit cũ signo uel planeta concordiã naturalẽ uel accidentalẽ tunc fortificat̃ ꝛ ꝑ eius oppositum debilitat̃. ⁋ Item multi sunt modi alij fortificandi ꝛ debilitandi planetas sꝫ predicti sũt principales. nec forte alij modi sũt multũ necessarij ad ꝓpositum ꝛc̃. ⁋ Item virtutes planetarũ ꝛc̃. hoc a Ptolemeo ꝛ haly in.23°.ca°.prime partis. Eo modo ꝛc̃. ẜm haly sunt mercurius in 2° a sole ꝛ in.12°.a luna. venus in 3° a sole ꝛ.11°.a luna ꝛ sic de alijs. ꝛ lucrãtur vim ac si essent in domo sua. ⁋ Item sciendũ ẜm haly ibidẽ q haiz est q planeta masculinus sit in die supra terrã in signo masculino ꝛ de nocte sub terra. uel q planeta masculinus sit in signo masculino ꝛ femininus in signo feminino. Et diurnus de die sub terra ꝛ nocturu⁹ de nocte supra terrã. hoc est ẜm cõmunitatẽ astrologorũ. Postea dicit q opinio Ptolemei est q haiz est qñ planeta est in loco sibi conuenienti ꝛ cũ quo habet cõcordantiã. Item ẜm haly ibi q modi ferendi vim sũt duo ꝛ habent vnã radicem ad quam reducunt̃. s. q leuis semꝑ exhibet vim suam ponderoso excepto si leuis habeat tot dignitates in signo in quo existit q in virtute suꝑat ponderosum. Primus modus est etiã ꝛ quia haly vbi supra ꝛ Albumazar i.7°.tractatu sui magni introductorij. ꝛ hyspalensis in principio ꝛ Alchabici⁹ ꝛ plures alij faciũt de hoc mentionẽ ꝛ fiet extractio specialis suꝑ hoc. ⁋ Item sciendũ q nõ oportet cõsiderare omnes modos fortitudinũ planetarũ in ꝓposito: qꝛ aliqui sũt modi qui q̃uis facerẽt ad aliqua iudicia sicut de natiuitatib⁹ ꝛc̃. tñ modicũ aut nihil faciũt ad aliqua iudicia de mutationib⁹ aeris nec etiã auctores se iuuãt. iõ hoc sit de bene esse. ⁋ Itẽ dubitat̃ quos ventos moueãt planete.

Caplm.17. Stelle fixe sunt diuersarũ qualitatũ.



Tem stelle fixe sũt calide uel humide: frigide ul' sicce ẜm q sũt de natura alicui⁹ planete. Itẽ stelle fixe prime magnitudinis sũt fortiores q̃ secũde: ꝛ sic cõsequent̃: ꝛ que circa zodiacũ q̃ que extra: ꝛ septentrionales q̃ meridionales: ꝛ ꝓpinquiores zenith capituꝫ q̃ remotiores: ꝛ que

cõiungit cũ aliquo planeta in longitudine ⁊ latitudine q̃ in longitudi-
ne tm̃. Et que in longitudine tm̃ q̃ que nõ cõiungit. ¶ Itẽ stelle fixe de
bilitant ⁊ fortificant ẜm loca sua respectu ascendẽtis ⁊ ẜm figuras suas
r̃spectu solis lune ⁊ triũ supiorꝝ. Uerũtñ iste stelle nõ eodẽ r̃spectu redeũt
Cũ separant a sole ⁊ sunt oriẽtales donec sol se ponat in q̃rta eorũ hume-
ctant ⁊ in q̃rta sinistra vsq͡ ad oppositionẽ calescũt. Postea vsq͡ ad aliã
quartã desiccãt ⁊ postea vsq͡ ad cõiunctionẽ infrigidant. Per tabulã se
quentẽ patent nature stellarũ fixarũ principaliũ in longitudine tpe mo
derno ⁊ latitudine cũ figuris ⁊ imaginibꝰ in quibꝰ sunt uel de qua ma-
gnitudine fuerint. ¶ Itẽ stelle fixe sunt calide ⁊c̃. tabulã satis ponit vni
mũdus. Sz hoc extrahit a Ptolemeo in nono caꝰ prime ptis quadripti
ti. ¶ Itẽ stelle fixe magnitudinis prime ⁊c̃. hoc dicit haly in glosa in fi-
ne eiusdẽ noni capituli. ¶ Dubitat qualiter virtutes stellarũ fixarũ co-
gnoscunt vtrũ videlicet possint cognosci p colores uel p quid. quere de
hoc ⁊c̃. ¶ Nota q͡ a tempore considerationis Ptolemei de locis augiũ
⁊ stellarũ fixarũ vsq͡ ad tempꝰ considerationis Alfonsij de eisdẽ mota ẽ
octaua sphera ⁊ p consequens stelle fixe ⁊ auges. 17. gra. 8. minuta. Et a
õsideratione Alfonsij vsq͡ ad finẽ anni xp̃i. 1368. mota est p. 1. gra. 22.
minuta. 18. 2ª 43. 3ª. ⁊ sic a tempore cõsiderationis ipsiꝰ Ptolemei vsq͡
ad finez anni xp̃i predicti motus est zodiacus mobilis ⁊ imagines ipsiꝰ
p. 18. gra. 30. minuta. 18. 2ª. 43. 3ª. Et cum tempore cõsiderationis Pto
lemei stella antecedens que est in cornu arietis in q̃ incipit imago arie
tis fuerit distans a principio zodiaci fixi p. 6. gra. 40. minuta. Sequitur
q͡ pfecto anno xp̃i. 1368. distabat ab eodem principio arietis zodiaci
fixi. 25. gra. 10. minuta. 18. 2ª 43. 3ª. ¶ Et est intelligendũ q͡ dispositiões
stellarũ fixarꝝ denotate in p̃cedentibus ad terminũ cõplementi radicis
mediarũ cõiunctionũ ordinent ẜm dispositionẽ earũ stellarũ naturalẽ
⁊ q͡ longitudines earũ incipiant ex initio signi arietis ⁊ fiant ẜm succes
sionẽ signorũ in suo motu. Sz latitudines earũ sunt distantie illarum a
via solis. ¶ Dexter pes cancri. Nota q͡ ista stella ⁊ zubayl nõ sũt visibi-
les prorsus licet sint prime magnitudinis: q͡ latitudo cuiuslibet earũ ẽ
tanta versus meridiẽ q͡ sup horizontẽ prorsus nõ ascendunt.
¶ Tempus inter Alfonsiũ ⁊ radicẽ istarũ stellarũ. 86. anni solares com
pleti. Motus stellarũ in tpe p̃dicto. 44. minuta gradꝰ ⁊ ẜm hoc motus
eq̃lis earũ in vno anno fuit. 34. 2ª 49. 3ª. 25. 4ª. i. illo tpe erãt rectificate
stelle. 1319. 5. mens. Item tempus Alfonsij incepit. 1251. anni xp̃i. ⁊. 5.
mens. Itẽ a loco cuiuslibet stelle fixe tpe Alfonsij vsq͡ ad annos xp̃i.
1424. 1. gradu. 59. minuta. 20. 2ª.

Tabula stellarū fixarū que sunt ꝓpe viam solis verificate ad annū domini. 1312.

	Longi			Lati		pars	gnitudo	
	tudo			tudo		mū	ǽ	
	S	g̃	m̃	g̃	m̃			
1	0	24	32	7	70	ſ	3	cornua arietis
	0	25	32	8	20	ſ	3	parū infrigidant ꝛ multū deſiccant.
	Saturni ꝛ martis							
2	0	28	25	7	20	ſ	5	In ore arietis
	0	29	22	6	0	ſ	5	modicū infrigidant ꝛ humectant
	Mercurius ꝛ parū saturni							
3	1	2	52	5	15	m	4	In pede inferiori arietis deſiccant
	1	5	52	1	50	m	5	
	1	7	32	1	20	m	5	
	Martis							
4	1	9	12	4	50	ſ	5	In cauda arietis humectant
	1	11	42	1	40	ſ	4	
	1	13	12	2	30	ſ	4	
	1	14	52	1	50	ſ	4	
	Ueneris							
5	1	27	32	9	30	m	5	In abſciſione tauri figide ꝛ humide.
	1	21	32	8	0	m	3	
	Ueneris ꝛ parū saturni							
6	1	20	2	4	30	ſ	5	Pleyades
	1	20	23	4	40	ſ	5	tpate inter humiditatē ꝛ ſiccitatem ꝛ
	1	20	32	5	5	ſ	5	tendunt verſus calorem.
	1	21	32	5	20	ſ	5	
	Lune ꝛ veneris							
7	2	0	32	5	10	m	1	aldebaran ca. ꝛ ſicca
	Martis							
8	1	28	52	5	45	m	3	In capite tauri multū frigide ꝛ ten-
	1	28	42	5	50	m	3	dunt ad ſiccitatem.
	1	19	42	3	0	m	3	
	2	3	32	4	0	ſ	4	

	Longitudo			Latitudo		pars mūdi	Magnitudo	
	S	g̃	m̃	g̃	m̃			
	Saturni ꝛ parū mercurij							
9	2	7	52	3	30	m	5	In sūmitate cornuū tauri
	2	8	32	5	0	s	5	Calide ꝛ sicce
	2	13	12	5	0	m	5	
	2	15	2	2	30	m	3	
	Martis							
10	2	24	22	1	30	m	4	In pedibus geminorū: plus humectāt
	2	26	2	1	15	m	4	q̄ desiccant.
	2	28	2	3	30	m	4	
	2	29	52	7	30	m	3	
	3	3	32	10	30	m	4	
	Mercurij ꝛ veneris							
11	3	9	32	5	30	m	3	In coxis geminorū
	Saturni							
12	3	11	12	9	40	s	2	Inflāmati herculis humecti
	Mercurij							
13	3	14	32	6	15	s	2	
	Martis							
14	3	20	32	1	0	s	5	In capitibus geminorū
	2	25	2	7	30	m	4	humide magis q̄ sicce
	Mercurij ꝛ martis							
15	3	26	12	11	5	s	4	In pede cancri
	3	4	22	5	30	s	4	In brachijs cancri
	Mercurij ꝛ parū martis							
16	3	28	12	0	40		4	In pectore cancri
	Martis ꝛ lune							
17	3	28	12	2	40	s	4	duo asini Hee faciūt calorem ꝛ
	3	29	12	0	10	s	4	siccitatem magnā
	Martis ꝛ solis							
18	4	12	2	9	30	s	3	In capite leonis magne siccitatis

	Longi°			Lati°		ps	ni	tudo
	S	g̈	m̃	g̈	m̃	m'	mag	
	Saturni ꝛ martis						E	
19	4	19	2	11	0	ƀ	3	In collo leonis.
	4	18	32	4	30	ƀ	3	
	4	20	2	7	30	ƀ	3	
	Saturni ꝛ parū mercurij							
20	4	20	22			ƀ	1	Coꝛ leonis
	Martis ꝛ Iouis.							
21	4	29	12	12	15	ƀ	4	In doꝛſo ꝛ cauda leonis.
	5	2	2	13	40	ƀ	2	
	5	2	12	11	30	ƀ	5	
	5	4	12	9	40	ƀ	3	
	5	12	23	12	5	ƀ	1	
	Satnrni ꝛ veneris							
22	5	8	12	5	50	ƀ	3	In coxis leonis
	5	8	22	3	0	m	5	
	5	9	32	0	50	ƀ	4	
	5	9	32	1	15	ƀ	4	
	Ueneris ꝛ mercurij.							
23	5	14	12	4	35	ƀ	5	In capite virginis.
	5	14	52	5	40	ƀ	5	In oculo.
	5	17	2	6	0	ƀ	3	In ala meridionali
	5	18	2	5	30	ƀ	5	
	Mercurij ꝛ parū martis.							
24	5	26	7	1	10	ƀ	3	In ala ſeptentrionali virginis
	6	1	2	2	50	ƀ	3	In doꝛſo virginis
	Mercurij ꝛ parū martis							
25	6	0	2	15	10	ƀ	3	
	Saturni ꝛ mercurij							
26	6	14	32	3	30	m	1	Spica
	Ueneris ꝛ parū mercurij							
27	6	24	32	7	30	ƀ	4	In ſūmitate pedū virginis
	6	25	12	2	40	ƀ	4	
	6	27	52	0	30	ƀ	4	
	7	0	32	9	50	ƀ	4	

	Longitudo			Latitudo		pars mũ	magnitudo	
	S	g	m	g	m			
	Mercurij ꝛ martis							
28	7	5	52	7	30	ƀ	2	In libra super lancem
	7	0	2	8	40	ƀ	2	
	Jouis ꝛ martis							
29	7	9	12	1	15	ƀ	4	In auribus scorpionis
	7	11	52	1	40	ƀ	4	
	7	15	22	3	54	ƀ	4	
	7	20	52	4	20	ƀ	4	
	Saturni ꝛ mercurij							
30	7	23	32	1	40	m	3	In fronte scorpionis
	7	23	32	5	0	ƀ	3	
	7	24	12	1	20	ƀ	3	
	Saturni ꝛ parũ martis							
31	8	0	29	4	0	m	2	Cor scorpionis
	Martis ꝛ parũ Jouis							
32	8	5	52	15	0	m	4	In nodis caude scorpionis
	8	11	2	19	30	m	3	
	8	14	2	18	50	m	3	
	8	15	52	15	10	m	3	
	8	18	22	16	40	m	3	
	Ueneris ꝛ saturni							
33	8	14	52	13	30	m	4	In aculeo scorpionis
	8	15	22	13	20	m	3	
	Mercurij ꝛ martis							
34	8	19	2	13	15	m	4	Nebulosa
	Martis ꝛ lune							
35	8	22	22	6	30	m	3	In sagicta sagictarij
	8	0	52	3	50	m	4	
	Martis ꝛ lune							
36	8	24	32	2	7	ƀ	3	In arcu sagictarij
	8	26	52	1	30	ƀ	3	

	Longitudo			Latitudo		pars mũ.	magnitudo	
	S	g̃	m̃	g̃	m̃			
37	9	3	2	7	45	m	4	Jn nube Jn vultu ſagictarij
	9	4	12	6	45	m	3	
	9	5	32	2	30	m	4	
	9	7	52	2	30	m	5	
	Martis ꝛ ſolis							
38	9	4	52	0	18	m	2	
	9	5	32	0	23	m	2	
	9	14	32	0	13	m	3	
39	9	16	21	5	50	m	5	Jn cauda equi ſagictarij
	9	16	32	4	50	m	5	
	9	16	42	4	50	m	5	
	9	17	52	6	30	m	5	
	Veneris ꝛ ſaturni							
40	9	25	12	2	20	ſ	3	Jn cornibus capricorni
	9	25	12	5	0	ſ	3	
	9	26	42	1	30	ſ	6	
	Veneris ꝛ modicũ martis							
41	9	29	33	8	40	m	4	Jn pedibus ꝛ ventre capricorni
	10	4	32	7	40	m	4	
	10	8	2	6	50	m	4	
	10	8	12	6	0	m	5	
	Martis ꝛ mercurij							
42	10	12	42	2	10	ſ	3	Jn ore capricorni
	10	14	21	2	10	ſ	3	16 15
	10	14	42	0	20	m	4	
	10	15	32	2	50	m	5	
	Martis ꝛ veneris							
43	10	2	32	8	40	ſ	3	Jn ſiniſtra manu aquarij
	10	4	2	8	0	ſ	4	
	10	14	22	8	15	ſ	2	
	10	24	12	11	15	ſ	4	

	Longitudo			Latitudo		pars mũdi	Magnitudo	
	S	g̃	m̃	g̃	m̃			
	Saturni ꝛ mercurij							
44	10	19	12	5	0	m	4	In coxis aquarij
	10	19	32	7	30	m	3	
	10	22	32	5	40	m	5	
	Mercurij ꝛ ſaturni							
45	11	5	32	1	0	m	4	In decurſu aque exeuntis de am-
	11	6	52	7	30	m	4	phora
	11	7	52	0	30	m	4	
	11	8	12	1	4	m	4	
	Saturni ꝛ parũ Jouis							
46	11	9	32	9	15	ß	4	In vertice piſcis meridiani.
	11	12	2	7	30	ß	4	
	11	13	52	9	30	ß	4	
	Mercurij ꝛ ſaturni							
47	11	13	52	6	20	ß	4	In ore piſcis meridiani
	11	17	32	5	4	ß	6	
	Jouis ꝛ mercurij							
48	11	23	52	6	20	ß	4	Sup̱ eius caudã in filo meridionali.
	Saturni ꝛ mercurij							
49	0	17	12	15	20	ß	4	In ſpina dorſi piſcis meridiani
	0	20	2	17	0	ß	4	
	Jouis ꝛ veneris							
50	0	13	32	14	20	ß	4	In filo ſeptentrionali
	0	14	12	12	0	ß	4	
	0	15	32	12	0	ß	4	
	Saturni ꝛ Jouis							
51	0	20	22	8	30	m	3	Lucida in ligatura piſcis
	Martis ꝛ mercurii							

Capitulū. 18. De qualitatib⁹ quartarū anni.



Uattuoꝛ sūt tpa ver estas autumn⁹ ꝛ hyems. Uer ab ariete calidus ꝛ humidus. Estas a cancro calida ꝛ sicca. Autumnus a libra frigida ꝛ sicca. Hyems a capricoꝛno frigida ꝛ hūida. ❡ Quattuoꝛ sunt tpa ꝛc. hoc a Ptolemeo. 10° capitulo pꝛime partis quadripartiti. Et ab Albumazar i quinta differentia secūdi tractatus sui introductoꝛij. Alkindus in pꝛimo ꝛ omnes in hoc concoꝛdant.

Capitulū. 19. De qualitatib⁹ planetarū diuersis in singulis q̄rtis anni.



Uando in vere retrogradant̄ planete in quarta vernali.

❡ Qñ in vere retrogradant̄ planete in quarta estiuali illud tempus est mitis cōplexionis cū vento septentrionis ꝛ ita foꝛtificat̄ humiditas ꝓpter solutionē glacierū p̱ solē ꝛ planetas retrogrados. Et si fuerint illic directi debilitatur signū humiditat̄. ❡ Qñ in vere retrogradant̄ in quarta autumnali est signū humiditatis tpis ❡ Qñ in vere retrogradant̄ in quarta hyemali

❡ Qñ in estate retrogradant̄ in quarta vernali est sūmus caloꝛ in parte septentrionali ꝛ pars meridionalis infrigidat̄ ꝛ venti calidi comburēt ꝛ consumēt herbas in parte septētrionali: ꝛ erit adhuc caloꝛ foꝛtioꝛ si cū hoc sint in frigido eccentricoꝛū suoꝝ. Et si fuerint illic directi oꝛiētales erit illa estas decoꝛa qꝛ tunc debilitat̄ caloꝛ ꝛ infrigidat̄ ꝛ mitigat̄ aura sua cū fuerit sol in angulo terre. Sꝫ si tunc essent occidentales esset illa significatio debilioꝛ: qꝛ post occasum solis appꝛopinquāt ad zenith capitum. ❡ Qñ in estate retrogradant̄ in quarta autūnali signū est caliditatis in illo tpe ꝛ siccitatis nisi ingrossabunt̄ venti meridionales. ❡ Qñ in estate retrogradant̄ in quarta hyemali signū est caliditatis illi⁹ hoꝛe ꝛ siccitatis sue. ❡ Qñ in autumno retrogradant̄ in quarta estiuali tunc soluent qd̄ sol congelauit in pte septētrionali ꝛ erit tempus varians cōplexionē ꝛ erunt venti septētrionales frigidi: ꝛ si fuerint directi tūc debilitat̄ caloꝛ planetarū: ꝛ erit gelu ad sūmū. ❡ Qñ in autumnali tpe retrogradant̄ in quarta autūnali multiplicabit̄ ventus septētrionalis vi caliditatis solis cū planetis ꝛ moliet̄ aer in parte septētrionali ꝛ ibi multiplicabit̄ humiditas ꝛ soluūt venti meridionales qd̄ ibi congelatum est Et si fuerint occidentales erit sūmū gelu in pte septētrionali ꝛ quiescent venti a meridie. ❡ Qñ in autumno retrogradant̄ in quarta hyemali

❡ Qñ in hyeme retrogradant̄ in quarta vernali

¶ Qn̄ in hyeme retrogradant̄ in quarta estiuali tūc est signū humiditatis: q2 tūc dissoluit nisi multiplicatus fuerit ventus septētrionalis. Et qn̄ erunt directi debilitabit̄ significatio humiditatis in illo tpe: precipue si fuerint occidentales a sole. ¶ Qn̄ in hyeme retrogradant̄ in quarta autumnali erit sūma humiditas in illo tpe: ⁊ erunt multi venti meridionales ⁊ cū hoc soluet sol gelu in septētrione. Si vo fuerint directi ⁊ occidētales significabūt magnā diminutionē humiditatis in illo tpe. ¶ Qn̄ in hyeme retrogradant̄ in q̄rta hyemali signū est humiditatis. Et si fuerint tūc directi signū est siccitatis. ¶ Qn̄ in vere ⁊c̄. Alkindus in 2°ca°. ¶ Itē nota p quartā talē uel talē intelligunt̄ tria signa que sol pagrat in eadez q̄rta.

Capl'm. 20. De associatiōe solis cū alijs planetis qd significāt.

Item si fuerit sol a capite capricorni vsq3 ad caput arietis ⁊ vn⁹ retrograd⁹ cū eo: erit humiditas pauca. Si duo erit humiditas formosa. Si tres erit humiditas addens. Si q̄ttuor tūc humiditas filiis diluuio forti. Et fortior in q̄rta vernali uel in capite cancri. Si vo nō fuerit quis retrogradus ⁊ nō erit in naturis suis de pte tēporū suorū significans humiditatē: erit siccitas quousq3 retrogradet̄ aliqs eo⁊ ⁊ fortius in siccitate qn̄ erit hec significatio in quarta autumnali existentib⁹ istis signatorib⁹ directis: Quia si inuenirem⁹ in illa q̄rta oēs planetas retrogrados aut tres aut duos aut vnū ⁊ postea dirigant̄ in quarta hyemali erit siccitas. Et si fuerint nature sue sicce erit siccitas fortis fm naturam eo⁊ q retrogradant̄ in q̄rta autūnali. Et si retrogradi oēs fuerint in ea ⁊ dirigant̄ in quarta hyemali signū est siccitatis in oīb⁹ mūdi climatib⁹ ¶ Itē si fuerit sol ⁊c̄. Alkindus in tertio capitulo.

Capl'm. 21. De cōbustis planetis quid significent.

Item dū cōburit̄ aliquis leuiū in q̄rta antumnali ⁊ fuerit direct⁹ signū est frigiditatis ⁊ gelu. Et cum cōburit̄ in hyemali significat nubila ⁊ ventos meridionales. Qn̄ autē cōburit̄ in vernali sigt̄ nubila Qn̄ vo in estate sigt̄ calliditatē fulgura ⁊ tonitrua. Et qn̄ cōburūt̄ pōderosi sūt hui⁹ significatiōis nisi q sūt debiliores. ¶ Itē dū cōburit̄ aliqs leuiū ⁊c̄. hoc Alkindus in. 4°ca°.

Capl'm. 22. De nā ⁊ q̄ntitate diuersa quartarū dierū ⁊ noctiū ⁊ q̄ q̄rta celi sit dextra ⁊ q̄ sinistra vocat̄

Scias q dies ab ortu solis ad meridiē est nature veris. A meridie vo ad occasū nature estatis. Ab occasu ad mediā noctē nature autūnalis. A media nocte ad ortuz nature hyemalis. ¶ Scias q dies ⁊c̄. Alkind⁹ in. 3°ca° ¶ Itē de hac materia dicit̄ in. 31° differētia sexti tractat⁹ introdu-

ctorij Albumazaris. ibi eni habet de naturis tēpoꝝ anni ꝛ ptiū dierū ꝛ quartarū zodiaci ꝛ ventorū. ¶ Dubitat quare nō oēm cōbinationē posuit alkindus. ¶ Itē quō planete supiores possunt esse cū sole retrogradi. Ad qō dicit Leopaldus ꝙ de supioribus nō pōt hoc fieri nisi ꝑ aspectus. ¶ Item sciendū ſm albumazar in. 28ᵃ differentia sexti tractatus sui introductorij ꝙ in oī hora efficiūt in circulo q̄ttuor quarte. sicut sūt q̄ttuor tpa anni. ꝛ. 12. domꝰ sicut sūt. 12. signa. Quarta igit ab ascendēte ad mediū celi ꝛ eiꝰ opposita sūt dextre ꝛ masculine. Alie vō sinistre ꝛ feminine. Sūt etiā ibi q̄ttuor anguli q̄ttuor succedētes ꝛ q̄ttuor cadētes. Itē ſm q̄ttuor quarte luminū siles suo modo q̄ttuor āni triplicitatibꝰ.

Caplm. 23. De locis pluuiarū in terra ꝛ de ꝓuincijs quibus signis subiecte sunt.

Ature temporū nō sūt in eadē vi in omni terra: imo augent uel diminunt ſm appropinquationez illiꝰ terre ab equinoctiali. ¶ Itē pars orientalis est sicca ꝛ occidentalis humida: meridionalis calida: septētrionalis frigida. Nature tēporū ꝛc. hoc habet in alkindo caplo. 5º. Item ps orientalis ꝛc. Ptolemeus in. 12º caº prime ptis. ꝛ habent etiā qualitates ſm istas ptes. ¶ Itē Ptolemeus satis concordat cū ista ꝑpositiōe nature tēporū in. 2º caº secūde ptis quadripartiti.

Caplm. 24. Per que loca terre fiunt pluuie.

Tem ciuitates in quibus fiunt pluuie sunt inter latitudinez. 9. graduū ꝛ. 60. graduū In alijs autē ꝓpt multitudinez caloris ꝛ frigoris nō fit nisi caloris siccitas ꝛ gelu. ¶ Item ciuitates ꝛc. Alkindus in. 5º. caº

Caplm. 25. Que loca terre cuilibet triplicitati subiecta sunt.

Item Trigonus arietꝭ ptinet ad angulū terre habitabilis inter septētrionē ꝛ occidens. Et eius primꝰ gubernator est iupiter ꝛ mars habet pticipationē cū eo. ¶ Trigonus tauri ptinet ad angulum qui est inter meridiē ꝛ oriens ꝛ eius primꝰ gubernator est venus ptceps vō saturnus. ¶ Trigonus geminorū ptinet ad angulū terre int septētrionē ꝛ oriens ꝛ gubernator eiꝰ primꝰ est saturnꝰ pticeps vō iupiter. ¶ Trigonꝰ cancri ptinet ad angulū qui est int meridiē ꝛ occidens ꝛ gubernator est mars. deinde pticipat cū eo venus. ¶ Itē Trigonus ꝛc. hoc a Ptolemeo in. 3º caº secūde partis quadripartiti.

Caplm. 26. De ꝓuincijs quibꝰ signis sint subiecte.

Tem sūt ꝓuincie. 72. cū. 12. signis concordantes ſm Ptolemeū ita ꝙ versus sinistrā sint ꝓuincie remote a medio habitationis ꝛ versus dextrā ꝓuincie ꝓpinque.

Aries britania salatia vescamica.
Taurus cornua media persia
Gemini organia armenia mananeus
Cancer nomdia cargadema africa.
Leo italia gallia apuleia cecilia
Uirgo babylonia algeziraetor.
Libra naquitrina cazqueda azonca.
Scorpio matagonitas marontania cantolia.
Sagictarius torcia calciata hispania.
Capricornus Jndia orbana iadiechia.
Aquarius zaromatica toxana acohod.
Pisces carmi a dogofonia catizomonicas ⁊ garatica.
♈ Josum andonia terre iudeorũ.
♉ toclad cablaz riperus asie minor.
♊ coriãta in armonica insanus egyptus.
♋ zoma tusquia quinginqua.
♌ caprica zallia oratiza.
♍ aloe alaya trozen.
♎ cays ananzes caladotica.
♏ corma comatza cadoquia.
♐ terra de arabia ꝓplata.
♑ braga magodonia albabiris.
♒ arania adama ⁊ anthiopia mediana.
♓ lodia galliquia tamalia.
Jtem iste ꝓuintie. hoc a Ptolemeo.
¶ Sciendum ꝙ in quolibet 4º terre sicut ꝓuincie que ꝓprie concordant cũ altero signo triplicitatis gubernantis illud quartũ ⁊ cũ planetis gubernantibꝰ. sꝫ hoc diuisimus qꝛ ꝓuincias ſm ista noia nõ bene cognoscimus nec ibi ꝑ quadripartitũ Ptolemei cõplementũ habemus. Quia etiã ꝑ modũ supradictũ poterimus cognoscere cũ quibus stellis seu planetis habuerũt concordantiã sufficiant illa que de ꝓuincijs scripta sũt. ¶ Jtem sciendũ ſm Ptolemeũ ⁊ haly in tertio caº secunde partis quadripartiti ꝙ si imagineť linea equidistãs equinoctiali ⁊ distans ab eo 36. gradibꝰ: Jtem imagineť linea transiens ꝑ polos mũdi intersecans lineã p̃dictam ⁊ distans ab occidente. 56. gradibꝰ. punctus intersectionis diciť medium terre habitabilis. Due autem linee predicte distinguunt angulos terre predictos. ¶ Secundũ igiť ꝙ aliqua ꝓuincia plus appropinquabit medio terre habitabilis ſm hoc plus participabit ut

gubernet a signo τ planeta qui gubernat quartū sibi oppositū cū adiu-
torio mercurij. ¶ Item sciendū q̄ p effectus possumus cognoscere pro
uincias τ villas cū signis τ planetis concordantes sicut p complexiões
τ mores hominū τ sic de alijs ut dicit Ptolemeus in fine secūdi capitu
li secūde ptis. ¶ Itē ex tertio capitulo secunde ptis sciendū q̄ stelle fixe
concordant cū puincijs fm illū gradū in quib⁹ sunt. Item in eodē capi-
tulo concordantes gradus cū matribus ciuitatū sunt loca in quib⁹ erāt
sol τ luna τ loca angulorū τ maxime ascendēs in principio sue edifica-
tionis. Et si hec sint ignota aspice ad mediū celi dñi illius ciuitatis qui
eā edificare mandauit. Hec autē duo vltima parū aut nihil faciunt ad
iudicia mutationis aeris s; forte plus facerent ad iudicia fortuniorū uł
infortuniorꝫ illius ciuitatis. ¶ Itē Albumazar ponit aliq̄ loca esse in
tantū calida τ alia intantū frigida q̄ ibi nullū cōponit aial in tertio tra
ctatu sui introductorij in tertia differentia. Itē nota fm eūdem in qnta
differentia tertij tractatus q̄ in terris duris τ densaruꝫ partiū τ in locis
montiū plus congregant venti q̄ȝ in terris mollibus.

Capitulū vigesimūseptimū.

I Tem aries habet τc. hoc in differentia quarta sexti tractat⁹ sui
introductorij. ¶ Item nota si placet sup illa ppositione. nature
temporū τc. sniam in. 5° ca°. Cum volueris scire quantitatē na-
ture temporis apud quam quartā volueris in qua ciuitate vsq̄ȝ
ad illam partē. Scias effectus calidorū τc. s. in eodem libello Alkindi
quinto capl'o. Item Albumazar in cōiunctionib⁹ magnis i vltima dif-
ferentia quarti tractatus τ hyspalensis in plurib⁹ locis. τ Alchabitius τ
haly abenragel τ plures alij fecerunt mentionem de istis terris sꝫ forte
alias poterunt poni cum pdictis q̄uis nō sit magna vis quere hoc.

Sequit secunda pars libri de iudicijs mutationū aeris p cōiunctiones
magnas τ eclypses τ introitum solis in punctis equinoctialibus τ a li-
js locis determinatis in zodiaco signorū.

Caᵐ. i. De pnoſticatiõe tẽperiei aeris ex ꝯiũctionibꝰ maximis planetaꝝ



Oniũctio maxima eſt cõiũctio triũ ſuperiorũ. ſi igitᷣ cõiunganᷣ in exaltationibꝰ ſuis ſignant aptationẽ aeris. Sed in caſibus ſuis ſignãt ſiccitatẽ ⁊ terre ſterilitatẽ. In ſigno autẽ aquatico multitudinẽ pluuiarũ. In aereo mnltitudinem ventoꝝ. In terreo ſupfluitatẽ frigoris. In igneo ſiccitatẽ: ⁊ hoc idem intellige de cõiunctione ſaturni ⁊ iouis ⁊ martis. ¶ Coniunctio maxima eſt cõiunctio triũ ⁊c̃. hoc meſſahalach in. 7º. 9º. 19º. ⁊. 11º. caplis.

Caplm ſecundũ.



Um fuerit ſaturnꝰ. ſ. i ſignis primarũ cõiunctionũ i quibus fiebãt ꝯiũctiones ſaturni ⁊ iouis ⁊ aſcendẽtibꝰ earũ aut piecerit radios ſuos ad ea ex oppoſitiõe uꝉ qrto aſpectu aut fuerit ĩpeditꝰ in ſignis terreis tenebras aeris ⁊ terremotũ faciet. Si in aereis niues ⁊ flatus ventoꝝ nocibiliũ ⁊ frigus. Si in aquaticis ſubmerſiões ⁊ diluuia ⁊ ꝺm quãtitatẽ fortitudinũ i loco erit euentꝰ. ¶ Cũ fuerit ſaturnꝰ ⁊c̃. hoc i floribus Albumazaris ſexti tractatꝰ terremotꝰ.

Capitulũ tertiũ.



Tẽ ꝯiũctio ſaturni ⁊ martis i ariete cuꝫ teſtimonio iouis ⁊ lũe ſigᷣt ſiccitatẽ ⁊ aliqđ ſignale i aere. Itẽ ꝯiũctio eoꝝ i tauro cũ teſtionio luminariũ iouis ⁊ veneris augmentũ aquarũ ⁊ flatũ ventoꝝ. Itẽ ꝯiũctio eoꝝ i cancro cũ teſtimonio luminariũ ⁊ iouis ſigᷣt in oĩbus horizontibꝰ ſiccitatẽ. Itẽ ꝯiũctio eoꝝ i leone ſigᷣt timorẽ ppter apparẽtiã ſignaliũ. Itẽ ꝯiũctio eoꝝ i virgine cũ teſtionio mercurij ſigᷣt tempeſtatẽ i ſeminibꝰ. Itẽ ꝯiũctio eoꝝ i libra cũ teſtionio iouis ſigᷣt rubedinẽ i aere i ãno illo. Itẽ ꝯiũctio eoꝝ i ſcorpiõe ſi cũ eis fuerit iupitᷣ ⁊ luna ſigᷣt multas pluuias in pluuialibꝰ locis ⁊ cõmotionẽ mariũ. Itẽ ꝯiũctio eoꝝ i capricorno cũ teſtionio ſolis ⁊ mercurij ſigᷣt multitudinẽ ventoꝝ ⁊ fulguꝝ Itẽ ꝯiũctio eoꝝ in aq̃rio cũ teſtionio lune ſigᷣt paucitatẽ aquaꝝ pluuiarũ ⁊ multitudinẽ nubiũ. Itẽ ꝯiũctio eoꝝ i piſcibꝰ ⁊ ſol fuerit infortunatꝰ ex ꝯiũctiõe eoꝝ ſigᷣt paucitatẽ roris. ¶ Itẽ ꝯiũctio ſaturni ⁊c̃. hoc in cõiũctionibꝰ magnis Albumazar) dria. 8ª 2ˡ tractatꝰ. ¶ Intelligendũ qꝺ

dicit. Cũ fuerit saturn⁹ in signis primarũ diũctionũ ꝛ ascendẽtib⁹ eaꝝ ꝛc̃ p sign a primaꝝ diũctionũ intelligo in qb⁹ fiebãt diũctiões saturni ꝛ iouis ꝛ si g̃ q̃ erãt in ascendẽtib⁹ eaꝝ diũctionũ. Sʒ quõ habet̃ ascẽdẽs taliũ cõiũctionũ dicit̃ ꝙ ascendẽs alicui⁹ magne diũctiõis ẽ ascendẽs ãni in q̃ fuit diũctio illa: q̃re de hoc ꝛc̃. ¶ Itẽ sciendũ ẽm haly in fine. 2ᶜ ptis q̃driptiti ꝛ ẽ ẽm hermetẽ ut dicit ꝙ q̃n diũgunt̃ due infortune i signo terreo ꝛ fuerint ipediti luna existẽte secũ sig̃t ꝙ erit terremot⁹ magn⁹ ꝛ ruina ciuitatũ ꝛ parietũ. Et si aqueũ erit dãnũ ꝛ forte nocumentũ in aquis ¶ Itẽ ibidẽ dicit̃ ꝙ caput draconis calidũ. cauda aũt frigida. Si saturnus se diũxerit cũ cauda dracõis hora significatiõis sig̃t ꝛ famẽ ꝛ forte frigus. ¶ Itẽ nota ẽm albumazar in dria. 2ᵃ p̃mi tractat⁹ de cõiũctiõib⁹ magnis ꝙ cõiũctio q̃ significauit diluuiũ fuit añ illud diluuiũ. 287. ãni Haomar dicit. 279. ãni. dñs orbis tũc satn⁹ cũ signo cãcri ꝛ fuit diluuiũ die veneris ꝛ fuerit ãni ade. 2226. vn⁹ mẽsis. 23. dies ꝛ. 4. hore. ¶ Itẽ ex textũ sic iueni scriptũ imediata diũctio saturni ꝛ iouis i ariete fuit añ diluuiũ p. 81. ãnos. ꝛ. 202. dies ꝛ in. 6ᵒ gradu ꝛ. 5ᵒ minuto arietis. ꝛ hoc significauit diluuiũ ꝛ sũt dies numero. 29767. ¶ Itẽ nota vn⁹ orbis cõtinet. 360. ãnos cuilibet gradui celi vn⁹ ann⁹. ¶ Itẽ numer⁹ dierũ a p̃mo die diluuij vsq; ad primũ diẽ xp̄i annoꝝ q fuit i die sabbati. 1132959.

¶ Itẽ nota ẽm Aristotelẽ in libro de ꝓprietatib⁹ elementoꝝ ꝙ diluuiũ quod fuit in terra non fuit nisi propter coniunctionem stellarum erraticarũ in piscib⁹ ꝛ vent⁹ q interfecit gentes in addramoch fuit ꝓpter cõiũctionẽ eoꝝ i geminis. ¶ Itẽ q̃uis diluuiũ pticulare potuisset significari p diunctionẽ planetarũ tñ diluuiũ vl'e nõ. sicut forte etiã bonitas ꝛ excellẽtia dñi nr̃i ihu xp̄i seu beate v̄ginis potuer̃t p stellas repñtari: ut in Ouidio de vetula aliq̃liter tangit̃ tñ ꝙ diuitas cũ humanitate cõiũgeret̃ hoc supnãlit̃ factũ ẽ. etiã vl'itas diluuij potuit miraculose eo incidere cũ tp̄e significatiõis nãlis diluuij pticularis. ¶ Itẽ sciendũ ꝙ diluuiũ primũ fuit in tp̄e Noe toto orbe terraꝝ cõtecto. 2ᵘᵐ diluuiũ tp̄ib⁹ iacob patriarche in achaia. tertiũ a tp̄e moysi in thessala cũ in mõte pnaso fugierũt hoies.

Capl'm. 4. De tẽperie aeris p eclypsim.

Cum fuerit eclypsis solis in signis igneis sig̃t siccitatem ꝛ terre sterilitatẽ. Et in aq̃ticis multitudinẽ pluuiaꝝ ꝛ decrementum ab eis nisi aspexerint fortune. Cũ fuerit eclypsis lune in signis frigidis sig̃t grauitatẽ frigoris ꝛ in aq̃ticis nimietatẽ pluuiaꝝ si adiuuat tẽpus. i. si fuerit hyems: si fuerit estas sig̃t tẽperamentũ aeris ꝛ sic de alijs. Cũ fuerit eclypsis solis i signis igneis ꝛc̃. messahalach i. 7ᵒ caᵒ. ¶ Cũ fuerit eclypsis lune in signis frigidis. hoc messalhaach i. 5ᵒ caᵒ

Capl'm. 5. De significatione eclypsis in qua pte terre τ qñ eueniet.

Item in puincia uel ciuitate cũ signo eclypsis concordan te maxime si fuerit ibi visibilis eclypsis erunt accidentia potissime que p eclypsim significant. ¶ Itẽ accidens du rat ƀm numerũ horaꝝ equaliũ duratiõis eclypsis p ãnos videlicet si fuerit solis. menses aũt si fuerit lune. ¶ Item principiũ accidentis erit ƀm qđ distat eclypsis ab ascen dente. Vbi gratia: si sit versus oriẽtẽ erit in q̃ttuor primis mensib⁹ τ erit maior fortitudo in termino primo totius durationis accidẽtis: τ si ver sus mediũ celi pricipium erit in alijs quattuor mensib⁹ τ maior fortitu do erit in termino medio: τ si fuerit versus occidentem principiũ erit in quattuor vltimis mensib⁹ τ erit fortitudo in termino postremo. Itẽ au gmenta uel decrementa accidentium veniũt in locis habentib⁹ in alijs accidentib⁹ rationẽ: uel in locis habentib⁹ cũ eis pticipationẽ in figura. Veniũt etiã augmenta accidentiũ uel decremẽta ƀm status essentiales τ accidentales planetarũ significatorũ τ ƀm pticipationẽ eorũ in figu ra cũ signis accidentia opantib⁹. Unde si significatores fuerint oriẽta les stantes veniet p eos augmentum. τ si occidentales τ sub radijs aut ascendentes prima nocte retrogradi veniet per eos decrementum acci dentiũ. ¶ Significatores autẽ eclypsiũ appellant illi qui habuerunt di gnitates essentiales τ accidentales in loco eclypsis τ angulo qui ẽ ante eclypsim: sicut sunt applicatiões τ ptinentie terre τ ƀm pticipationem fi gure: aut ꝙ fuerint dñi exaltationũ trigonorũ aut terminorũ τ hoc siue sit vnus ul' plures. Si tñ fuerint plures dñs loci eclypsis est ꝑponendus: si vo plures ibi habuerint equales dignitates ꝑponemus eũ qui magis fuerit ibi circa angulũ aut in suo haiz. Postea signatores in stellis fixis lucẽtibus sũt etiã considerandi τ illi qui sũt in signo eclypsis uel cũ an gulo qui fuerit ante eclypsim. Ultimo vo considerand⁹ est planeta q ho ra eclypsis fuerit cum ascendente uel cũ medio celi qualiscunqꝫ sit eorũ qui sequunt locũ eclypsis. ¶ Figure autẽ bestiarũ siluestriũ a parte se ptentrionali qñ habuerint fortẽ significationẽ in eclypsibus significãt ꝓprie terremotũ ruinã castrorũ τ motuũ aeris sine suspitiõe. a parte vo meridiei significãt cursũ ventorũ τ multitudinẽ pluuiarũ suo tpe. ¶ Itẽ in puincia uel ciuitate τc. hoc habet ex dictis Ptolemei τ haly. 5° ca° se cũde ptis. Itẽ accidẽs τc. hoc habet in ca° eiusdẽ ptis. Itẽ principiũ τc. hoc in ca° Itẽ augmenta τc. hoc a Ptolemeo in. 6° ca° eiusdẽ ptis. Si gnificatores τc. hoc totũ vsqꝫ ibi. Si igit saturn⁹. extrahit ex dictis Pto lemei in septimo capl'o secũde ptis quadripartiti.



Capitulū sextū. significatione significatorꝫ eclypsiū

Item si signatores tpe eclypsis fuerint in signis solstitiali bus uel equinoctialib⁹ significatio sua generaliter erit in statib⁹ aeris in ꝓprijs temporib⁹ illi signorū sicut ī ariete ī in vere: in cancro vo ī i estate ꝛ sic de alijs.

Caplm septimū De significatiōe almutez eclypsis: ꝛ de dignitatibus essentialibus ꝛ accidentalib⁹ que sint.



Si igit saturn⁹ fuerit solus gubernator signat dānū ꝓpter frigus niues magnas grandines ꝛ nubes spissas potissi me cū significatio eius fuerit in statu aeris. Si iupiter si gnificat temperiē aeris cū multitudie ventorū. Si mars sigt calorē ꝛ siccitatē ꝛ vētos calidos ꝛ corruptos ꝛ mor tales tempestates radios ꝛ radios qui dicit caristo cū paucitate pluuia rū. Si venus significat temperamentū aeris cū ventis humidis nutriē tibus. Si mercurius significat ventos turbinosos ꝛ festinos qui de leui mutant tonitrua coruscationes terremotus ꝛ relāpagos: ꝛ qñ abscōdi tur sigt minutionez in aquis: ꝛ qñ apparet auget. vnde qñ intrat sub ra dijs facit siccitatē ꝛ exit de sub radijs ꝛ ascēdit opat humiditatē. ¶ No tandū etiā ꝙ loca in quib⁹ mercurius facit siccitatē sunt qñ est in digni tatib⁹ planetarū siccorū aut cū eos aspicit aut qñ intrat sub radijs so lis ꝛ ecōtra autē est de humiditatib⁹. ¶ Si igit saturn⁹ ꝛc. hoc habet ex dictis Ptolemei in. 8° ca° secūde partis quadripartiti.

¶ Sciendū ꝙ multa alia sūt iudicia ꝑ eclypses que hic nō ponunt quia nō multū faciūt ad ꝓpositum. sꝫ de hoc specialē tractatū facere intendi mus ꝑ dei gratiā. ¶ Nota ꝭm haly in sexto ca° eiusdē ptis ꝙ ab horis tē poralib⁹ sciemus qñ erit accidens: ꝛ ab horis equalib⁹ quāto tpe dura bit: ꝛ ab ascendēte principij eclypsis sciemus principiū accidentis: ꝛ ab ascendēte medij qñ erit maior fortitudo: ꝛ ab ascendēte finis cōplemē tū. Et ab ascendēte diūctionis sciem⁹ planetā dñantē. ¶ Itē sciendū ꝙ ꝑ horas tpales cognoscim⁹ qñ erit accidēs: pꝫ ꝙ significatio eclypsis so lis nō pōt elongari vltra. 12. ānos. lune vo vltra. 12. mēses. ¶ Itē scien dū ꝙ si cū eclypsi solis fuerit aliq̄ cōiūctio magna uel ꝑua duplicabunt anni duratiōis ꝭm temp⁹ reddit⁹ illi⁹ cōiunctiōis uel oppositiōis uel al teri⁹ applicatiōis: ꝛ sic accidētia durāt denaria uel centenaria ul' mille naria annorꝫ. Si vo hoc fuerit cū eclypsi lune duplicabunt in menses. Vbi gratia. Si cū eclypsi solis fuerit cōiunctio saturni ꝛ iouis in ꝑncipio arietis ꝛ durauerit eclypsis ꝑ duas horas durabit accidens fere. 12000. ānorū ꝛ si lune tot menses. Uerū est tñ ꝙ in tanto tpe mutant accidētia

p similitudinē uel dissimilitudinem significationū eclypsiū & diūctionū cōmediarū &c. ¶ Itē sciendū q fortitudo maior fuerit in principio medio uel fine duratiōis ascendētis sm elongationē ab ascendēte ē regula generalis eclypsib⁹ cōiunctionib⁹ & oppositionib⁹ & cib⁹ applicationibus. ¶ Itē nota sup illa pticula. signatores &c. sm Haly. 7° ca° 2ᵉ ptis q dignitates essentiales planetarū sūt sicut dom⁹ exaltatio triplicitas terminus & facies. Accidētales aūt sūt applicatio sepatio oriētalitas occidentalitas masculinitas uel feīnitas. Aptio aūt cu3 sole & luna pticipatio in figura uel q sit cū eclypsi sup vno circulo uel sup duobus circulis eq̄distantib⁹ uel q habeat sitū talē qualē h3 eclypsis & hoc ē esse cum in vno circulo ex circulis q sūt eq̄distātes horizonti. Vbi grā: q si altitudo eclypsis versus orientē sit. 7. graduū q etiā ille planeta versus occidens habeat altitudinē. 7. graduū & hac manerie q habeat dignitates in angulo q ascendit añ eclypsim essentiales uel accidētales talis ē dñs eclypsis. ¶ Itē sciendū sm haly q angul⁹ añ eclypsim dicit ille q h3 transire p locū p modū equinoctij. ¶ Itē sciendū sm haly ibidem q si plures signatores fuerint equales in dignitatib⁹ pponendus est ille qui fuerit in angulo fortiori & generalit ille qui fuerit in suo haiz. ¶ Itē sm haly ibidem Ptolemeus noīauit signatores sic sole & luna q2 op⁹ eoꝝ reducit ad nām pdñantis. ¶ Itē sciendū sm haly ibidē q stelle lucētes de qb⁹ facit mētionē Ptoleme⁹ in. 5. pmis magnitudinib⁹. ¶ Itē sciēdū sm haly ibidē q angul⁹ añ eclypsim sup ptē occidētalis ab eclypsi & angulus q sequit eclypsim se ponet in loco eclypsis in motu firmamenti p quē facit diē & noctē. ¶ Itē sm haly ad figuras anguli anterioris & est q postea sequit aspicere nō oportet. ¶ Sciendū q ex dictis haly & Ptolemei habet q angul⁹ occidentis pfert medio celi & mediū celi ascendēti q2 si eclypsis sit supra terrā ascendēs nō pōt esse occidentalis ab eclypsi &c. q̄re de hoc. ¶ Itē p colores in eclypsib⁹ apparētes pōt fieri iudiciū: s3 de hac materia in fine hui⁹ poterim⁹ facere mentionē. ¶ Item in centiloquio Ptolemei & in hyspalensi fit mentio de eclypsib⁹ & alibi vide si vis placet mihi.

Ca. 8. De significatiōe marti hora reuolutiōis.



Si in hora reuolutionis anni mars fuerit in domib⁹ suis sigt multitudinē pluuiarū. Si i domib⁹ autē saturni paucitatē earū. In alijs autē mediocritatē earū. Si in hora reuolutiōis &c. hoc habet ab albumazare in florib⁹ suis in caplo Scia autē pluuiarū & in diūctionib⁹ magnis capitulo. Et ab hyspalensi capitulo primo.

Capitulū. 9. De sigtione saturni & reliquorū planetarū in singulis signis hora reuolutionis


Tem si saturn⁹ hora reuolutiõis fuerit in ariete ⁊ ei⁹ lati tudo fuerit septentrionalis sigt corruptionẽ ⁊ densitatẽ aeris. Si fuerit meridionalis grauitatẽ frigoris ⁊ gelu in suis tpib⁹. Saturn⁹ in tauro septẽtrionalis signat tẽpera mentũ: ⁊ pluuie erunt vtiles. meridionales vo corruptio nẽ aeris. Saturnus in geminis septẽtrionalis sigt vento rũ flatũ vehementiũ ⁊ terremotus. meridionalis paucitatẽ pluuiarũ q2 si cũ hoc occidẽtalis fuerit sigt siccitatẽ aeris ⁊ desiccationẽ fontiũ. Saturnus in cãcro: septẽtrionalis sigt paucitatẽ aquarũ in fluminib⁹ atq3 pluuiarũ. meridionalis mediocritatẽ. orientalis frigus tpe suo. occidẽtalis pluuias ⁊ ventos. Saturn⁹ in leone: septẽtrionalis multitudinem sigt pluuia℞. Saturn⁹ in virgine: septẽtrionalis sigt suauitatẽ ventorũ. meridionalis paucitatẽ pluuia℞ ⁊ cõsumptionẽ aquarũ fontiũ. Saturnus in libra septẽtrionalis sigt siccitatẽ aeris ⁊ calorẽ ei⁹ paucitatẽ pluuiarũ ⁊ cõsumptionẽ aquarũ. meridionalis vo suauitatez vento℞. Saturnus in scorpiõe: septẽtrionalis sigt multitudinẽ pluuia℞ ⁊ abundantiã aqua℞ fluminũ. Saturn⁹ in sagictario: septẽtrionalis sigt multitudinẽ aqua℞ fontiũ ⁊ frig⁹ hyemis. Saturn⁹ in capricorno: septẽtrionalis sigt tẽperamentũ aeris. meridionalis tenebras aeris tpe hyemis nubes atq3 frig⁹. occidẽtalis calorẽ. Saturn⁹ in aquario: septẽtrionalis signat multitudinẽ pluuia℞ grandinẽ frigus ⁊ gelu. meridionalis paucitatez aqua℞ fontiũ ⁊ fluminũ. Saturn⁹ in piscib⁹: septẽtrionalis sigt multitudinẽ flatus vento℞ septẽtrionaliũ ⁊ grauitatẽ frigoris hyemis. ¶ Jupiter in ariete: septẽtrionalis bonã cõplexionẽ aeris ⁊ paucitatẽ pluuia℞ meridionalis corruptionẽ vento℞ ⁊ grauitatẽ eo℞. Jupiter in tauro septẽtrionalis signat imobilitatẽ aeris ⁊ calorẽ. meridionalis abundantiã pluuia℞ ⁊ aqua℞ fontiũ. Jupiter i geminis: septẽtrionalis bonitatẽ vento℞ mediocritatẽ pluuia℞. meridionalis multitudinẽ tonitruo℞ ⁊ fulminũ. Jupiter i cancro: septẽtrionalis bonitatẽ aeris ⁊ abundantiã pluuia℞ tonitruo℞ ⁊ fulminũ. meridionalis pulchritudinẽ aeris. Jupiter i leone: septẽtrionalis grauitatẽ tonitruo℞ ⁊ fulminũ. meridionalis siccitatẽ aeris ⁊ paucitatẽ pluuia℞ Jupẽ in virgine: septẽtrionalis sigat paucitatẽ tonitruo℞ ⁊ fulgurũ ⁊ mltitudinẽ pluuia℞. Si meridionalis pulchritudinẽ aeris. Jupit i libra: septẽtrional sigt multitudinẽ vẽto℞ occidẽtaliũ. meridionalis paucitatẽ pluuie. Jupit i scorpiõe: septẽtrionalis bonitatẽ vẽto℞. meridionalis multitudinẽ tonitruo℞. Jupit i sagictario: septẽtrional bonitatẽ aeris. meridional paucitatẽ pluuia℞. Jupit i capri. septẽtrional multitudinẽ tonitruo℞ ⁊ pluuia℞ ⁊ fulgurũ

Jupiter in aquario septẽtrionalis tenebras aeris ꝛ multitudinẽ plu-
uiarũ. meridionalis multitudinẽ tonitruorũ ꝛ fulgurũ. Jupiter in pisci
bus septẽtrionalis significat multitudinẽ aquarũ fluminũ ꝛ fontiũ. me
ridionalis multitudinẽ pluuiarũ ꝛ paucitatẽ tonitruorũ ꝛ fulminũ.
¶ Mars in ariete septẽtrionalis signat calorẽ aeris ꝛ paucitatẽ pluuia
rũ. meridionalis grauitatẽ tonitruorũ ꝛ fulminũ. Mars in tauro septẽ
trionalis multitudinẽ pluuiarũ ꝛ bonitatẽ herbarũ. meridionalis mul
titudinẽ tonitruorũ septẽtrionaliũ. Mars in geminis septentrionalis
multitudinẽ pluuiarũ. meridionalis paucitatẽ aquarũ fontiũ ꝛ flumi-
nũ. Mars in cancro septentrionalis paucitatẽ aquarũ fontiũ ꝛ multi-
tudinẽ frigiditatis in tp̃e suo. meridionalis flatũ ventoꝝ. Mars ĩ leone
septẽtrionalis paucitatẽ aquarũ: directus flatũ ventorũ occidentaliũ.
Mars ĩ virgine
Mars ĩ libra septẽtrionalis multitudinẽ tonitruorũ ꝛ fulminũ. Mars
in scorpione septẽtrionalis paucitatẽ aquarũ. meridionalis multitudi
nem aquarũ fontiũ. Mars in sagictario septẽtrionalis bonitatẽ ꝛ pul-
chritudinẽ. Mars in capricorno septẽtrionalis multã niuẽ cũ frigore
nimio. meridionalis calorẽ. Mars in aquario septẽtrionalis multitu-
dinẽ frigoris ꝛ niuis. meridionalis grauitatẽ caloris specialiter retro-
gradus. Mars in piscibꝰ septẽtrionalis significat bonitatẽ cõplexionis
aeris. meridionalis Jtẽ si saturnꝰ hora reuo-
lutionis ꝛc̃. hoc extrahit ab Albumazare in floribꝰ suis capl'o tracta
tus in ꝑtibus latitudinis ꝛc̃. ꝛ in duobꝰ sequentibꝰ capl'is. dicit etiã in
fine illorũ capitulorũ ꝙ de inferioribꝰ nõ facit mẽtionẽ qꝛ suos effectꝰ
nõ est ita exptus sicut de tribꝰ supioribꝰ. Capitulũ decimũ.

ITẽ in reuolutiõe anni si plures planete fuerint cõiũcti ĩ signis
aq̃ticis sig̃t multitudinẽ pluuiarũ. Jn igneis sup̲fluitatẽ caloris
siccitatẽ ꝛ terre sterilitatẽ. Jn aereis multitudinem ventoꝝ. Jn
terreis gelu atq; niues. Sĩlĩter in q̃rtis ãnis cũ fuerit ĩ signis fri
gidis sig̃t grauitatez frigoris. ¶ Jtẽ cũ mars fuerit dñs q̃rte estiualis ꝛ
fuerit in aliq̃ domorũ mercurij sig̃t multitudinez pestilentiarũ. Et scito
ꝙ grauitas siccitatis ꝛ terre sterilitas ꝛ penurie ãnone nõ fit nisi ex con
iũctione planetarũ ĩ signis igneis ꝛc̃. Jtẽ in reuolutiõe ãni ꝛc̃. hoc mes-
sahalach in. 4º ca.º ¶ Jtẽ in reuolutiõe ãni si saturnꝰ fuerit ĩ signo terreo
ꝛ nõ fuerit planeta beniuolꝰ aspiciẽs ipsũ ꝛ fuerit luna ĩ aspectu q̃rto ul'
opposito cũ ipso tũc sig̃bit sup̲ terremotũ magnuz in q̃libet loco in cuiꝰ
signo fuerit saturnꝰ aut in aliq̃ angulorũ signi terre. Jtẽ in reuolutione
ꝛc̃. hoc Abraham secũdo capitulo. ¶ Jtem in reuolutiõe anni si mars
fuerit in signis calidis addet caliditatem: saturnus autẽ minuet: sꝫ qñ

saturnus est in terreo addet frigiditatē. mars vō minuet. Mars autem i aereo addet caliditati sue. saturn⁹ vō minuet ex ea. Saturn⁹ in aqueo addet frigiditatē. mars minuet eā. Itē in reuolutione rc. hoc Alkindus 8° caplo. ¶ Item in reuolutione inspice dn̄m anni r lunā r partē fortune r dn̄m partis r tardagotū r quis habuerit dominiū sup omnes. Si saturnus venus r luna r mercurius: erit pluuia anni multa maxime si fuerit in signis pluuiosis in aquario aut i fine capricorni r arietis r tauri r principio leonis. Amplius illis scorpio piscis r aquari⁹ rc. Item in reuolutiōe rc. hoc Alkindus. 8° caplo. ¶ Amplius sub anni cōuersione mars in scorpione venerē respiciens imbrib⁹ emanat. venus autem in scorpione existens a marte respecta ꝓpter maria que scorpio habet pluuiarū facit iudicium. Si vō martis aspectu careat ex relicto ducato nō erit multarū imbriū vbertas. Itē venus r luna r mercuri⁹ sub anni cōuersione in locis pluuiarū earū aufert redūdātiā. ¶ Sūt pluuiarū loca vtraqꝫ domus saturni. earūqꝫ opposita leo videlicet r cancer. de quorū numero pisces itidē erūt ꝓpter riuos quos habent r flumina. r sagictarius ꝓpter maria que in eius extrema sūt uel existunt. r scorpio ꝓpt̄ sua loca r littora. Luna itaqꝫ applicans veneri in eisdē locis imbres p̄tendit futuros. Sūt autem paucorū imbriū signa taurus r gemini. verūtn̄ tauri principiū r arietis finis ꝓpter nubes quas i pluuias iudicant. non minus quoqꝫ virgo r libra modicas habent pluuias. capricornus autē plus habet frigoris r siccitatis q̄ꝫ pluuie: nec in ipso fient imbres. r nisi luna de ipso stellam in loco aquarū respiciat. Uenus r mercurius sub lumine martisqꝫ aspectu. Mars ipsi lune lumen ab eis resecat r ꝓhibet nisi inquit cōuēt⁹ uel oppositio sint in ipso sic nec pluuias affert. ¶ Amplius rc. hoc in illo libro qui incipit. Cū multa rc. ¶ Item sub anni cōuersione r quartarū eius scias ascendēs r vtrū luna sit in signo frigido uel calido uel humido uel sicco rc. planete applicantes rem coartantur maius q̄dē iudiciū pluuiaꝝ si dn̄o circuli qui post lunarē collocat̄ r descendenti applicās imbres apportat multimodas. ea etiā marti applicante si aūt ab eadē recedēs veneri applicet pluuias efficit r rores. Eadem q̄qꝫ a ioue recedēs cū mercurio facta applicatione: uel dū saturnū relinquit soli applicans nō aliud dabit iudiciū. Potior quoqꝫ que diximus de oppositiōe r in signis que aquas significāt facta applicatione: Cuiusmodi sūt aquari⁹ leo r scorpio in gradib⁹. s. eorūdē. Itidē etiā in geminis r sagictario cōuentu itaqꝫ aut respectu forti deprehēso r luna in domo ꝓpria saturno applicans aut in piscib⁹ veneri aut in aquario cū venere r mercurio imbres vtilissimos r multiplices iducit. ¶ Item

sub anni cõuersione &c. in hoc libello qui incipit Cũ multa &c. ¶ Item in ingressu solis in scorpionẽ si fuerit venus orientalis: in ãni principio multos: in fine vo paucos denunciat imbres. occidentalis vo econtra. Soli etiã i eodẽ signo coniũcta: anni & mensis illi⁹ in quo cõueniũt principia imbrib⁹ emanant. Qđ si de venere aliter accidat dum sol arietis exordia ingredit̃. oriente cõstituto ceterisq; cardinib⁹ firmatis que oriẽtalis termini dominiũ vendicauerit stella: hec beneficia pluuiarũ p totum annũ administrat. Ueneris itaq; & mercurij & lune aut ptis alteri⁹ cum eadẽ applicatio uel cõuentus dum tres he stelle in signis morent̃ aquaticis. aut luna alteri applicat dũ nulli duarũ applicet imbres multiplicat. Mercuri⁹ etiã a marte corruptus aut sub adustione consistens & luna eidẽ applicans: primo paucas: medio multas nõ tñ sine fulgure & tonitruis & aeris corruptiõe adducit pluuias. ¶ Rursum eo anno pluuie rarescũt quotiens luna cum marte fuerit: aut eidẽ venus applicet: & aut forte sit a dusta: luna iterũ cum sole aut marte: aut si saturno mercurius applicet & luna eorũ alteri in anni principio pluuie redũdant: in fine vo minuunt̃ nubiũ densitate facta & etiã aere corrupto. nam ioue in signo aquatico existente dũ venus & luna eidẽ applicent: eo anno multos: sz martis cum eo applicatio pauci. Amplius orientalis dñs qui & ipse toto anno imbriũ gaudet dñatu & cardine fortunatis applicans totum annũ reddit pluuiosum. Ipse nanq; a marte corruptus idẽ cum eo signũ obtinens dũ tñ luna marti applicet: nubib⁹ multis & paucis manabit imbrib⁹. Signũ iterũ in quo cõueniũt si est aereũ: & luna sit eidez applicata rores multiplicat & nebulas. Qđ si idem mercurius imbrib⁹ fruat̃ dominio & ipse corruptus: graues & multos eodẽ ãno nũciat imbres. Sicq; corruptio ex ventis & nubib⁹ generat̃. Si autẽ hic fuerit iupiter q̃uis corruptus & si pauce sunt nulla tñ aeris erit corruptio. Uenus autẽ hanc dignitatez vendicans & marte infelice uel adusto absq; imbriũ stilla nebulas exauget & rores. Mars item eadez potius dignitate paucas pluuias pauciores rores inducit. Saturnus itidez & si paucis humectet imbrib⁹ nebulas frequenter miscebit: in signo tñ discurrẽs aquatico moduz pluuijs adhibebit. & adhuc p̃scripti dñi beniuolentia nubib⁹ accident nõ vlla quoq; industria venerẽ mercuriũ & lunã eorũq; p̃scriptos effectus necesse est. Alterna nãq; eorũ applicatio rores multiplicat aut detrahit luminari applicatione cũ fortunatis & infortunatis deprehensa. Imbriũ quidã ꝓhibitio a marte sole & saturno ꝓcedit. Saturnus tamen in aquaticis pl uuias inducit. ¶ Item in ingressu solis. hoc Haomar.

¶ Sole itaqꝫ primū libre ⁊ capricorni punctum ingrediente oriens fir mec̄ nō minus quoqꝫ stellarū loca ꝑscrutari necesse: quibꝰ diligenti obseruatiōe ꝑquisitis si que sit veneris ⁊ mercurij ⁊ lune applicatio sꝫ etiā martis locus ⁊ cui applicet mente ꝑuigili notandū est. nubiū eni obductio: ⁊ roris beneficiū: pluuiarūqꝫ modus iuxta omnē stellarū applicationē: sicut de principio anni dictuꝫ est: poterit deprehendi. Sole itaqꝫ primū ⁊c̄. hoc haomar ⁊c̄. Capitulū vndecimū.



Tem si saturnꝰ prefuerit significatori āni absqꝫ respectu martis uel alteriꝰ: erit sup̄fluitas frigoris in hyeme i vniuersis regionibꝰ frigidis septētrionalibꝰ. ⁊ regiōes vltra modū calide tēperabunt̄: ⁊ fortificabit̄ in frigiditate ⁊ siccitate cū fuerit ascendens in circulo sue augis. ¶ Mars cū prefuerit significatori āni tꝑabit̄ frigꝰ hyemis in regionibus septētrionalibꝰ. ⁊ oꝑabit̄ partē huiusmōi cū in hyeme iuentꝰ fuerit in signis septētrionalibꝰ ⁊ in estate in meridionalibus erit sup̄fluus calor interimens aialia. ¶ Itē si saturnꝰ ⁊c̄. hoc in dria q̄rti tractatꝰ Albumazaris. ¶ Itē cū intrat sol librā. si venus sit sub luce solis ⁊ cū hoc sit occidentalis: pluuia erit multa in exordio: i fine autē pauca. Si autē orientalis ⁊ visibilis erit pluuia econuerso. Si v̄o fuerit actualitas sua post illā horā ꝑ mensē ⁊ dimidiū: significat multā pluuiā in medio āni: ⁊ quanto erit plus vnꝰ sub radijs plus mutabit̄ aer ad pluuiā. ¶ Itē cū intrat sol librā ⁊c̄. hoc Alkindus. 8ºcaº hoc idem hyspalensis.

¶ Item sub ingressu solis in libraꝫ venus ante solē minꝰ. 30. gradibus discurrens ⁊ directa hyemis principia pluuijs humectat. Si v̄o nec ab inuicē distiterint circa finē ad ipsuꝫ ꝓmittit. Si v̄o maior q̄ꝫ. 30. graduū fuerit distantia hyemis principiū frigore sꝫ paucis redundat imbribus donec interiectū spaciū ad minorē redeat quantitatē quotiēs autē suo cursu minor vno signo attendēda erit distātia annꝰ ille multiplices habebit pluuias maiorē quoqꝫ imbriū abundantiā solis ⁊ veneris in eodē signo generat ꝓgressus. ¶ Itē sub ingressu solis ⁊c̄. hoc in libello Cū multa ⁊c̄.

¶ Item anni pluuiosi status ab ingressu solis in librā vsqꝫ ad. 20. scorpionis gradū nō minꝰ a luminari applicatione cū ceteris stellis potissimū dependet. Stella igit̄ cui luna applicat orietalis existens. finē anni uel mensis aut etiam ebdomade monstrat pluuiosū. occidentalis nāqꝫ predictorū initia imbriū beneficio decorat. Hec tamē applicatio ꝓprie cum venere facta ⁊ mercurio que dicta sunt minuunt. Alia nāqꝫ orientalis ⁊ altera occidentalis dum luna eisdem applicatur cōes ꝑ totum annum necnō maximas denotat pluuias. Imbrium nanqꝫ multitudo

dum venus et mercurius scorpiū capricornū aquarius et pisces ingredi festināt pcipue manat. Sz etiā eorū cū luna de locis humidis nō sine respectu applicatio: cū ita se habeant pluuias generales iutiles ostendūt Luna quoqz alteri applicāte dū alterā luna respiciat quādiu respect⁹ inerit donec ab altera sepe͂t nō aberit imbriū multitudo. Luna itidē cum saturno applicans molles et suaues pluuias sz etiā quietas ostēdit et nebulas obscuras et nigras. Si vo marti imbres et tonitrua et coruscationes apportat plerūqz petras et grandinē et nubes croceas et ruborē desup et candorē habentes. Mercuri⁹ qdē hui⁹mōi assumpto ducatu pluuias ventoꝝ rabiē eorūqz asperrimos nūciat discursus: nubes etiā incōtinuas et dispersas croceas quoqz et fumi colorē habentes inducit. Sol autē si huiusmodi ducatuz assumat: guttas grandines et nubes croceas portendit. Uenus aūt eodē assumpto pluuias molles et cōtinuos rores multos imbrib⁹ similes pfecto generat. Jupiter serenū et ventos habet ppitios. Nō aliter quoqz ceterarū stellaꝝ adinuicē facta cōmunitas siue mixtio cōem ut supradictū est exhibet efficatiā. Sz illarū etiaz ducatos alternos: que nubiū colores et aeris variationes. His pmit⁹ cōpensatis p totū annū cū difficultate remota spectare licebit. ¶ Itē Anni pluuiosi etc. hoc Japhar etc. ¶ Item notandū q qn̄ sol ad primū gradū scorpionis puenerit si mercuriū et venerez orientales esse contigerit pluuias in principio anni futuras nulli sit hesitatio: potius quidez si luna crescens lumine in austrū descendat venerē et mercuriū respiciens aut saltē dum ab altero sepa͂t alteri applicet et vndiqz recepta: sic eni sub anni pricipio pluuias indubitanter adducit. Utriusqz rursū occidentalitas et lune cū vtroqz uel saltē alteruter applicatio et ipsa occidētalis videlicet sub mensis principio ad septimū uel ad octauū diem ascendat et post solē vadat ad occasum: et ipsa etiā descendens cursu velox et luce crescens imbres i fine āni ptendit futuros. Si vo lunā et huiusmodi stellas a dn̄is domorū suarū uel regnorū recipi cōtingat ex multiplici imbriū nec inutili redundantia fruct⁹ et victualiū serua͂t vbertas. Itē notandū q qn̄ sol etc. hoc in libello Cū multa. ¶ Item cū sol intrauerit. 20. gradū scorpionis apta ascendens angulos et planetas illa hora: postea aspice iouē venerem et mercuriū: et si omnes tres inueneris occidētales aut retrogrados iudica q illo anno erūt multe pluuie et humiditates. Et si oēs inueneris orientales et directos et multi cursus significat q illo anno erūt pauce pluuie et humiditates. Postmodū aspice martē et si eū inueneris i aliquo angulorū maxime in medio celi in aliquo signorum aereorū et habuerit aliquā cōmixtionē cū mercurio signat tonitrua coruscationes et

pluuias dānabiles τ fortes que veniūt vna hora τ postea recedunt τ si-
gna i locustas τ damnū in aere. Et si mars fuerit in aliquo siguorū ter-
reoꝝ i angulo terre τ fortune fuerint appodiate τ habuerit cōmixtionē
cū mercurio signat terremot⁹ τ apparitionē igniū in aere τ res expaue-
scendas τ damnū in mineris τ sulphuratis terris. Et si mars fuerit i an
gulo terre in signis igneis signat combustionē aeris in terra τ damnāť
omnes ꝓprietates terre τ minere τ damnanť τ comburunť messes. Et si
fuerit mars in angulo terre iu signo aqueo i aquis diminutionē signat
τ damnum in eo toto qđ est in illis de aīalibus τ aliis rebus. Et si fortu-
ne habeant cōmixtionē cum eo minuūt τ ꝓhibent damnū tonitruorū τ
coruscationū in illo anno. Et si fortune cum illo nullā cōmixtionez ha-
buerint tonitrua τ coruscationes faciūt damna in illo anno τ erunt ra-
dij multi. ¶ Et si vice martis in hoc fuerit saturn⁹ τ fuerit in medio celi i
aliquo signorū aereorū τ habuerit cōmixtionē cuz mercurio τ fortune
ab eo remote fuerint signat damnū in aere τ multas pluuias damnabi
les τ durabiles que nō abscindenť. Et si saturnus fuerit in angulo sicut
p̄dixim⁹ τ in signis terreis τ habuerit cōmixtionē cum mercurio τ fortu
ne ab eo remote fuerint: accident terremotus τ apparebūt sup terram
aque magne τ similia. Et si fuerit in signis aqueis τ in angulo terre τ
fortune ab eo remote fuerint τ habuerit commixtionem cum mercu-
rio minuenť aque in puteis τ damnantur omnes res que moranť in
aqua de aīalibus τ alijs rebus. Et si fuerit in signis terreis τ sub terra τ
fortune remote ab eo fuerint τ habuerint cōmixtionē cū mercurio sigt
damnū in terra τ ꝓprietatib⁹ suis τ minerijs: τ si mercuri⁹ nō habuerit
cōmixtionē cum eo erunt signationes p̄dicte tñ minores τ leuiores. Et
habuerit cōmixtionē fortunarū misce signatores anni τ temperabiť: τ
etiā minuenť damna que diximus. ¶ Itē cum sol intrauerit 20. τc̄. hoc
haly in. 20°. ca° octaue ṗtis. Idem in libro haomaris: τ in. 6°. τ. 8°. capitu-
lis Alkindi. ¶ Item in introitu solis in. 20. graduz scorpionis rectifica
ascendēs τ locū lune τ alias stellas τ vide vtrū luna veneri applicet uel
mercurio: veneris igiť mercurij orientales pluuias sub anni principio:
occidentales sub fine largiť. luna eni lumine addens τ cōpoto imbres
multiplicat vtrūqꝫ vo decrescens remissius. ¶ Itez in introitu solis τc̄.
hoc in libello Cum multa τc̄. ¶ Item cū sol ingrediť signum tropicum
venus in signo aquatico τ luna extra aquaticū discurrente respecta eo
tempore modicas insinuat imbres sꝫ de aquatico respiciens eoꝝ por-
tendit redūdantiā. Item cū sol ingrediť τc̄. hoc haomar τc̄.
¶ Sole itidem in. 18. graduz scorpionis oberrante venus in aquaticis

vsq3 ad submersionem pluuias generat. In signo humido mediocres. In sicco modicas. ¶ Sole itidē rc̄. hoc haomar rc̄.

Capitulū. 12. De parte pluuiarū.



Amplius sub anni ↄuersione r quartarū ei⁹ in princi pio mensiū luminariū que cōiunctio duoꝝ luminariū. Pars pluuie semꝑ est notandū: ea nāq3 de die a luna advenerē In nocte v̄o ecōuerso ē assūpta r a sole sumpto exordio sub numeri terminatiōe ꝑfectio occurrit In loco igit̄ pluuiarū repta annuz iudicat pluuiosum. luna quoq3 dū ad martē ꝑueniet imbres die ipsa addiderūt r devenere nō aliud erit iudiciū. ¶ Amplius sub anni cōuersione rc̄. hoc in libello Cū multa rc̄.

¶ Uenus itidem retrograda r sol in ariete uel tauro ver iudicat pluuiosum. Item ipsa retrograda existens dum sol in capricorno uel aquario cōmorat̄ hyems illa erit paucorū imbriū. Hec oīa sub anni cōuersione notanda occurrunt. Item ipsa retrograda dū sol capricornū aquariuz uel pisces ꝑambulat orīētalis in vere facta imbres modicos iudicat s3 hyemis principiū multis humectat pluuijs. Naz si in hyeme orientalis existat eius initia rores. Ultima v̄o plurib⁹ redūdabit imbrib⁹ nisi stella quelibet soli discurrat affinior. ¶ Uenus itidē rc̄. hoc in libello Cuz multa rc̄. ¶ Item estiuo tꝑe cum sol ingredit̄ terminū martis fit ī estate estus. in hyeme v̄o paucitas pluuiarū. ¶ Item estiuo tꝑe. hoc in floribus hermetis. ¶ Item sole in signis septētrionalib⁹ cū marte facit calorem maximū. In hyeme cū saturno frigus magnū. ¶ Itē sole in signis rc̄. hoc in libro Almansoris. ¶ Ad euidentiā ꝑdictoꝝ sciendū est quare habeat̄ dn̄s anni q̄re hoc. ¶ Itē querit̄ vtrū possum⁹ habere ascendens r alios angulos hora introit⁹ solis in arietē uel aliud signū. q̄re hoc.

¶ Itē dubitat̄ vtrū ann⁹ ille incipiat ab introitu solis in librā qn̄ fit obseruatio introitus solis in eodē signo. Et dicit̄ ꝙ in principio anni erūt multe uel pauce pluuie. ¶ Item dubitat̄ vtrū primus gradus scorpionis r vigesimus gradus eiusdez magis debeant quoq3 obseruari q̄3 alij gradus zodiaci. ¶ Item quando saturnus fuerit in directo arietis aut in eius triplicitate in principijs reuolutionū r ipse fuerit almutez. directi cursus in angulo signat multas pluuias r paucum frigus. sed cū fuerit non in angulis r aspexerit ascendens r receperit dispositionem lune r martē signat vehementiā frigoris bestias perimentis. Similiter autē cū fuerit cadens ab angulis nec aspexerit ascendens r fuerit directus. Si v̄o fuerit in geminis uel eius triplicitate r fuerit dn̄s anni in angulo directus signat fortitudinē flatuū ventorū septētrionis r vehementiam

frigoris & paucitatē pluuiarū. Et si fuerit retrogradus signat terremot⁹ specialiter si sit in angulo quarto. quod si nō fuerit dñs anni & fuerit in angulo q̄rto respiciens dispositionē dñi ascendentis multi hoīes morient̄ causa illorū terremotuū. Et si nō fuerit in angulo & ascendēs & directus signat multiplices flatus euri & zephiri & magnā frigiditatē hyemis cuꝫ terremotib⁹. Et si fuerit retrogradus signat infirmitates aduenientes hominib⁹ ex ventis & humiditate etiā motuū terre. Et si fuerit directus nō aspiciens ascendēs signat flatū ventorū & leuitatē eorū & vehementiam frigoris in terra signi in quo fuerit. Et si fuerit retrogradus signat flatuꝫ ventorū incessanter & fortitudinē eorū. ¶ Et si mars fuerit in hac triplicitate dñs anni nō aspexerit ascendens. & si directus signat destructionē vegetaliū causa valitudinis ventorū. ¶ Si vero saturn⁹ fuerit in cancro & eius triplicitate dñs anni in angulo directus & mars cadens ab eo siḡt vehementiā frigoris. Et si nō fuerit in angulo & aspexerit ascendēs & directus signat multas pluuias & frigus. Et si fuerit retrogradus & aspexerit se cum marte & fuerit fortune ab eo cadentes augmentabūt frigus & aquas. Item quando saturnus. hoc Albumazar.

Capitulū. 13. De ascendente signo in reuolutiōe anni qd significet.

Item cū fuerit ascendens alicuius temporū reuolubiliū aries aut puenerit ad eū anni. ab aliquo predictorū locorū signat quod in ciuitatibus in quib⁹ fuerit almuteꝫ flabūt venti orientales & occidētales cū temperantia aeris q̄rte septentrionalis aut q̄rte extreme & erit autumn⁹ ei sil'is in qualitate & vehementia frigoris in hyeme & augmentuꝫ fluminū & siccitatis & fames in armenia. ¶ Cum fuerit taurus ascendēs &c. sicut dicit̄ de ariete signat ibi flatū venti orientalis & occidentalis cū vehementia frigoris quarte vernalis: & bonā complexionē aeris quarte autūnalis & erit quarta hyemalis calida: & multiplicabūtur niues in medietate eius & corroborabitur frigus & fient pluuie pauce & tonitrua & fulgura cum casu grandinis cum extensionib⁹ mariū &c.

¶ Cum gemini fuerit ascendens &c. erunt venti calidi in quarta estiuali & retentio aeris in quarta autumnali & multe pluuie in hyemali. Itē signat multa tonitrua coruscatiōes & ventos orientales precipue in parte meridionali. ¶ Cum fuerit cancer ascendens &c. cū frigiditate quarte vernalis & mediocritate aeris quarte estiualis: & multos flatus ventorū occidentaliū & aqueductus frigus vehemens in quarta hyemali & temperamentū quarte autumnalis.

¶ Cum fuerit leo ascendēs &c. signat aerem tenebrosū horā post horā

cum mediocritate aeris q̃rte vernalis ⁊ declinabit ad frigus ⁊ erit vehe mens calor in quarta estiuali ⁊ flabit ventus occidentalis in fine ei⁹ incessanter ⁊ erunt multe pluuie ⁊ forte frigus in quarta hyemali ⁊ pauci venti in fine eius ¶ Cum fuerit virgo ascendens ⁊c̃. signat q̄ erit aer tenebrosus in hora post horam in quarta vernali plurium pluuiarũ ⁊ incessanẽ flatus ventorũ septentrionaliũ ⁊ vehementiũ ⁊ ꝓsperabitur aer quarte estiualis ⁊ erit quarta autũnalis mediocris ⁊ principiuꝫ quarte hyemalis mediocre ⁊ finis eius vehementis frigoris. Et flabunt cũ eo venti septentrionales cũ augmento pluuiarũ. ¶ Cum fuerit libra ascendens ⁊c̃. obscurabiẽ aer in hora post horã ⁊ multiplicabiẽ flatus ventorũ calidorũ vehemẽẽ in quarta estiuali ⁊ equalitas erit quarte autumnalis ⁊ mediocritas quarte hyemalis. ¶ Cum fuerit scorpio ascendẽs ⁊c̃. accident in aere tenebre in hora post horã ⁊ pluuie multiplicabunẽ ⁊ erit quarta vernalis calida ⁊ nubes erunt pauce in ea ⁊ pluuie ⁊ ventus ⁊ frigus ⁊ erunt estas ⁊ autumnus: ⁊ corroborabiẽ frigus hyemis ⁊ flabũt in medietate eius venti occidentales ⁊ multiplicabunẽ in ea pluuie ⁊ aqueductus magni. ¶ Cũ fuerit sagictarius ascendens ⁊c̃. erit q̃rta vernalis multarũ pluuiarũ ⁊ ventorũ. autũnalis quarta temperatorũ ventorũ ⁊ quarta hyemalis frigida ⁊ humida. ¶ Cum fuerit capricornus ascendens ⁊c̃. signat multas pluuias in quarta vernali ⁊ bonus aer in quarta estiuali ⁊ flatus ventorũ orientaliuꝫ in eo cum caliditate quarte autumnalis. ⁊ mediocris frigore in principio quarte hyemalis ⁊ constrictionẽ eius in fine eius. ¶ Cum fuerit aquarius ascendens ⁊c̃. erit quarta vernalis mediocris in frigore cũ vehementia caloris in q̃rta estiuali cum declinatione autũnalis ad caloreꝫ ⁊ multiplicabunẽ in eo coruscatiões ⁊ tonitrua ⁊ pluuie ⁊ corroborabiẽ frig⁹ in quarta hyemali cum multis niuibus ⁊ flatu ventorũ orientaliũ. ¶ Cum fuerit piscis ascendens ⁊c̃. signat multũ flatum ventorũ occidentaliũ ⁊ esse pluuiarũ in quarta vernali ⁊ vehementia caloris in quarta estiuali ⁊ mediocritatẽ aeris in quarta autũnali. ⁊ frigoris multitudinem in quarta hyemali. ¶ Scias etiam q̄ si pars ascendẽtis fuerit in prima tertia alicuius signi etiã in secunda uel in tertia uel fuerit directio in ea aliquod almuteꝫ aut venerit ꝑfectio ad ipsam aut in p̃te septentrionali uel meridionali iudicandũ est ẽm naturaꝫ partiũ signorũ in prima tabula hui⁹ inuentorũ. vnde in hoc sequiẽ Albumazar Ptolemeũ. ¶ Itẽ cum fuerit ascendens ⁊c̃. hoc Albumazar in quarto tractatu de cõiunctionibus magnis ⁊ hoc in. 12. differentijs extrahiẽ.

Capitulũ decimũquintũ.



Cum fuerit saturno significatio albibuze ꝛ sup ascendens alicui⁹ inceptionis aut fuerit ei alcetabacia aut algebucia apud equidistantiã cursuũ septeutrionis ꝛ meridiei. Si significatio ei⁹ sit sup elementũ aereũ signat vehemẽtiam frigoris ꝛ magnam congelationẽ: nubila vapores flumina tonitrua coruscatiões ꝛ decursum niuiũ. In aquatico vehemen tiã frigoris in mari ꝛ augmentũ supfluũ eius. Significatio vͦ eius ſm modũ cõmixtionis ad signũ arietis apud equidistantiã eius signat impetuositatẽ ventorũ ꝛ fortasse accidet vehemens calor. qꝫ septẽtrionalis fuerit signat vehementiã caloris: meridionalis vͦ vehementiã frigoris ꝛ niuiũ ꝛ multñ roris. Sed retrogradus touitrua ꝛ coruscationes. Si fuerit equidistans signo tauri niues pluuias incessanẽ ꝛ vehemens frigus septẽtrionalis temperamentuꝫ aeris: meridionalis pauca temperantia. orientalis pluuias. sub radijs vehementiã frigoris in oriente ꝛ occidente pluuias ꝛ ventos. ¶ Si fuerit equidistans signo geminorũ signat incessantẽ flatũ ventorũ validorũ ꝛ multitudinẽ pluuiarũ: septẽtrionalis terremot⁹ ꝛ ventos validos: meridionalis siccitatẽ ꝛ vehementiã caloris: occidentalis paucitatẽ pluuiaꝝ cũ grossitie aerꝭ sub radijs vehementiã frigoris valitudinẽ ventorũ ꝛ multas aquas. ¶ Si fuerit equidistãs signo cancri signat multũ gelu pluuias ꝛ aquas meridionalis multas pluuias ꝛ oriẽtalis silr̃. ¶ Si fuerit equidistãs signo leonis signat incessantẽ flatũ ventoꝝ calidorũ paucitatẽ pluuiaꝝ ꝛ vehementẽ siccitatẽ. meridionalis multitudinẽ pluuiarũ. oriẽtalis augmentũ fluminũ ꝛ inundationẽ eoꝝ. retrogradus corruptioneꝫ aeris ꝛ ventos validos. sub radijs paucitatẽ pluuiaꝝ ꝛ validitatẽ ventorũ. ¶ Cũ fuerit equidistans signo virginis signat corruptionẽ aeris cũ mediocritate pluuiaꝝ. septẽtrionalis bonitatẽ cõplexionis aeris ꝛ similr̃ meridionalis. orientalis multitudinẽ pluuiarũ tonitruorũ coruscationũ ꝛ augmentũ aquarũ in fluminib⁹. occidentalis paucitatẽ pluuiarũ: ꝛ sub radijs paucitatẽ pluuiarũ ꝛ si cũ eo ibidẽ fuerit mercuri⁹ turbabiꝛ aer cũ valitudine. ¶ Cũ fuerit equidistãs signo libre signat incessantem flatũ ventorũ. septẽtrionalis hoc idẽ cũ fortitudiue eoꝝ. occidẽtalis siccitatẽ cuꝫ vehementia frigoris: qꝫ si aspexerit iupiter aut luna potissime cũ fuerit sub radijs turbabiꝛ aer ꝓpter ventos ꝛ calorẽ. ¶ Et si fuerit equidistans signo scorpionis signat fortitudineꝫ hyemis cũ multitudine niuiũ. septẽtrionalis vehementiã caloris. meridionalis multitudinẽ pluuiarũ. retrograd⁹ siccitatẽ aeris ꝛ si fuerit iupiter ꝛ luna ꝓpinqui signat

coruscationes vehementiā frigoris ⁊ casū niuiū ⁊ inundantiā aquarū. ¶ Si fuerit eqdistans signo sagictarij bonā cōplexionē aeris. septētrio nalis flatū ventoꝝ. orientalis bonā aeris cōplexionē. ¶ Si fuerit equidistans signo capricorni multitudinē pluuiaꝝ ⁊ terremotū. septētriona lis multā niuē multitudinē gelu ⁊ humiditatū. meridionalis hoc idem. sub radijs grandines ⁊ vehementiā pluuiaꝝ ⁊ valitudinē ventoꝝ. ¶ Si fuerit eqdistans signo aquarij: multitudinē pluuiaꝝ: incessantē motum ventoꝝ ⁊ terremotū in illo āno. meridionalis supfluitatē pluuiaꝝ ⁊ nubiū multitudinē. retrograd⁹ niues cum vehemētia frigoris. ¶ Si fuerit eqdistans signo pisciū vehementiā caloris ⁊ frigoris in suis tpib⁹. meridionalis multitudinē pluuiaꝝ ⁊ augmentū fluminū. septētrionalis multitudinē flat⁹ ventoꝝ. orientalis paucitatē pluuiarū. sub radijs multitudinē aquarū cū frigore: qꝫ si mars cū eo fuerit signat paucitatē pluuiaꝝ Cū fuerit saturno significatio albibuze ⁊c̄. hoc Albumazar in cōiūctionibus magnis in prima differentia tractat⁹ qnti ⁊c̄.

Sequit̄ tertia pars de iudicijs vlibus mutationū aeris ꝑ cōiunctiones ⁊ oppositiones luminariū. Capitulū primū.



Um fuerit Venus in oriente uel ī alio cardine hora ɔiūctionis uel oppositiōis luminariū certū ⁊ forte iudicium pluuiarū dux etiā sub cōuentu ⁊ oppositiōe solem respiciēs imbrē affirmat multiplicē. Uenus etiā sub radijs sub q̄libet respectu ꝑtis cardinis multiplicat imbres grauissimos. nā quotiēs luna eidē applicat pluuiā facit. ⁊ de sole in hunc modū firmissimū in aliq̄ ꝑtis cardinū ipsi⁹ siue ei⁹ oriēte. dom⁹ quoqꝫ orientis in signo aquatico sub ducis cōuentu uel eidem applicās. ¶ Cū fuerit venus ⁊c̄. hoc in libello q incipit Cū multa ⁊c̄.

Capitulū secundū.



Tem rectifica angulos hora cōiunctiōis uel oppositiōis luminariū īmediate ꝓcedentis introitū solis in eqnoctialib⁹ ⁊ solstitialib⁹ in illo climate in q̊ scire volueris: sicut fit in natiuitatib⁹. postea accipe gubernatores locorū cū iunctionū uel oppositionū ⁊ anguloꝝ q hec loca sequūt̄. sicut fit in facto eclypsim. postea cōsidera rem generalez

ꝓuenientē a ꝓprietatibꝰ q̄rtaꝝ ⁊ a nā planetarū gubernantiū inspiciēdo
cuiꝰ q̄litatis sint. sciēs augmentū ⁊ diminutionē accidentiū ꝓprioꝝ illiꝰ
q̄rti. Eodē mō fac in factis mensiū: inspiciēdo tñ ad ꝯiūctiōes sequētes
si q̄rtū illud fuerit ꝯiūctionale uł ad oppositionē si fuerit oppositionale
ꝯsiderādo ad angulos ⁊ planetas gubernātes ambo loca q̄ diximus.
¶ Postea ꝯsidera appitionē stellaꝝ fixaꝝ q̄ sūt circa appitionē plane-
tarū aut elongationē vniꝰ .s. ab alio ⁊ i suis ꝓprietatibꝰ ⁊ in statibꝰ: ⁊ q̄s
ventos mouēt hee stelle ⁊ ptes signoꝝ in qbꝰ sūt. siłr ꝯsidera a pte cuius
venti ē latitudo lune si remouebit̄ a zodiaco signoꝝ: ita ꝙ p hec oia pos
sumus scire qs magis vincit de suis ventis i statu mēsis. ¶ Itē rectifica
angulos ⁊c̄. hec snia Ptolemei in .9°. ca°. 2ᶦ tractatꝰ 2ᶜ ptis 2ᶦ q̄driptiti. Di
cit haly ibidē exponēdo Ptolemeū. Sciamꝰ p̄mo accidens vłe .s. qd erit
qñ erit. postea inspiciemꝰ in q̄ q̄rta āni: accipiēdo opationē ab accidēte
ad res ꝓprias illiꝰ q̄rti. Postea rectificabimꝰ ascendēs ⁊ angulos alios
ꝯiūctiōis p̄cedētis introitū solis i illud q̄rtū: ⁊ planetas ⁊ stellas fixas. ⁊
audiamꝰ qd totū significet. vbi grā Ponamꝰ ꝙ accidēs ꝓueniēs ex signi
ficatiōe vłi ⁊ gubernatore illiꝰ sit frigiditas: si hoc fuerit i estate dicemꝰ
estas erit modici caloris: ⁊ sic de alijs suo mō. ita ꝙ fortitudinē accidēti
⁊ q̄le erit sciemꝰ a nā gubernatoris ꝟm ꝙ cōcordauerit cū q̄litate illiꝰ q̄r
ti. Eodē mō faciemꝰ in cōiūctionibꝰ q̄ caput mensiū dicunt̄: si q̄rtū fuerit
cōiūctionale: uel oppositiōibꝰ si q̄rtū fuerit oppositionale: ita ꝙ Ptole-
meus certū principiū tpis tenet: est a ꝯiūctiōe uel oppositiōe q̄ est circa
illū introitū solis in aliq̄ q̄rtoꝝ p̄dictorū: qꝛ virtꝰ gubernatoris remanet
⁊ durat donec durauerit illud q̄rtū. ¶ Ambo loca ⁊c̄. sꝫ haly vna ē ꝯiū-
ctio uel oppositio q̄ est circa punctū illiꝰ q̄rti qd sol ingredit̄. Alia est cō
iunctio uel oppositio principij mensis in illo q̄rto. Inspiciemꝰ eni quis
dñabit̄ in vna ⁊ in alia: ⁊ vincit ille qui fuerit magis cōcors cū ꝓprietati
bus illius quarti: ⁊ cum vłi ꝟm ꝙ videbimus de posse illius virtutis uel
debilitatē. Nō eni semp accidens vłe illius quarti vincit accidēs pticu-
lare sꝫ multotiēs est ecōtra. Sole aūt existēte i leone accidit qñq꜃ maior
frigiditas q̄꜃ eo existēte i aquario. Cōsidera igit̄ gubernatores: nā si fue-
rint plures aut fortiores quantū ad suos statꝰ essentiales: ⁊ accidētales
fuerint ꝯsiłes: tūc nō dubites iudicare. ¶ Itē ꝟm haly qñ sciemꝰ de eo q
dñat̄ in q̄rto ⁊ de eo q dñat̄ in mense qd accidit in illo q̄rto ⁊ i illo mēse
illiꝰ q̄rti a ptibꝰ ambabꝰ. Et de appitione stellaꝝ fixarū q̄ apparebūt cir-
ca: ⁊ de applicatiōe planetaꝝ vniꝰ cū alio: ⁊ elōgatiōe sua ⁊ declinatiōe
suaꝝ latitudinū: ⁊ ꝓprietate signoꝝ ⁊ suarū partiū in quibus sunt: ⁊ hec
omnia cōmiscebunt̄ ad inuicē ⁊ sciemus virtutē vincentē: iudicabimus

ſm hoc rem contingentē quolibet tp̄e ⁊ quolibet quarto ⁊ q̄libet menſe hic enī eſt loc⁹ q bene itelligenti ipſū ſufficit in hac arte. ¶ Immediate p̄cedentis ⁊c̄. Hec eſt opinio Ptolemei ⁊ pluriū aliorū. Uidi tñ quedā iudicia facta de ſtatu anni ⁊ menſiū a quibuſdā ſolēnib⁹ doctorib⁹ qui iudicabant ſtatū quarti p̱ cōiunctionē uel oppoſitionē poſt introitū ſolis in illud quartū videlicet qñ cōiunctio uel oppoſitio in die introitus uel in ſequēti die ⁊ hoc nō videt̄ mihi incōueniens ad p̄ns. ¶ In natiuitatibus ⁊c̄. Ptolemeus vult q̄ rectificent̄ anguli ⁊ cetere dom⁹ preciſe ⁊ ſituent̄ in domib⁹ debitis planete ut videant̄ eoꝝ ſtatus eſſeutiales ⁊ accidentales ſicut fit in iudicijs natiuitatū ⁊c̄. Et anguloꝝ qui hec loca ſequunt̄ ⁊c̄. Hoc exponit̄ dupliciter. Uno modo q̄ ſufficit aſpicē ad hūc angulū qui ſequit̄ locū cōiunctiōis uel oppoſitiōis in ſitu ⁊ iſto mō nō facerem⁹ ſicut fit in eclypſib⁹ q̄ꝛ prius accipiebam⁹ illum qui eſt añ eclypſim ⁊ poſtea illū qui ſequit̄ ut patuit in tractatu p̄cedenti. Alio modo exponit̄ q̄ illi anguli ſequunt̄ loca cōiunctionū uel oppoſitionū in virtute ⁊ iſto modo deberes illū angulū accipere primo quē iudicares eſſe fortiorem. ⁊ ſic poſſemus etiam accipere angulū qui eſt ante cōiunctionem uel oppoſitionē in ſitu ſicut fit i eclypſibus. ⁊ credo q̄ hec eſt intentio Ptolemei. Sed ad hoc aliquis poſſet dicere q̄ bene itellexerit Ptolemeus de angulo qui ſequitur in virtute ſed mirabile eſſet q̄ occidens p̄ferret̄ qñq̄ʒ medio celi ⁊ medium celi aſcendenti. nec etiā eſt ſimile q̄ꝛ in eclypſibus iudicat̄ de his que apparent ſup̱ terraʒ. Sed cōiunctiōes ⁊ oppoſitiones de quibus trahit̄ hec doctrina qñq̄ʒ ſunt ſub terra: qñq̄ʒ vo ſupra terram: ideo rationabiliter aſcendens q̄ꝛ eſſe fortius in virtute q̄ʒ alij anguli eſſet ſemp̱ ille angulus qui ſequit̄ i virtute locū cōiunctionis uel oppoſitiōis ⁊ huic ſententie videt̄ adherere in expoſitiōe ſecūde p̄poſitiōis ſecūdi capl'i ut videbit̄ infra. ¶ Ad cōiunctionē ſequentē ⁊c̄. Hic patet q̄ virtus vni⁹ cōiunctionis poteſt durare ad aliam cōiunctionem ſi iudicia menſiū fiant p̱ cōiunctionē ⁊ virtus oppoſitionis ſi fiant p̱ oppoſitionē. Apparitionē ⁊c̄. Hoc intellige qñ incipiunt occultari ſub radijs uel qñ incipiunt exire de ſubradijs ⁊ melius apparebit inferius Elongationē ⁊c̄. ſm aliquē aſpectum ⁊ hoc eſt valde neceſſariū. ¶ Et de p̄prietatib⁹ ⁊c̄. Hoc vtrū ſint calidi uel frigidi ⁊c̄. orientalis uel occidentalis directus uel retrograd⁹ ⁊ ſic de alijs. Quos ventos mouēt hee ſtelle ⁊ partes ſignoꝝ. hoc habet̄ p̱ introductoriū p̄cedens zodiaco ⁊c̄. hic accipit zodiacum p̱ eclyptica. Hec autē omnia magis patebūt inferius dño concedente.

Capitulū tertiū Quō anni reuolutio ostendit auram.

ITē scias ascendēs ꝯiūctionis uel oppositiōis ꝛ locū eius-
dem q fuerit i introitu solis in arietē ꝛ loca aliorū plane-
tarū. Unde si saturnū iueneris in aliq̊ angulo℞ ab a scen
dente aut in aliq̊ angulo℞ a dn̄o ascendētis firmū in eo-
dem loco in aliqua dignitatū suarū ꝛ maxime in angulo
medij celi signat diuersitatē in aere ꝛ dānū ꝛ tenebras in
tpe caloris minuit calorē: ꝛ in tpe frigoris facit magnū frigus ꝛ si remo
tus fuerit ab angulis erunt tpa stabilia ꝛ equalia sicut esse debēt. tn̄ qn̄
saturnus fuerit in angulo a dn̄o ascendētis minor ꝛ debilior erit signi-
ficatio sua q̄ȝ qn̄ fuerit in angulo ab ascendēte. Et si mars fuerit in eodē
statu sicut diximus de saturno ꝛ maxime in medio celi augebit calor i
medio caloris ꝛ minuet̃ frigus in tpe frigoris ꝛ ver ꝛ autnmnꝰ declina-
bunt ad calorē. Et si eodem modo quē diximꝰ iupiter ꝛ venus aut luna
fuerint aptāt ꝛ temperāt aerē ꝛ faciunt nasci ꝛ crescere illud qd̄ seminat̃
ꝛ plantat̃. Et aspice similiter mercuriū qꝛ si eū inueneris in medio celi
ab ascendēte cōiunctionis ꝛ fuerit in aliquo signorū aereo℞ ꝛ aliq̃ for-
tuna fuerit in aliquo angulorū mercurij signat diuersitatē in aere ꝛ ven
tos multos ꝛ dānabiles ꝛ hoc modo iudicabis qn̄ inueneris aliquam
fortunarū in angulo a mercurio aut mercuriū in angulo a fortuna qꝛ i
hoc tantū valet quantū cū fortuna fuerit in signo coniunctionis. Unde
qn̄cūq; inueneris planetā in angulis ab ascendēte cōiunctiōis aut i suc
cedentibꝰ pone eū ꝑ signatore. postea inspice cuiusmodi cōmixtiōis sit
scȝ cū saturno ꝛ marte ꝛ si iueneris eū mixtū ꝺ q̃rto cū marte uel cōiun-
ctione uel oppositiōe ꝛ mars fuerit in aliq̊ signorū igneo℞ crescit calor
in tpe caloris ꝛ minuet̃ frigus in tpe frigoris. Et si aspectus fuerit de 3°
uel sextili ꝛ mars in signis igneis signat id qd̄ diximꝰ sȝ nō tantū. Et si si-
gnator habuerit cōmixtionē cū saturno de q̃rto uel cōiūctiōe uel oppo
sitione ꝛ saturnꝰ fuerit in signis frigidis ꝛ siccis aut frigidis ꝛ humidis
crescit frigus tpe frigoris. ꝛ minuit̃ calor tpe caloris. Et si aspectꝰ fuerit
de tertio uel sextili ꝛ saturnꝰ in signis ante dictis signat id qd̄ diximus sȝ
nō tantū. Et si saturnꝰ nō fuerit in signis frigidis ꝛ humidis sȝ fuerit i si-
gnis calidis ꝛ humidis que sūt gemini ꝛ eiꝰ triplicitas ꝛ habuerit cōmi-
xtionē cū signatore ꝺ q̃rto uel cōiūctiōe uel oppositiōe signat ꝙ aer erit
temperatꝰ de bona complexiōe ꝛ si hec mixtio fuerit de trino uel sextili
eo existēte in signis supradictis est maior ꝛ maioris tēperiei ꝛ cōplexio
nis melioris. Siliter si mars habuerit cōmixtionē cum signatore ꝛ fue-
rit in signis siccis ꝛ frigidis aut frigidis ꝛ humidis ꝛ cōmixtio fuerit de

q̄rto cōiunctione uel oppositiōe tēperat aerē ⁊ facit illū bone cōplexio-
nis. Et si aspect⁹ fuerit de trino uel de sextili eo existēte in signis p̄dictis
tēperantia erit maior ⁊ crescent oēs res q̄ nascunt̄ ⁊ generant̄. ¶ Et ad-
iuua te in hoc a p̄te aeris ventorū p̄ncipē cū signatore. Et si saturnū aut
martē inueneris cum luna uel eius dn̄o: iudicabis ab eis sicut ante dixi
mus p̄ existentiā eoꝝ in angulis ⁊ aspectib⁹ signatoris. Hanc eni partē
accipies a gradu mercurij: si nō fuerit in domo sua accipe suos met gra-
dus ⁊ minuta sua: addēdo eis gradus signi ascendentis ⁊ p̄iiciendo ab
ascendēte: ⁊ vbi applicuerit ibi est pars. Et idē facies in introitu in q̄rtis
que sūt aries cancer libra capricorn⁹. Sil'iter fac in introitibus solis in
quolibet. 12. signoꝝ principio. ¶ Itē scias ⁊c̄. hoc dicit haly abenragel
26°. ca° octaui libri. Idē haomar ⁊ Alkindus. 8°. ca°. q̄uis p̄ alia verba.
Sciendū est q̄ esse in septima domo ascendētis ⁊c̄. quere hoc.

Capitulū quartū De pluuijs anni.

Item aspice priusq̄ sol intrat principiū arietis cōiūctio-
nem luminariū uel oppositionē eorū que fuerit ante: ⁊ si
fuerit signū ascendēs de signis pluuie signat hoc sup̄ plu
uiā q̄ descēdet in illa cōiunctiōe uel oppositiōe: ⁊ eo ma-
gis si locus oppositiōis uel diūetionis fuerit i vno angu
loꝝ ascendētis in illo t̄pe f̄m latitudinē regionis ad quā
luminaria equaueris: q̄ si locus oppositiōis uel cōiūctiōis fuerit i vna
domorū cadentiū: iudica q̄ nō descendet pluuia in toto illo mense: nec
in maiori p̄te illi⁹ anni. Si autē signū ascendens fuerit de signis aqueis
⁊ dn̄s ipsius signi aspiciat lunā hec significatio completa sup̄ descensio
nē pluuie. Et si fuerit almutez in ascendente tunc erit magis. Si v̄o fue
rit almutez cū luminarib⁹ tunc erit pluuia vsq̄ ad abundantiā. ¶ Q̄d si
scire volueris diem in quo descendet pluuia tūc debes considerare diē
in quo luna p̄ueniet ad gradū ascendentis: tunc enī descendet pluuia.
Et ego Abraham dico q̄ verū est si fuerit signū ascendens vnus angu-
lorum signi illius terre uel si aspiciat ipsum quocūq̄ aspectu. nam si nō
esset nō consisterent q̄d nubes ⁊ nō descenderet pluuia ⁊c̄. ¶ Itē aspice
priusq̄ sol ⁊c̄. hoc in libello abrahe in. 2°. ca°. qui incipit Sciendū ⁊c̄. q̄d
intelligat p̄ signum terre f̄m Johannē de saxonia intellexit signū quod
fuerat ascendens hora reuolutionis. Aliter etiā pōt dici q̄ signum ali-
cuius terre dicit̄ illud cū quo maiorē habuerit concordantiā. ⁊ hoc ha-
bebat̄ prius a Ptolemeo ⁊ ab alijs in fine primi hui⁹. Item sciendū q̄
inter signa aquatica iste enumerat aquariū ⁊ leonē ⁊c̄. sed hoc est prius
dictum.

Capitulum quintũ.

I Tem inquire locũ ꝛ horã cõiunctionis uel oppositiõis ꝑceden-
tis introitũ solis in arietem ꝛ librã: preter hoc cõperiũt indi ho-
ram inroitus solis in. 20. gradum scorpionis. affirmant autem
ab illo tpe aquam in puteis augmentari. cõperies etiã quantũ
distant singuli planete a capite arietis in hora cõiunctiõis uel opposi-
tionis: ꝛ in qua mansione sint singuli planete semꝑ cõputando. 13. gra
dus ꝛ tertiã vni⁹ꝑ vnaquaqꝫ mansiõe a capite arietis inchoãdo. Inqui
res tertio ad quẽ planetã luna aspectu habeat recedẽs a minuto grad⁹
in quo fuerit oppositio uel ꝯiũctio. ꝙ si aspexerit saturnũ ꝛ vterqꝫ fuerit
in mãsione humida ꝛ si nõ sit ĩpedit⁹ saturn⁹ ab aspectu iouis. erũt nu-
bes nigre ꝛ pluuia lenta ꝛ durabilis. Et planete ĩferiores aspexerint sa-
turnũ. s. venus ꝛ mercuri⁹ erit pluuia maior ꝛ durabilior: ꝛ hec est ꝯside
ratio ad cõperiendũ pluuias ãni. Siĺiter ꝯsiderabis ꝯiũctiões opposi-
tiones ꝛ q̃drata in singulis mensib⁹ ad cõperiendũ pluuias mẽsiũ ꝛ ad
ĩueniendũ diẽ in q̃ pluuie incipiãt: ingre distantiã in q̃ fuit ꝯiunctio uel
oppositio uel q̃drata ad grad⁹ planete pluuialis. ꝛ si luna fuerit ĩ signo
mobili: da cuilibet distãtie graduũ horã vnã: ꝛ in firmo cuilibet gradui
diẽ: ꝛ si in cõi in prima medietate singulis gradib⁹ dies singulos ꝛ ĩ alia
cuilibet gradui horã vnã: ꝛ vbi terminabit̃ distributio: in die eodẽ ꝛ ho
ra erit pluuiarũ initiũ. ¶ Subtilissimi igit̃ indorũ cõsiderãt tarditatẽ ꝛ
velocitatẽ pluuie ſm velocitatem ꝛ tarditatẽ cursus lune ꝛ ſm augmẽ-
tum luminis sui ꝛ noticie: dicentes augmentũ ꝛ velocitatẽ pluuie seq.
Si planete cui vim dat silis sit lune ĩ accidentib⁹ ꝑdictis interiacentib⁹
lunã ꝛ planetaꝫ: totidẽ horas supputabis in velocitate ꝛ tarditate ꝛ in
minutione totidẽ dies ut veniat pluuia. ꝙ si cũ ꝑdictis mars aspexerit
saturnũ maior fit tardatio donec luna ad locũ saturni ꝑueniat uel op-
positionẽ uel quadratũ. Et si saturnus fuerit in mansiõe sicca ꝛ luna ei
vim dat ꝛ neuter inferiorũ ipsum aspiciat erit nubila absqꝫ pluuia. Et
si luna dat vim Ioui vtroqꝫ existente in humido ꝛ alter inferiorum io-
uem aspiciat ros erit ꝛ nebula tantũ: ꝙ si ioue ꝛ luna sic positis ꝛ neu-
ter inferioruꝫ iouem aspiciat ꝛ ipse applicat ad saturnũ uel aspiciat sa-
turnũ pluuia erit. Et si luna ꝛ mars fuerint in mansionib⁹ humidis ꝛ al
teruter inferioꝝ martẽ aspiciat: sequet̃ nubila terribilia tonitrua lam-
padũ grãdo: ꝛ nõ pluet nisi mars aspexerit iouẽ uel saturnũ. ¶ Hic no
tandũ ꝙ mars quolibet aspectu significatione imbriuꝫ exauget lunã ꝛ
stellã cũ applicuerit: in generãdis pluuijs oĩno iuuat. Illa eñ eidẽ ꝑpe
ꝛ principalit̃ applicãte inest dilatio. Si vo alit̃ accidat nec signat ꝛ idẽ

corrũpit nubes quas Martialis pducit natura croceũ desup ruborem nõ sine candore habentes. ❡ Itẽ lunaris cũ sole applicatio in mansiõe humida ⁊ sol in locis vbi nec dignitatem nec potestatẽ habeat saturno ⁊ marti applicet̃ pluuiarũ lapsus asperrimos aquarũ quoq inundationes portẽdit: nubes etiã croceas ⁊ que cito dissoluũt generat ⁊ postmodũ serenũ aerẽ efficit. Si vo fuerit in sicca sine applicatiõe malorũ nullam pluuiã ferme fore ostendit. ❡ Notandũ insup q lune cũ maliuolis applicatio in ipsa ebdomada pluuiã largit̃ beniuole illi⁹ quoq aspectu infortunate rores ⁊ efficatiã dissoluũt ⁊ phibent ⁊ horã future signationis puertunt cui⁹ quoq hore certos ⁊ iuuariabiles euent⁹ luna eidẽ maliuole cõiuncta ⁊ hoc iuestita pfectio reducit. Ampli⁹ luna eidẽ applicans ⁊ in eodẽ cõnexu ⁊ signis ⁊ humidis mansionib⁹ imbres denũciat futuros: nec hoc poterit frustrari si stelle supiores infortunaꝫ pprie respiciant mercurio accessantes siue nõ. Si vo nec his supiorib⁹ applicet q ipsa tunc sic fortunata imbriũ cessat signatio. Uenus tunc demũ stelle supiori dũ eodeꝫ modo fuerit applicans imbres maximos ⁊ assiduos confert nec in venere dũ ea sic se habeant aliqua erit fallacia in forma existente: nec lunaris certa est pmissio dũ in eodem nodo nec signo humido nec mansione humida cõmoret̃. Nã si luna eidẽ applicet ⁊ ista ⁊ sic se habeant nubes ⁊ rores ⁊ nebulas absq imbribus inducit: quotiẽs aut ut pdiximus sic se habuerit luna post cõiunctionẽ saturno ⁊ marti accedat nimiã pluuiã inducit ingruentiã. Luna autẽ ioui ⁊ soli applicante dũ tñ sit inter vtrũq aliquis respect⁹ dico uel applicationis configuratio nec imbres. luna nãq tunc demũ in loco optimo sub aliquib⁹ sextilib⁹ centroꝝ locis huic significationi dicatis q fortunata efficit̃ cassar ⁊ perimit ducatũ dũ iã fortunatis aliqua cõfiguratio rñderit. Hee igit̃ vniuerse occasiones aio sunt notande: nubes etiã que tunc generant̃ candide rores multos ⁊ inconstantes celos pfigurãt imbres ⁊ continuos. Ueneris quoq adiectum testimoniũ pluuiarũ redũdantiam pfecto inducit quotiens etiã mercurius aut cuꝫ stellis supioribus aut alteri earũ applicet̃ p pluuiarũ redũdantia ⁊ assiduitate submersiones ⁊ etiã ruinas admonet timendas: q̃uis tñ nec mercurialis applicatio cum superioribus ⁊ pluuie erunt. rursus mercurius postq̃ veneri accesserit maliuolis applicans submersio ⁊ ruina imbriũq assiduatio timenda est. ❡ Mercurius itidem venerem de signo aquatico ⁊ mansione humida aspiciens aut in eodẽ loco uel nexu locatus ⁊ pluuie termini excedunt. q si assit respectus dum aliter q̃ supra dictum est se habeant pluuiarũ demonstratur mediocritas.

¶ Mercurius rursum ⁊ si rores ut supradictū est habeat iudicare si be
niuolas in suis terminis aut dignitatibus respiciat eiusdē generis effe
ctus ⁊ earū nature admixtus efficit mendacē eiusdē ducatū puer
tit ⁊ educit effect⁹ alios cuiusmodi est multiplex ventorū rabies vndiq̧
aerē depellens erit ventorū quantitas ꝯm stelle potentiā cuius genus ⁊
ipse assumit nec stelle pagentes si eis lunaꝫ applicet mendacio polluūt
ſꝫ veritate gaudebunt ⁊ ꝓmissa oīno exoluent nisi inquā eorūꝫ status ⁊
habitus ioui ⁊ soli ut supradictū est aliquo configuratiōis genere ꝓprie
referant̄. Sic eni luna oīno ꝓmissa transmutat earūq̧ postq̧ luna eidē
accesserit cum saturno uel marte. Applicatio nunq̧ mendax efficit̄. ve⁊
debiti ⁊ assidui ducatus augmentū inducit ⁊ nebulas. si vō quidā plu
uias p̄dictas variare p̄sumant nō tamen nubes densissimas ⁊ aeris hu
morem valebunt ꝑuertere verū nebulas generabunt ⁊ vapores in aere
subleuabunt diuturnos ⁊c̄. ¶ Amplius luna in humida mansione soli
uaga etiā ab omnib⁹ stellis cadens ⁊ ab eisdem solitaria in centro⁊ ali
quo existens ⁊ in sui natura actione singularis nubes inducit ⁊ rores
multiplices aerem humectat imbre confert multimodas nebule ex qui
bus replet̄ horizon ventos concitat diuersos ex quibus tonitrua coru
scationes ⁊ fulgura ꝓcreant̄. Si vō deinceps stelle applicet que p̄dicte
stelle genus obtineat si inquā fortunata fuerit p̄dicta dissoluit: maliuo
la nanq̧ existens duplā quā cetere stelle ꝓpriam exhibent efficatiam.
Unde notandū q̧ soliuaga discurrit in p̄dicta solutione fortissima iue
nit̄. Ex p̄dicto quidem manifestum est qn̄ luna cum beniuolis aut eorū
hospitio aut etiam cū stellis que fortunatis applicant nullaten⁹ imbres
denunciat. cum maliuolis nanq̧ econtrario discurrens pluu as gene
rat vniuersas. nanq̧ lune cum singulis stellis ducatus: ut in alestma.i.
cōuentu exponens in his que necessaria videbant̄ ad huius cognitionē
habendā que supra scripta sunt ordine congruo adinueni quō in oppo
sitione ⁊ tetragono agi debeat deinceps exponatur. ¶ Item inquire lo
cum ad horam cōiunctionis ⁊c̄. hoc totum habetur ex libro Japhar.
Sciendum q̧ vsq̧ ad illā partē: Notandū preterea. hoc sumpsi in quo
dam capitulo de pluuijs a Japhar extracto: quia per clariora exprimit̄
verba. Residuū etiam poterit poni in breuioribus verbis ⁊ clarioribus
si videat̄ expedire ⁊c̄. Capitulū sextum de temperie aeri ꝑ annū.

Item volens scire naturā in singulis annis: cōsidera cōiunctio
nem solis ⁊ lune uel oppositionē que est anteq̧ sol intrat arietē
⁊ considera i quo signo sit saturn⁹ ⁊ si sit in signo igneo erit an
nus calidus. In frigido talis ⁊ sic de alijs. ⁊ misceas cū natura

signi cū natura termini in quo est saturn⁹. Natura aūt cuiuslibet termini est ut sui dñi. misceasq3 naturas planetarū qui sibi associant̄ uel eum aspiciūt. sic iudicabit̄ de ioue cu3 associabit̄ luna soli uel opponit̄ añq3 sol intrat signorū mobiliū que caput circuli sunt. sic est iudiciu3 veneris ꝛ mercurij in vnoquoq3 mense in tpe cōiunctionis uel oppositionis solis ꝛ lune in vnaquaq3 portarū ꝛc. Quomodo autē fiat apertio portarū dicet̄ inferius dño concedente. Si mars cōsiderat iuncture solis ꝛ lune dominiū erūt lampades tonitrua ꝛ fulmina auge uel deme a nā martis naturā signi uel termini in quo est. ꝙ si saturn⁹ aspicit in loco martis ꝛ ē in domo terre signat domorū destructionē. Si in domo aque monstrat frigus nebulas ꝛ tenebras. ꝙ si planeta retrograd⁹ ibi fuerit signat pluuiam magnā. ¶ Itē volens scire ꝛc. hoc in prima pte quadriptiti. Hyspalensis ca.° volens ꝛc. Idem fere haomar in ca.° Ad pfectā ꝛc. Aliq̄ tñ dicit que ab hyspalensi nō dicunt̄. quere hoc. Capitulū septimū.

Item radix i pluuijs ut aspicias ascēdēs diūctiōis uel oppositionis q̄ fuerit ante introitū solis in quodlibet signū ꝛ aspice dñm ascendentis ꝛ dñm loci cōiunctiōis uel oppositiōis ꝛ qñ isti dñi fuerint in locis humidis ꝛ pluuiosis significat pluuiā ꝛ econtra. ꝛ qñ applicuerit ad planetas humidos ꝛ pluuiosos pluuiā significat ꝛ econtra. Et signator fuerit occidentalis aut retrogradus aut tardi motus silr̄ signat pluuias. ꝛ qñ etiā fuerit cōbustus signat pluuias vbi mars sepatim qui qñ fuerit cōbustus minuet pluuias. Et scias ꝙ qñ fuerit ascendens signator in sua latitudine uel in circulo angis sue signat pluuias ꝛ econtra. Et scias qñ erūt pluuie ꝓpter signatorē in scorpione erunt pluuie in dāno. ꝛ si fuerit ꝓpter saturnū erūt submersiōes. Et ꝓpter martē radios ꝛ cōbustiones aeris signat. ¶ Itē radix in pluuijs ꝛc. hoc in octaua pte libri haly abenragel ca.° 27.° versus finē. Capitulū octauū.

Item iudiciū particulare de aeris mutatione in cōiunctione solis ꝛ lune: considera ascendens ꝛ eius naturā: ꝛ de qua mansione lune sit: ꝛ naturā domini signi in quo ipse est ꝛ naturā planetarū que sunt in ascendente uel cum dño eius uel i eius aspectu ꝛ qui sūt cōiuncti lune uel pspiciant: ꝛ in qua domo uel mansione sit luna ꝛ que testimonia ꝑualuerint: talis erit lunatio si dom⁹ vsq3 ad tēpus oppositiōis: ꝙ si fuerint eq̄lia testimonia erit indifferens ꝙ si futura sit pluuia circūpluet cōiuncta alicui planete pluuioso uel aspexerit uel intrauerit signū pluuiosu3 ꝙ si nō est pluuia ventura imutare potest aerē coniūctio uel aspectus planetarū cum luna. Alteratur etiam aer si quis

planetarũ transeat a dextro in sinistrum uel econuerso: aut de velocitate in tarditatem uel ab auge ad oppositũ augis: aut a directione ad retrogradationẽ uel de oriente fiat occidentalis: uel hec oĩa ecõuerso: aut intret aliquod signũ uel ingrediat̃. nam his cõtingentibꝰ frequenter aer clarus turbidꝰ efficit̃ ⁊ econtra: ⁊ sicut iudicamꝰ de cõiunctiõe ad oppositionẽ ꝑ ascẽdens ⁊ eius dñm. sic etiã iudicamꝰ ꝑ horã oppositionis vsqꝫ ad cõiunctionẽ. Et siliter in oppositiõe consideramꝰ gradũ supra terraꝫ existentẽ ꝙ si luna ẽ lumine alicuius pluuialis planete ꝑ cõiũctionẽ uel aspectũ in hora cõiunctionis uel oppositiõis tot diebꝰ finitis post horã cõiunctionis uel oppositionis solis ⁊ lune incipiet pluere. ❡ Preterea maximũ testimoniũ est si pars pluuie que sumit̃ a sole in saturnũ ut postea patebit licet cõfirmauerit: aut ꝙ sit venus in scorpione capricorno uel aquario lumine ꝓportionalis: aut ꝙ sint tres planete in aquario iũcti. ❡ Itẽ duo testimonia humiditatis in estate minus valent q̃ꝫ vnũ in hyeme. Similiter in hyeme duo testimonia serenitatis minus valent q̃ꝫ vnũ in estate. ❡ Item in vna terra pluit qñqꝫ ⁊ in alia nõ: ⁊ hoc põt esse ꝓpter diuersitatẽ ascendentis ⁊ planetarũ ⁊ signatoꝝ terris determinatis ꝑdñantiũ. ❡ Itẽ iudiciũ ꝑticulare de aeris mutatiõe ⁊c̃. hoc inueni in quadã extrauagante hyspalensis. Itẽ fere in fine prime ꝑtis addit tñ quedã de signo illius terre. quere hoc ⁊c̃.

Capitulũ nonũ De apertione portarũ.

Item aptio portarũ dicit̃ cũ planeta inferior iũgit̃ sup̃iori ⁊ fuerint domꝰ illorũ opposite sicut solis ⁊ lune cũ saturno uel eorũ aspectus ad saturnũ: iouis eodẽ modo cũ mercurio. veneris cũ marte. sꝫ venꝰ signat humiditatẽ. mercuriꝰ ventos. saturnꝰ nubila ⁊ frigus. mars ventos a dextro. iupiter temperieqꝫ ventos a sinistro qđ in cancro magis signat. sic mars in capricorno. ❡ Mercuriꝰ itaqꝫ si aspexerit dños aptionis portarũ uel fuerit cũ eis cõiunctꝰ in cõiunctiõe solis ⁊ lune uel oppositiõe erit ventꝰ ⁊ pluuia: ꝙ si aptio portaruꝫ fuerit cũ marte sicut dictũ est de mercurio: erũt lampades tonitrua ⁊ fulmina hic auge uel minue sicut prius. ❡ Scire autẽ debes ꝙ pluuia qñqꝫ ẽ in ipsa oppositiõe uel cõiunctiõe solis ⁊ lune ⁊ si tunc fuerit aptio portarũ qñqꝫ dilatat̃ cuiꝰ rei causã ignorare nõ debes. Si itaqꝫ in apertiõe portarũ cũ luna cõiungit̃ soli uel ei opponit̃ fuerit ipsa luna in angulo. 10. ⁊ fuerit in signo mobili: tũc in ipsa oppositiõe uel ɔiũctione erit pluuia si autẽ fuerit in angulis alijs uel i lapsis uel post angulos tardabit pluuia ꝫm ꝙ fuerit i mobili uel in fixo uel in cõi signo: ⁊ tũc expecta pluuiã magnã cũ ꝑuenerit lũa ad oppositũ signi ascẽdẽtis i ɔiũctiõe ulꝰ oppõe ⁊ durabit pluuia ꝫm ꝙ luna ꝑueniet ad aspectũ planetarũ uel ad signa

pluuiā significantia. ¶ Item apertio portarū dicit̄ cuȝ ꝛc̄. hoc extrahit̄ a libro hyspalensis ꝛ a pluribus alijs. Addit ꝙ luna fuerit in signo alicuius ciuitatis quere hoc ꝛc̄. Capitulū decimū de die ꝛ hora pluuie.

Item in quacūqȝ cōiunctione uel oppositiōe solis ꝛ lune cōiungat̄ luna aut dederit vim suā saturno. scito ꝙ i illo mense descendet pluuia: poteris quoqȝ scire diem in qua descendet. cōputabis enī gradus equales que fuerint inter locū cōiunctionis ꝛ locus aspectus ꝑcise completi seu ꝑfecti ꝛ qn̄ ꝑficiet̄ numerus illoruȝ duorū ƀm quē dabis cuilibet gradui vnū diem tunc pluuia. ꝛ magis testimoniū clarū si cōtingat ꝙ si luna illa die siue vna suarū clauiū que sint claues patet inferi⁹. ¶ Item semꝑ cōsiderare debes si fuerit planeta retrogradus in prima domo. hoc enī signat supra pluuiā. fortitudo nanqȝ planete qui ē in domo prima cōputat̄ ut fortitudo dn̄i domus. dn̄s quidē septime domus iouis ē mercurius qui ambo signāt suꝑ ventos: ꝛ tu debes inspicere in quolibet mense si dn̄s signi ascendentis est iupiter uel mercurius ꝛ aspiciat vn⁹ alterū hoc significaret ventos multos qui se renouarēt in mundo. ꝛ cū hoc toto si essent in aliquo angulorū ascendentis tūc significarent semꝑ supra pluuiā cum fulgure ꝛ coruscatiōe ꝛ magis si esset inter eos aspectus quartus aut inimicitie ꝙ si alter eorū foret i signo terreo tūc signaret suꝑ grandinē tempestuosū ꝛc̄. Item in quacūqȝ cōiunctiōe ꝛc̄ hoc Abraham de seculo ꝛc̄. Capitulū vndecimū.

Item ƀm antiquos peritissimos astrologos quotiens luna a venere recedens marti applicet aut ecōuerso significationē pluuiarū ꝑfecte reducit. A mercurio nanqȝ recedēs ioui applicās idem signat aut econuerso. Aut a saturno recedēs soli applicans uel econtra idē signat ꝛ nō aliud prestat iudiciū. Sunt hec autē singula ꝓstellarum quasi manatoria que aptiones portarū satis cōgrue nuncupant̄. Harū itaqȝ stellarū oppositio declinate. 3ᵉ uel. 4ᵉ ꝛ ad partē australē ꝛ altiorē facta deprehensam ꝓprijs emanat pluuijs. Si inquā inter. 19. gradum scorpiōis a. 19ᵉ tauri cōmorent̄ gradus. Item ex ꝑte australi tūc demū circa occurrit significatio quotiēs a. 19ᵉ tauri ad. 19. scorpiōis gradiūt̄. Et iterū istarū portarū virtus optimiqȝ significatio ut qua die uel hora nubibus uel pluuijs aer incipit variari ꝑ singulas vrbes aut etiā vicos sub imbriū guttarū stillicidio oriens ꝛ locus lune sȝ etiā cui luna applicet suꝑioribus videlicet aut inferioribus sūma diligentia ꝑquirat̄. non minus quoqȝ an ea lune applicatio de exagono fiat siue tetragono aut

oppositione τ cõuentu aut etiam fit recepta. Adhuc etiã cui luna appli cet quinto gradu constiterit: Cita etiã sit uel tarda uel media in austrũ descendens aut in septẽtrione conscendat: quibus omnib⁹ certo ordine deprehensis luna stella qua die primo pluere incipit applicatio certum de imbribus p singulas ferias dabit iudiciũ: quousq; videlicet ea stella ad aliud signũ transit: ea tñ aliud signum ingressa de pluuiaruz iudicio tali uel tali die nullatenus ꝓsumendũ erit donec ꝙ qñ luna eidem rursus applicet ꝓfecto discernas. Sivo applicatio imbres demõstret alios iuxta ipsum modũ τ numerũ de multitudine τ paucitate referendũ erit etiã illius signi naturã humidũ videlicet fuerit aut siccũ aut mediũ. Itidem quoq; signũ stelle cum qua fit lunaris applicatio: nam etiã ea die qua imbres expectas lune cursum celeritas ul' tarditas eiusq; in austrũ descensus aut in septẽtrione sublimatio notanda videt̃. Et de stella cui hec applicat in hunc modũ: nã ex stelle huius statu nõ minima imbriũ erit agnitio lune rursum atq; stelle latitudo pariter notanda. vtraq; eni australis τ visioni existens affinior: τ latitudo similiter eadez die largit̃ ingruentiaz latitudine quidẽ diuersa si nec assit receptio nubes ꝓtendit steriles aut parũ ponit fecundas. Ad hunc quoq; modũ in qualibet regione uel vrbe aut termino si de lune applicatiõe uel receptione aut cõtra de eisdẽ necne in ꝓdictis locis siti de natura etiã signorũ stelle cui ap plicat ea que diximus repiri contigerit nec aliqđ detur iudicium nisi inquantum stelle alteri velociori applicat aut in eius cõuentu fit: q2 igit̃ τ hic ducatũ ꝓmeruit iuxta eius potentie vires τ debilitatẽ de iudicio erit referendũ τc̃. Item ẜm antiquos τ peritissimos astrologos τc̃. hoc etiã habet̃ in libello qui incipit Cum multa τc̃. Capitulũ. 12.



Tem considera ascendens cõiunctionis mensis arabum si ibi fuerit fortuna: fiducia erit de pluuia si infortuna nõ erit. Similiter de alijs angulis ascendentis τ aspice qñ luna erit in opposito gradu ascendẽtis cõiunctionis τ asperxerit eam aliquis planetarũ significantiũ pluuiã erit pluuia. Item considera ascendens τc̃. hoc Alkindus in sexto capitulo. Capitulum. 13.



Tem in principio mensis considerat̃ luna si fuerit in aliqua mansionũ pluuiosarũ applicatq; ipsã planeta retrogradus τ eo si fuerit ipsa in signo feminino: τ hoc magis si fuerit aliquo signoꝝ aqueoꝝ tũc signat ipsa sup pluuiã τ hoc est considerandũ potissime in principio mensis añ introitũ solis in arietẽ. Postea in quolibet aliarũ q̃rtarũ

anni q tunc qualitates tempoꝝ mutant. ¶ Item qñ ab eodem minu-
to vnuz luminare recedet ab alio: vide in qua mansione ⁊ singule stelle
fuerint dando cuilibet mansioni. 13. gradus ⁊ tertiã vnius incipiendo
a primo minuto arietis: ⁊ considera vtrũ sit in humida sicca uel media
scias etiã aspectus complexiones ⁊ applicationes planetarũ illa hora.
Similiter fac in ⁊ duab⁹ quadraturis vnde qñ luna erit in signo
humido ⁊ planeta aspiciat eã aut cõiunget ei signat generationem plu
uie pcipue si aspexerit aliqua infortuna. Si eni aspiciat infortuna aut
applicet ei iens ad eam qñ luna pueniet ad eam leuis quieta. Si autẽ
martẽ pluuiam signat cũ fulgure ⁊ tonitruo ⁊ grandine. cum mercurio
pluuiã cum vento forti inter sese distillantez. Et si fuerint luminaria in
eadem mansione signat multã pluuiã cum magnis guttis. ¶ Itẽ in pn-
cipio ⁊c. hoc Abraham de seculo ⁊c. Item qñ ab eodẽ minuto ⁊c. hoc
Alkindus octauo caplo. Capitulũ. 14.



Radus iterũ cõuentus uel oppositionis p singulos men
ses: cui etiam luna applicet donec ad solis redeat cõuen
tum: aut saltem ab oppositione sepatur nullatenus obli-
uionis tollat incõmodũ. Nã cũ mercurio aut veneri ap-
plicet sub eodẽ cõuentu uel oppositione pluuias effũdit.
Si vo de signo. 10. de exagono videlicet aut trigono aut
oppositione luna videris applicantẽ stella cui cõuentũ uel oppositiõis
relictis ea applicet iuxta citũ cursum uel tarditatẽ descensum uel ascen-
sum nec minus quoq; sm illius loci naturã ⁊ sm lune ⁊ illius stelle lati-
tudinẽ ut supius dictum est indicij semita teneat. Si eni in eadez parte
aut cardine discurrat ⁊ stella cũ qua lunaris fit applicatio sub terra mo
retur de antedictis facit indiciũ. Si eni stella oriens nõ respiciat quãdo
quelibet figura euz respexerit imbriũ sequit renouatio. Ad hunc quoq;
modũ lune in oriente aut stellarũ ipsaꝝ negato respectu dum tñ ea plu
uias designet absq; nubiũ obscuratione subiti imbriũ aderũt discursus
De mansione quidẽ lune indorũ animaduerte sententiã: i humida vi-
delicet aut sicca ut indorũ fides est: luna i humida mansiõe stelle in hu
mida mansione applicans pluuias ostendit: potissimũ quidẽ si in eodẽ
nodo constiterit in humida g⁹ si in diuersis ⁊ humectantibus discurrãt
⁊ si nõ generales: pluuie tamen erũt: ea eni si locata stelle i mediocri lo-
cate ⁊ in vno nodo applicans paucis affluit imbrib⁹ quoruz sunt initia
sũt fine ipsa fortiora erunt. luna eni in mediocri existente dum tñ eidez
stelle in humido ⁊ nodo vno existenti fiat applicatio ⁊ si exordio min⁹
in fine tñ multipliciter aderit redũdantia. porro si eũdem minime obti-
neant nodum imbriũ mediocritas plerũq; etiã imbres occurrent sz ste

riles. ¶ Gradus iterū cōuentus ⁊c̄. hoc in libello q incipit Cū multa ⁊c̄.

Capitulum. 15.



Tem p singulos menses in cōiunctione uel oppositione solis ⁊ lune oriens est firmandū stellarū quoq͂ lunarem necnō cū ceteris applicationib⁹ accentus pscrutari necesse est. Ea igitꝰ veneri uel mercurio applicante ⁊ hinc pluuiosus erit ad maiorē. Deinceps ad hui⁹ rei euidentiā notandū qn̄ luna cardines ingrediēs veneri ⁊ mercurio applicat ipsa ducit die pluuias nisi forte in principio illius cū marte facta fuerit applicatio. q̄ si aliqn̄ accidisse ppendas fulgura exauget atq͂ tonitrua tn̄ paucos denunciat imbres nisi rursum in oppositiōe cōstiterit q̄ si luna a sole recedens fortunatis applicet in prima mensis parte pluuias effundit nō modicas: Nō aliter quoq͂ circa oppositionē oriēte firmato luna fortunatis applicans: cū ab oppositiōe recesserit alterā mensis partē copiosis replebit imbrib⁹. In cōuentu uel oppositione cū venere ⁊ saturno signū aquaticū obtinenti applicatio ⁊ hec duo loca imbribus multis redūdabūt nisi forte in signo igneo cōmorētur. martis rursum cuꝫ saturno applicatio nubes imbres ⁊ ventos multiplicat nubes detrahit ⁊ aera corrumpit: mercuri⁹ iterū hora cōuentus ⁊ oppositiōis veneri applicans pluuiarū inundatione gaudebit. Item p singulos ⁊c̄ hoc in libro haomar ca⁰ Capitulū. 16.

De pnosticatione ventorū p stellas fixas ⁊ planetarū aspectus.

Tem ventoꝝ cognitio ⁊ pluuiaꝝ experiētia sicut imbriū ex cōuentu uel oppositione ⁊ duob⁹ tetragonis oīno dependet quare est: stellas quoq͂ ventos designant mercuriū videlicet martē ⁊ solē attendere res hortatꝰ. Cū enim mars vētos exaugeat saturn⁹ phibet ⁊ maxime retrogradus ⁊ in signo terreo discurrens: nō minus quoq͂ aquatica ⁊ sicca contradicunt. mercurius enī stella est ventorū ⁊ pariter aerea signa. Ut igitꝰ veniētes puideas ventos mercuriū attendere oportebit. luna enī postq͂ a cōuentu recedit eidē applicās ⁊ cū eo ⁊ sub eodē cōnexu in cōtraria mansione discurrēs ventorū nūciat discursus. rursū mercurio cū saturno applicante aut eodē cū ipso in eodē nodo ⁊ mansione discurrēs nec ille retrograd⁹ obscuros efficit ⁊ aerē variat etiā sepe i aere ventoꝝ timēda nascitꝰ rabies. ¶ Unde notandū q̄ saturn⁹ retrogradus etiā si mercuri⁹ eidem applicet ventis penit⁹ cōtradicit. mercurio marti applicante aut in eius cōuentu aut eodem nodo ⁊ mansione que ventos iudicat venti calidi procedunt ⁊ in aere feruor generatur:

nubes quoqꝫ horizonta possident plerūqꝫ ignes ab ethere dilabunt̄ uel in eodem apparent uel ventorū calor alterat̄ marte potissimū retrogra do. Marte quoqꝫ in signo cōmorante ꝛ minor inest ventorū significa tio: verū pluuias multas ex modico ventorū largit̄. nā idem mercurius ioui applicans aut veneri aut in mansione ventos significante ꝛ in eo dem nodo cōstiterit ventos reducit. Jupiter autē maiorē in ventis assu mit efficaciā: eius enī est omniū ventorū ꝓpitiatio ꝛ leuitas. mercurius itidē soli configurat⁹ aut eūdē nodū ꝛ mansionē que ventos signat ob tinens ventos ferientes generat ꝛ pessimos. Subtilissime autē acquisi tionis est mercurij ꝛ lune cuꝫ ceteris stellis cōmunitas siue admixtio ꝙ si fiat nihil deposito efficit. Jtē ventorū cognitio ꝛ pluuiarū ꝛc̄. hoc re perit̄ in libello Japharis vltimo caplo. Ad euidentiā predictorū ꝛc̄.

Sequit̄ quarta pars libri de iudicijs ꝑticularibus que non solum fiunt ꝑ coniūctiones uel oppositiones luminariū: ſꝫ etiā ꝑ alias figuras par ticulares. Capitulū primū.



Um luna fuerit i cen tro a sole et fuerit ap tio portarū ꝛ fuerit applicatio uel aspe ctus uel luminū trāslatio seu receptio uł collectio luminū inter dn̄m ascendentis cōiunctionis uel oppositionis: uel inter ascendens cōiunctionis uel oppositiōis solis ꝛ lune p̄cedētis ꝛ dn̄m suū septime iudica ꝙ in illo mense erunt pluuie tem pore pluuiarum aut ventus ꝛ sic de alijs qd̄ autē affirmat significationeꝫ lune est ꝙ fuerit venus uel mercurius occidentales uel retrogradi uel tardi mo tus: uel ꝙ sit vnus planeta aut duo ex altioribus retrogradi uel tardi qꝛ tunc erit pluuia sine aliquo dubio. ¶ Jtem cū fuerit apertio portarū lu na existente in aliquo centrorū p̄dictorū sequent̄ venti uel pluuie calor uel frigus ƒm naturā dn̄oꝝ apertionis portarū ꝛ ƒm naturā tp̄is. Jtem si tunc īueneris lunā in signo humido applicante planete humido licet ibi nō sit apertio portarū tn̄ poteris habere fiduciā de pluuia. ¶ Cū lu na fuerit ꝛc̄. hoc extrahit̄ ex. 29°. ca°. octaue ꝑtis libri haly abenragel ꝛ ex dictis haomar in ca°. Quotienscūqꝫ itaqꝫ ꝛc̄. qd sit esse in centro require

supra in septimo prime ptis. Item cuz apertio rc. hoc in. 28° ca°. octaue ptis Haly abenragel. r in haomar caplo Tepestiua itaq3 imbriu rc. de hac materia etia habes in caplo Ad pfecta. in eode libro specialiter ab ab illa pte No minus qnoq3. 12. equantis rc. vsq3 ad illa parte Asceden te anni rc.

Capitulu secundu.



Tem qn fuerit qrta signans de humiditate a retrogradatione planetaru r temporu suoz inspicia coiunctione luminariu igit nisi fuerit applicatio cu retrogrado in coiunctione sua signu est serenitatis r in oppositioe sua similit In qrta aute hyemali si luna fuerit in coiunctione a centro a sole r a planetis retrogradis e suma rei r significatio eoz fortior qn erut r retrogradi r applicati cu sole. Si igit cotingit q inter sole r luna r omnes planetas retrogrados sint iste ptes cu ascensionib9 climatu erit pluuia in sumo sm q affirmat vis qrte r natura temporis r planetaru significantiu r lune: r si descendens fuerit de vno uel de duobus minuit significatio sm pportione sue vrtutis: r si no fuerit significatio ab altero istoru centroruz no erit quicq3 nisi venus humid9 humida aura in vere frigida: in hyeme fortior istaru significationu est q luna sit in longitudine ppinquiori minues in lumine suo. Ite si luna iugat planete retrogrado aut si in cetro ab eo r a sole r sic addens lumine signu est pluuie sm q affirmat tepus planetis. Sz qn erit coniuncta sicut dictu est r sit minuens lumine minuet id. Ite si planete sint retrogradi in secunda qrta circuli in hyeme vere aut autuno erit significatio fortior. Sz si tunc retrogradant in tertia qrta signu est magis diminutu: qr ventus meridionalis multiplicabit illic. Sz qn erit retrogradatio tn pte septetrionali erit pluuia cu ventis septetrionalibus. Qn vo fuerit directi in estate r luna in lumine suo minues r cotumabit erit signum grandinis fulguris r radioz. Si fuerint etia directi in pte septetrionali aut retrogradi in pte meridionali erit signu fulgur] r grandinis. ¶ Ite qn erit in prima qrta signi erit signu humiditatis a retrogradatioe planetaru r luna addens lumie inspiciem9 in ea sicut in qrta hyemali r centris lune positis. Et qn fuerint retrogradi cu sole in vna quarta erut fortiora in quarta secuda circuli aut i capite cancri aut in meridie qm multiplicabit ventus meridionalis humidus. Qn erit sol in secuda qrta circuli r fuerit in signo humiditatis inspice cetra que posui r planetas retrogrados r addetes in lumine suo fortificabunt. verutn si fuerit cu sole in vna quarta erit caliditas fortis valde coburens. Et si fuerint retrogradi in pma qrta silriter. sz si fuerint i inclinatioe meridionali erit aura

mitis ⁊ qñ applicabit̃ luna cum illis planetis retrogradis in centris no
minatis mouebit̃ ⁊ aera ad qualitates nubis grandinis ⁊ fulguris ⁊ cũ
fuerint illic directi debilitat̃ significatio. Qñ erit sol in q̃rta 3ª circuli ⁊
erũt planete retrogradi in illa pte illud est signũ humiditatis ⁊ hore plu
uie qñ manserit luna in centris dictis a sole: ⁊ cũ stat significatio q̄ sint
planete retrogradi pars eoꝝ pti terre ⁊ applicet̃ ps eoꝝ pti terre 3º. 7º. uel
q̃rto aut in p̄dictis centris: ⁊ erũt planete retrogradi in septẽtrionali pte
erit significatio fortioꝛ qñ cõiunget̃ eis luna ⁊ erit sol in centris dictis ⁊
ibi erũt planete addentes lumine: tũc si fuerint planete directi in pte me
ridionali ⁊ retrogradant̃ in pte septẽtrionali ⁊ applicabit̃ cũ eo planeta
⁊ luna est minuẽs lumine suo signũ erit pluuie ⁊ niuis tũc qꝛ directi age
bant tũc ptes septẽtrionales ⁊ cũ fuerit luna in cẽtro a planetis retrogra
dis si soluerint donec luna fuerit in centris tũc distillabit cõgelatio: sꝫ si
fuerit luna addẽs lumine suo soluet tũc illud. Itẽ qñ fuerit q̃rta ⁊c̃. hoc
extrahit̃ ab alkindo in. 4º. caº. ⁊ tres ꝓpositiões sequẽtes. Capitulũ. 3.

Tem si vis scire vim ⁊ debilitatẽ multitudinẽ ⁊ paucitatẽ pluuiarũ cõsidera naturã tpis ⁊ vim suã ac debilitatẽ fm q̄ dixi de gradibus nature tempis ⁊ ciuitatis. sed si fuerit nã tpis tui in sũmo frigida ⁊ humida tũc significatio fortioꝛ planetarũ ostendet significationẽ fortiorẽ pluuiarũ: ⁊ si natura tpis tui fuerit frigida ⁊ humida in equalitate tũc mediocrice ⁊ fm ꝓportionẽ viriũ significatiõis aque sig̃bit. Et cũ hoc si vis aspice naturã martis ⁊ veneris: ⁊ si fuerint frigidi humidi aut cali di ⁊ inter eos sit applicatio ex opposito aut ex obliquo p̄dictoꝝ ⁊ latitu do eorũ ⁊ erũt cõtinui cum sole aut vnꝰ eorũ. Deinde considera applica tionẽ lune cũ sole ⁊ centrorũ p̄noiatorũ ⁊ concordantiã. Si fuerit natu ra lune similis nature eorũ illud est signũ aque. Sꝫ si vis sua est debilis ⁊ cõcordauerit illis duobus hec figura: ⁊ nõ erũt retrogradi: ⁊ erit illud tẽpus estiuale aut vernale erit adhuc aqua multũ fortis ⁊ cũ hoc toni truũ fulgur ventꝰ ⁊ grando multa: ⁊ erit multitudo aut paucitas fm ꝓpi q̄tatẽ vapoꝝ terre ⁊ erit frigiditas venti ⁊ caliditas fm q̄ cõcordauerit latitudo lune ⁊ mansio sua a sole ⁊ ps ⁊ natura tpis. Si vo significatio p̄dicta fuerit i hyeme aut autũno nec fuerint retrogradi erit aqua debi lis distillãs durante tpe siccitatis. Si vo fuerint retrogradi in tpe veris ⁊ estatis ⁊ cũ fuerit in inclinatione meridionali in vere erit in sũmo qd̄ dictũ est ⁊ in estate minus ꝑ multitudine caliditatis in aere aut ꝑ modo appꝛopinq̃tiõis terre sue aut qꝛ erũt in fũdo eccentricoꝝ suoꝝ. Sꝫ si fue rint retrogradi in hyeme in declinatione septẽtrionali erit minus qd̄ di

co:si in declinatione meridionali erit plus si calidiores sint retrogradi
& in fundo eccētricorū suorū & fuerit tūc applicatio cuū sole ab opposito
& duorū planetarū siliter si hec sint in vere erit finis rei. In hyeme vo &
autūno minuet parū. Si vo in cōiunctione planetarū fuerit & duo pla-
nete cōtinui vnus alij ab vno cētrorū & natura lune silis illi & erit in vere
& hyeme illud ē signū pluuiarū & fuerit in estate & vere illud ē signū toni
truorum multorū cuz aqua. Si igit fuerint duo planete cōiuncti in centro
aut cōcordauerit illis luna in natura illud est signū pluuie sicut dico: sz
centro & hore qñ figurat illud tempus si luna fuerit adiuuans nā sua si
fuerit alius planeta a venere & marte in silitudine nature illorū augmē
tabit res ita q fiet quasi diluuiuz. Si vo fuerint oēs planete figurantes
ps eorū partē in centris pdictis & sint retrogradi in hyeme & autūno & i
inclinatiōe meridionali erit de rorib⁹ & pluuijs q interficiet populos &
ciuitates & clima pter pauca. Sz si fuerint in vere & estate retrogradi & i
inclinatione meridionali erit siliter nisi q nō cōicabit res cum oibus &
erūt cū hoc fulgura & tonitrua & grando fortis. Cū autē fuerint retrogra
di in quarta estiuali & tempus estiuale nō erit significatio sup aquā erit
siccitas sūma in climatib⁹ septentrionalib⁹ & calor fortis q interficit po
pulos pcipue q erūt pPe equationē diei. Qñ autē erit significatio pluuia
lis duorū planetarū & fuerit significatio cōsūmens de trib⁹ reb⁹ non erit
quicq̃. Cū fuerit significatio pluuialis de duob⁹ planetis aut tribus uel
q̃ttuor i estate erit sūme mitis aura illi⁹ estatis & pue caliditatis: nec erit
aqua multa nisi fuerit significatio de quinq planetis. ¶ Itē si vis &c. hoc
ex .5.° ca.° Alkindi. ¶ Hic possunt notari quedā q̃ ab alkindo dicunt in
istis capitulis vltra practicā pdictā. quere hoc &c.

Capitulū quartū.

I Tem aspice hora coniunctionis aut puentionis & q̃rta &
prima & secūda ad lunā cū quo applicat illa hora si cum
venere & mercurio significat generationez pluuie in illa
septimana & hora illi⁹ erit sm quantitatē graduū qui sūt
inter lunā & planetas duos quibus applicatur & ponā scz
gradū p die & minutū p hora: & qñ luna consequit gradū
illius planete cui applicatur & venus in scorpione aut i capricorno aut
in aquario erunt pluuie multe. similiter mercurius stat in aliquo illorū
triū significat pluuiā. Et quando fuerit venus & mercurius in pdictis si
gnis & luna opposita aut cōiuncta illis in quarta sui significat pluuiam
¶ Item aspice &c. hoc Alkindus in. 6.° ca.° versus capituli finem.

Capitulum quintū.



Item nō solum oportet considerare cōiunctionē uel oppositionē luminariū ad sciendū fortitudinē uel mansuetudinē accedentiū: sꝫ iudicanduꝫ est etiam qñ luna fuerit dimidiata in luce ⁊ erit principiū signate mutationis ut plurimū ꝑ tres dies anteq̄ꝫ luna sit cum sole: ⁊ post etiam ꝑ tres dies ita ꝙ sit in elongatione partiū equaliū. Similiter sciemus hoc a ꝑticipatione quā habebunt cum planetis ⁊ qōlibet horū statuū ⁊ aliorū sicut est in sextili ⁊ trino aspectu ⁊ poterimus scire mutationes sequēdo concordantiā naturales planetarū quas accipiūt ⁊ signorū cū aere nos circūdante ac ventorū: ⁊ virtus horū statuū ꝑticulariū qui erūt die q̄libet erūt ꝓprie a stellis fixis que sūt luminis ⁊ operationis maioris cum apparuerint vespere siue mane ex parte orientis uel occidentis respectu solis qꝛ reducūt ut plurimū status ꝑticulares in naturas earū. Similiter erit nō minꝰ ꝙ aliqō luminariū transit ꝑ angulos ita ꝙ mansuetudo ⁊ fortitudo que erit in statibus cuiuslibet temporis accidunt qñ transibūt luminaria ꝑ hec loca sicut recentia ⁊ minutio sunt ꝑ transitū ꝑ hec loca ⁊ mutatio: statuū ventoꝝ erit ꝓprie qñ transibunt luminaria ꝑ hos angulos ⁊ mutatio sua erit vento qui erit a parte vbi erit latitudo lune. Et qñ ꝑticularia accidentia erūt similia vniuersalibus opus fortificabiť ⁊ certificabiť. Item nō solum ⁊c̄. hoc a Ptolemeo. 12ᵒ. caᵒ. secūde ꝑtis. ¶ Sciendū ꝭm haly ibidē ꝙ ꝑ oppositionē sciemus quid accidat in secūda medietate mensis si mēsis fuerit cōiunctionalis uel ꝑ cōiunctionē si fuerit oppositionalis. Et ꝑ quartā lunationis sciemus id qō accidit in illa quarta iudicādo sicut ꝑ cōiunctioneꝫ ⁊ oppositionē ⁊ ꝑ compationē ꝑticularis ꝙ vniuersali ī sciemꝰ illud qō accidet in illa q̄rta. ¶ Itē sup verbo illo signate mutationis ⁊c̄. exponit sic. Luna currit ꝑ vnū duobꝰ diebꝰ cc mplet] ⁊ vna ꝑte tertij ⁊ ex hoc posuit Ptolemeus cōpletū diē ꝓpter breuitatē. Et qꝛ virtus corꝑis lune est añ uel post ꝑ. 12. gradus ꝓpter hoc fiunt tres dies. hoc enī dictū exponitur duobꝰ modis. Primo mō ꝙ luna transit in. 6. diebꝰ duo signa cōpleta ⁊ transeūdo duo signa ꝑuenit ad tot numeros graduū quot sūt in firmamento sextili ⁊ sic ibi oportet ꝙ applicet ad punctū dñi significationis in tribꝰ ante ⁊ in tribus post ⁊ hora qua ꝑuenit ad ipsū moueť significatio illa. Secūdo modo intelligiť ꝙ virtus lune voluiť cū virtute solis tribus diebus ante suā applicationē ⁊ sic etiam remanet iuxta vsq̄ꝫ ad tres dies post suā applicationem qꝛ corpus solis habet. 15. gradus añ ⁊. 15. gradus post. ⁊ corpꝰ lune. 12. ante ⁊. 12. post. Modus autē primus ma

gis cōcordat cū opinioue Ptolemei nihilomin⁹ vterq; habet rationem ₇c. ¶ Notandū φ sicut in morbis acutis q̄rta ut plurimū est nūciatiua septime ₇ sic p tres dies añ apparet signū salutis uel timoris ita suo modo añ ɔiunctionē uel oppositionē solis ₇ lune potuit apparē principiū signate mutatiōis in aere. Quere igit̄ causā hui⁹ si placet in dieb⁹ creticorū. ¶ Sciendū iterū φ qñ luna distat a sole. 45. gradib⁹ añ uel post dicit̄ in centro a sole ₇ ppter ppinquitatē cōiunctiōis ul' oppositiōis si aer mutet̄ tūc sicut cōsueuit fieri potissime cū luna ē in centro a sole fm Alkindū ₇ plures alios magis ad siliitudinē signationis uel oppositionis mutabit̄ q̄ȝ ad similitudinē signatiōis alteri⁹ figure: hoc aūt fit trib⁹ diebus cōpletis añ cōiunctionē ₇ trib⁹ diebus post. vnde signator cōiūctionis modicū variauit locū suū in zodiaco in tanto tpe ₇ iō illū locuȝ uel stellā fixā quā aspicit: uel fuerit in centro ab eo qñ distat luna ab eo per 45. gradus. s. a sole. ¶ Sciendū fm haly vbi supra φ in qualibet applicatione lune cum sole debes formare angulos ₇ inspicere sicut prius in cōiunctionib⁹ ₇ oppositionib⁹. ¶ Itē fm haly ibidē stelle lucentes sunt ille que sūt prime magnitudinis ₇ postea secūde magnitudinis ₇ sic de alijs: ita φ virtus earū crescit cū mane apparuerint exeūdo radios solis aut intrādo sub radijs solis ₇ sic virtutes solis ₇ lune q̄uis sint victrices tendūt tamen ad virtutes earū ₇ postq̄ȝ ita est cū stellis fixis magis debet hoc iuenire in planetis. p cōmixtionē igit̄ virtutū earū poterim⁹ scire accidentia pticularia cuiuslibet diei. ¶ Itē haly exposuit siliter Non minus ₇c. vult dicere φ qñ aliqđ luminariū transibit p aliquē angulorū qui fuerit in applicatione sua prima signabit p additioneȝ uel diminutionē accidentis applicatiōis ₇ additio erit significatio sui transitus fuerit ipsa met significatio radicis uel minutio si significatiōes sunt diuerse. Et postq̄ȝ ita est φ applicuerit gubernatori aliqđ luminarium uel ipsi gradui significatiōis faciet idē vnde grad⁹ significatiōis luminariū qđ fuerit supra terrā in illa applicatiōe post modicū gradus solis ē gradus significatiōis. Siliter fm fortitudinē āguli erit fortitudo rei ₇ mansuetudo: qm̄ ascendēs ₇. 10ⁿ fortiores sūt alijs: ₇ etiā hoc pȝ i crescentia maris ₇ nili. Unde qñ luna transit p aliquē gradū sigtionis fit in crescētia additio. vbi gratia: qñ luna transit p illud signū qđ fuit ascendēs in cōiunctiōe uel oppositione añ introitū solis in cancrū uel aliud signū ₇ applicat gubernatori uel transiuerit p locū ɔiūctionis uel oppositionis sigt augmentū nili nisi alia maior sigtio hoc disturbet. Item venti mouent̄ de vna pte ad aliā hora qua transit aliqđ luminariuȝ p aliquē angulū ex angulis ascendētis sigtionis fm ptē ad quam declinat latitudo lune ₇c.

Capitulū sextum.

Item si ille qui dn̄at in cōiunctione uel oppositiōe fuerit humectans ⁊ cōmiscebit̄ cū stellis fixis humectantib⁹ ⁊ locus cōiunctionis uel oppositionis q̄ p̄cessit in loco humido aut luna uel sol in tali loco. hec res si vna. s. applicuerit alteri aspectu aliquo signat q̄ erit illa dies humida ⁊ multe pluuie. Et si saturnus rebus istis applicueri t erit pluuia fortis ⁊ damnosa cū lubrigat̄. Et si iupiter erit tē peries ⁊ tempus saporosum ⁊ omnes alias applicatiōes intelliges hoc modo. ¶ Itē quottidianos imbres lunaris p̄ singula p̄gressio manifestare poterit ipsi⁹ g̊ in cardines ingressus eiusq̄ cū venere ⁊ mercurio ac reliquorū cum ipsa stellarū dū alestina transit aut oppositori applicatio cognitionē nō effugiat signa nāq̄ aquosa ingrediens ⁊ supradictis stellis applicās ipsa die pluuias signat ⁊ generat. ¶ Ad cui⁹ rei maiorē euidentiā signa aquosa scire necesse humide: ⁊ sūt venus ⁊ mercuri⁹ nature ⁊ luna expressius tanq̄ mercuri⁹ ⁊ venus ⁊ luna amicant̄ imbrib⁹. venus itaq̄ horis qōlibet signorū obtinens aut lune itidē applicās imbres signat venus itidē cū mercurio in signis aquaticis ⁊ luna similiter sz in fine signi alteri eo℞ applicans ⁊ multos p̄fitent̄ imbres pauciores tn̄ q̄ in principio. luna itidē cum venere absq̄ mercurio in signis aquaticis itidē nō aliud q̄ luna cū mercurio ibidē venere remota. Amplius luna i huiusmōi quolibet veneri ⁊ mercurio applicās dū pluuiarū obtineant signa. pluuia℞ notāt ↄstantiā q̄usq̄ luna ab eis recesserit. ¶ Uenus iterū mercuri⁹ ⁊ luna maliuolis applicantes nec eisdē cōiuncte die ipsa pluuiā inducit. applicātes autē eidē aut cōiuncte negant: ven⁹ cum sole locata dū vtriq̄ mercurio ⁊ lune iungat̄ eadē die nubib⁹ redūdant. Mercuri⁹ autē ⁊ ven⁹ capricornū applicās ⁊ luna in tauro aut i piscib⁹ idē. Irē p̄dictarū altera in capricorno ⁊ luna in tauro aut in virgine veneri ⁊ mercurio de oppositiōe applicās ad ipsuz p̄cipue dū luna i tauro cū cauda moret̄ ⁊ a saturno recedat: ac venus cū ipso marte in aquario ⁊ mercurio in piscib⁹ aut capricorno ea nāq̄ die imbrib⁹ ether onorat̄. ¶ Itē si ille ⁊c̄. haly in fine glose. 1° ca° secūde p̄tis q̄driptiti Ptolemei Itē quottidianos ⁊c̄. haomar in penultio ca° ⁊c̄.

Capitulū septimū.

Item cū sol est in hemisperio australi ⁊ ven⁹ sub radijs ei⁹ eidez luna applicāte ipse die ⁊ hora p̄tendit imbres futuros: nō min⁹ quoq̄ mercurio adusto si luna eidē applicat aut eidē opposita i scorpione moret̄. hoc etiā idē martis ⁊ veneris sub scorpiōe ventos indicabit. Itē cū sol est ⁊c̄. Ista p̄positio cū consequentib⁹ habet̄ in libro Cū multa ⁊c̄.

Capitulum octauũ.



Tem sole in aquario existente luna eidē applicante aut in ei⁹ oppositione locata ꝛ ven⁹ ibi cōmoret̃ in ipsa hora pluet. Itē quoqȝ solis ad venerē aut veneris ad solē applicatio luna in eoꝝ oppositiōe aut tetragono discurrēs cū venus cōbusta fuerit certū de pluuijs fiet iudiciū: q̄ si cōuenerit ꝛ mercurius⁹ pariter cū illis discurrat imbres cōtinuos eadē die reportet. lunaris etiā: vnde licȝ i eis aspect⁹ nec imbres subierūt. Itē cū sol in libra ꝛ venus in sagictario luna eis comitate ipsa die pluuias inducūt ꝛc. Itē sol in aquario luna in leone eadē die min⁹ imbriū erit discursus: Itē mars sol respiciēs ꝛ luna dū venus ꝛ mercurius hāc aut illū comitant̃ imbres p̄ites ꝛ grossas insinuūt guttas. Sic quoqȝ in domo veneris aut martis ariete videlicet aut scorpione stille grandes tonitrua ꝛ coruscationes generant̃. Itē sol rursū in piscib⁹ uel ariete discurrens luna in virgine aut libra uel sagictario cōmorante in vaporosis vtiqȝ locis ipsa die imbriū tulit effluentiā. Ampli⁹ autē mercurij in eodē loco cū sole in domo veneris discurrēs ꝛ etiā luna imbriū stillas grauissimas lampades ꝛ tonitrua ꝓtendit. Itē in leone virgo pisces ꝛ etiā ariete libra scorpius luna in solis oppositione aut cū venere discurrēs stillas nō sine lampadib⁹ tonitruo ꝛ fulgure mittit. Itidē etiā luna in leone lāpades tonitrua ꝛ fulgura generant̃: pari q̄ȝ mō in regionib⁹ eqnoctialib⁹ linee subiectis in secūdo climate tertio uel q̄rto horū inerit mediocritas i. 5°. ꝛ in. 6° remissi⁹. mars quidē retrograd⁹ si eū aspexerit sol: fulgura quidē virentia cadūt. Item luna in hospitio martis. s. scorpiōe. Mars autē in suo dn̄io posito discurrēs sol in aq̄rio uel i piscib⁹ situs die ipsa pluuiaꝝ notāt redūdātiā. Sole quidē in piscib⁹ ꝛ luna ꝛ marte i respectu fulgura erūt ꝛ tonitrua ꝛ pluuiarū redūdātia ꝛ fulgurū laps⁹. Itidē etiā sol i ariete ꝛ scorpiōe luna in leōe ꝛ sagictario aut i solis cōuentu. Itē sol in capricorno luna i tauro aut virgine piscibus aut scorpiōe vētos generat frigidissimos nō min⁹ eodē in capricorno ꝛ potissimū in aquario existēte dū saturn⁹ in oppositiōe eorū discurrat ꝛ alterū luna aspexerit. Itē sole ꝛc. hoc ibi supra.

Capitulū nonū.

Tem si luna sit in centro a sole iudicandū est sicut prius i oppositione uel cōiunctiōe. luna itaqȝ in mansionib⁹ eq̄lis cōplexionis ac siccis discurrens aut si deinceps stellis inferiorib⁹ q̄ loco sunt rationis aut in signis aquaticis superioribus applicet pluuiarum in maxima parte est iudicium. Signa autem aquatica sunt cancer leo scorpius ꝛ aquarius. Stella autem que rores portendunt sunt luna venus ꝛ mercurius. Si igitur lunam de huiusmodi signis

respiciāt aut cū ipsa morent̄ luna etiā de locis humidis eisdez applicet imbres innuit timendos: ea eni de locis siccis ⁊ equalib⁹ applicans uel respiciens mediocres oīno pluuias iducit. luna itidē in singulari ⁊ ꝓpria natura nebulas ⁊ imbres etiā raras affert candidas ⁊c̄. Jtem cū luna ⁊c̄. hoc extrahit̄ a Japhar in pagrapho Est itaqꝫ tetragonus. ⁊ forte hoc alibi ut credo satis habet̄. q̄re hoc. ¶ Uult tn̄ ibi q̄ a p̄mo ingressu solis in librā ⁊ p totū annū ⁊ in exordio anni ⁊ ꝯiūctionib⁹ ⁊ oppositionibus solis ⁊ lune ⁊ in centris lune fiat sicut docuit in cōiunctione i illa ꝓpositione Jnquires ⁊c̄. ad euidentiā p̄dictorū.

¶ Sequit̄ quinta pars libri de iudicijs mutationū aeris p cōiūctiōes ⁊ aspectus lune cū alijs stellis. Et aliarū stellarū ad inuicē ⁊ de p̄ntia lune ⁊ aliorū a sole in certis locis zodiaci.



Cum ad aliquē terminū certū dispositiōes aeris volueris p̄nosticare: scias primo loca omniū planetarū ad eūdem terminū: ⁊ ille planeta qui plures fortitudines uel testimonia habuerit i suis signis erit dispositor tpis s̄m sui naturā. Considera tn̄ fortitudinē aut debilitatē quā habuerit dispositor a cōiunctiōe uel aspectib⁹ suorū similiū aut suoꝝ contrarioꝝ: ⁊ ex loco suo in eccentrico ⁊ epicyclo ⁊ ex nā cōi tēporis ⁊ ex hoc iudica qualitates aeris. Sic igit̄ poteris p̄cognoscere q̄n erit calor p̄excellens q̄n plures planete calidi habuerint plura testimonia ⁊ cū hoc se aspexerint de tertio aspectu. Cognosces etiā frigus p̄excellens p testimonia frigidorū planetarū. Poteris etiā p̄cognoscere humiditatē p̄excellentē p planetas humidos abundantes testib⁹ ⁊ potissime cū se aspexerint de tertio ⁊ in signis aquosis. Cū ad aliquem ⁊c̄. hoc extrahit̄ a quodā libello q̄ incipit Ad p̄nosticandū diuersā aeris dispositionē ⁊c̄. ¶ Sciendū q̄ iste auctor sic ꝑtendit. Primo ponit signorum qualitates sicut prius patuit p tabulā. Postea ponit nās planetarū nec oīno sicut alij dicūt: dicit: saturn⁹ est sūme frigidus ⁊ ex ꝯsequēti siccus. Jupiter ē temperate calid⁹ ⁊ humidus plus tn̄ abundat in eo caliditas q̄ꝫ humiditas. Mars superflue calidus ⁊ siccus plus tamen calidus q̄ꝫ siccus. Sol temperatissime calidus ⁊ siccus: ⁊ ut verius dicam: inter qualitates summe equalis. Uenus temperate calidus ⁊ superflue hu-

humidus. mercurius autẽ inclinaт̃ ꝑ naturam suã ad eum planetaꝝ cui cõplectiт̃ ex planetis ⁊ signis: diciт̃ tñ in se frigidus ⁊ siccus. luna ṽo in natura sua diciт̃ temperate frigida ⁊ summe humida. Unde diciт̃ fons humiditatis sicut sol est fons caloris q̃uis sol sit temperatissime calid⁹.
¶ Postea dicit ꝙ planeta in domo sua habet quinqꝫ fortitudines ⁊ dignitates seu testimonia. ⁊ in exaltatione quattuor. in triplicitate tres. in termino duas. in facie vnã. ¶ Postea ostendit que sit domus exaltatio ⁊c̃. sicut prius ⁊c̃. patuit ꝑ tabulã vbi ꝙ ponit leonem ꝓ domo solis: cancrũ ꝓ domo lune. librã veneris. arietẽ martis. sagictariũ iouis. ⁊ capricornũ saturni. qꝛ ut dicit ibi fuerunt creati in origine mũdi. Postea dicit ꝙ quinqꝫ planete habent accidẽtales potestates in quinqꝫ signis residuis ut saturn⁹ in aquario. iupiter in piscibus. mars in scorpiõe. ven⁹ in tauro. mercurius in geminis vnde dicunт̃ eoꝝ accidentalia domicilia. Sciendũ tñ ꝙ nos vtimur hic. s. ꝙ planete in istis domicilijs tot fortitudines habent sicut in alijs ⁊c̃. Postea dicit ꝙ planete fortunanт̃ qñ aspiciũt seinuicẽ aspectu amicabili uel debilitanт̃ si aspiciunt se aspectu inimicitie. ⁊ hec amicitia uel inimicitia fit ꝑpter contrarietatẽ uel similitudinẽ signoꝝ in qualitatib⁹ primis sicut patuit prius. Ponit etiam ⁊ aspectus sicut pirus. Postea dicit ꝙ cõiunctionẽ dicunt astrologi aspectum fortissimũ. nos autẽ inuenimus multotiens oppositũ. s. aspectus q primus dicebanт̃ esse fortiores ⁊c̃. Postea dicit ꝙ alie sũt fortitudines uel debilitates planetarũ quas accipiunt ex diuerso esse in suo epicyclo scꝫ ortus ⁊ occasus ꝓgressio statio ⁊ retrogradatio: ⁊ sicut patebit inferius. Fortior est qñ est in ortu uel ꝓgressiuus q̃ occidentalis uel stationarius uel retrogradus. Postea dicit ꝙ omis planeta in supiori ꝑte sui deferentis fortiorẽ habet in istis inferiorib⁹ opationeꝫ q̃ in inferiori ⁊ hoc est ꝓpter eius motum velociorẽ ꝯm reuolutionẽ diurnã. veloci⁹ mouet̃: ipse ꝓbat ꝑ hoc ꝙ paralellus eqnoctiali a planeta descriptus eo existente in auge deferentis maior ⁊ plus distat a suo centro q̃ ille qui est descriptus eo existente in opposito augis ⁊ sic cũ magis spacium ꝑtranseat in equali tp̃e velocius moueт̃ ꝯm reuolutionẽ diurnam. Cum g̊ ꝯm ph̃os ⁊ astrologos ꝯm motus supiorũ mouenт̃ ista inferiora. ⁊ hoc etiã notabiliter patet ꝙ sol ascendit augẽ crescenт̃ vegetabilia: qñ autẽ recedit fit econuerso. hoc etiã patet potissime in effectib⁹ lune: qꝛ in qualibet oppositione ⁊ cõiunctione solis ⁊ lune fluxus est maximus: ⁊ hoc est qꝛ tunc est in auge deferentis. qñ autẽ est in quadraturis ad solẽ tunc fluxus minus ⁊ hoc qꝛ tunc est in opposito augis. Et nota ꝙ oriente luna cõgreganт̃ vndiqꝫ aque ⁊ tumulanт̃ ⁊ eleuanт̃ quasi versus suã causaꝫ ⁊

originē: ꝛ cessat talis eleuatio donec venerit ad mediū celi ꝛ cū ibi fuerit minuit̄ tumor ille ꝛ fluunt aque ad locum oppositū ꝛ generat̄ tumor consimilis ꝛ hec est causa quare sunt duo fluxus in die naturali ꝛ sic cacumen aque mouet̄ sicut luna ab oriente in occidēs ꝛ se tenet semꝑ versus lunā. ¶ Infortunant̄ etiam planete cū fuerint ꝓpinquiores zenith capitis ꝛ debilitant̄ cum fuerint remotiores. Postea ponit tabulam rotundā ad cognoscendum fortitudinē planetarū ꝛ totum patuit ꝑ tabulas prius positas in introductorio. Postea ponit practicam sꝫ nō oīno nec ita explicite sicut positum est: qđ tñ supius in textu dictū est extrahere aut ab alijs que explicite dicunt̄ aut ab illis que ꝑ suū ꝓcessum ꝛ per sua exempla dant̄ intelligi. ¶ Postea exemplificat ꝛ hoc ꝑ teipsum posses facere: poterunt etiā adduci exempla ad tempus nostrū. ¶ Nota ꝙ sicut ad cognoscendū quando erit aer aquosus cōsideranda sunt signa aquosa ita intelligendū de calidis suo modo ꝛ sic de omnibus qualitatibus ꝛc̄. ¶ Dubitatur vtrū planete veloci⁹ moueant̄ motu diurno eis existentibus in auge q̄ꝫ in augis opposito. videt̄ ꝙ nō: quia qñ velocius mouent̄ ꝓprio motu tardius mouent̄ motu diurno cū isti duo motus sint ad oppositas partes igit̄ ꝛc̄. Item dubitat̄ vtrū plus influant in ista inferiora cum sint in auge: ꝛ videt̄ ꝙ nō: q̄ꝛ cum ꝑ lumen opent̄ ꝛ corpa eoꝝ minora videant̄: minus vident̄ influere. Item exemplū de sole nō videt̄ ad ꝓpositum: q̄ꝛ ego dico ꝙ crescentia herbaꝝ ꝛc̄. nō fit ꝓpter propinquationē solis ad augē sꝫ quia sol est magis ꝓpe zenith capitis.

¶ Item videt̄ male dicere ꝙ aque fluūt ad locum oppositū lune ꝛ generat̄ ibi tumor quia cū luna sit quasi mater humiditatis videt̄ ꝙ in parte opposita nō debeat esse tumor aque imo tm̄ versus lunā. Ad primū quere residuū.

Capitulū secundū.

Item cū volueris scire temporis varietatē: scito signa diuersorū planetarū vtrū sint calida uel frigida: ꝙ si fuerint calida signāt calorem in estate ꝛ temperamentū in hyeme. Si in signis frigidis signant frigiditatē in hyeme ꝛ temperamentū aeris in estate. Similiter cū cōiuncti fuerint in aquaticis signāt supfluas in hyeme pluuias ꝛ temperamentū uel multitudinē roris in estate. ¶ Item cum fuerint planete ponderosi quibus debet copulari aspectus solis in directo alicuius ciuitatis. s. in signis septētrionalibus signāt siccitatē ꝛ terre sterilitatē. Cū vero elongati fuerint. s. cū fuerint in meridionalib⁹ signat multitudinem pluuiarū. ¶ Item ponderosi omnes orientales signant multitudinē pluuiarū in hyeme ꝛ nimiā siccitatē in estate si occidentales fuerint. Stella rursū in qualibet domo eiusdē nature discurrēs ꝛ recepta dū recipiens bonū obtineat locum debitus oīno sequit̄ effectus.

optima quidē ⁊ maior de efficacia certitudo ſi in ipſiꝰ natura cōſtiterit. Ad hec etiā luna cū ioue ⁊ venere ac mercurio ex vna pte applicans imbres generat eſtiuātes. In auſtro quidē magis imbribꝰ opportunū reuere potiſſimū ⁊ ioue receptis ⁊ luna gradū ſolarē in cōuentu euaſerit. Saturnꝰ eni in ſignis humidis pluuijs minime ꝯtradicit. ⁊ hoc modo i lune applicatione exequendū erit. ſi vō in eadē pte ꝯiūgant̄ duo inferior ſub ſupiori moret̄ cuiuſmodi ſūt mercuriꝰ iupiter ⁊ venus ⁊ mars. luna etiā ⁊ ſaturnꝰ quotiēs igit̄ ambo cuiuſlibet inferiori applicet poſtq̄ꝫ inferior a ſupiori ſeſe euaſerit rores eſtuare neceſſe eſt. ¶ Itē cū volueris ſcire ⁊c̄. hoc habet̄ in .6°. caꝰ meſſahalach: qualit̄ debeā planetis ponderoſis copulare ſolē. q̄re. Stella rurſū ⁊c̄. hoc habet̄ i libello q incipit Cū multa. ⁊ qꝫ ſatis obſcure loquit̄ querat̄ expoſitio.

Capitulū tertiū.

ITem teſtimoniū eſt ut cū mane videat̄ quantū eſt a ſole in ſaturnū ⁊ tantuꝫ a loco lune cōputet̄ ꝙ ſi cōputatio finiat̄ in domo martis uel ſolis ſerenitatē notant: ſaturni nubila: lune veneris pluuiā. mercurij ⁊ iouis ventos: manſio etiā notanda ē in qua finiat̄ cōputatio ſi ſit humida uel ſicca ſm̄ quā iudica. Itē ſi hāc partē mercuriꝰ aſpiciat aut potius cū ea eſſe cōtigerit eadeꝫ die ventos ꝓcreari neceſſe eſt: fortiores quidē luna eā comitante ꝑcipue ſi venꝰ eidem cōſors extiterit. Itē conſidera introitū lune i primo pūcto cuiuſlibet ſigni ⁊ qui eā de proprio fouebit aſpectu ducatꝰ officiuꝫ ꝓ huiꝰ rerū indagatione merito vendicabit. Itē magnū teſtimoniū ⁊c̄. hoc in quodā extrauagāti caᵒ q incipit Uolens aūt ſcire. Idē Abraham auenezre. Ideꝫ in libro haomar in fine capli 2ᵢ q̄uis ibi dicat̄ ꝙ ab haomar fuit ꝑtermiſſa hec pars: ipſe tn̄ nō poſuit ꝙ ſi cōputatio finiat̄ vſqꝫ ibi. Itē ſi mercuriꝰ hauc ptē aſpiciat ⁊ ꝑcedentes hoc vltimū nō ponūt. Sꝫ ſi oīa hec cōcurrūt fortius efficiet̄ iudiciū. Itē conſidera. hoc haomar in fine capituli ſecūdi.

Capitulū quartū De hora pluuie.

ITem luna intrās cancrū hora ſolis. virginē hora veneris. librā hora iouis. ſagictariū hora ꝓpria. taurū hora martis. geminos hora mercurij. ſi gt ſm̄ naturā dn̄i ⁊ ſigni in quo tpe eſt. Itē cuꝫ luna intrat aquariū uel ſcorpionē uel capricornū hora ſaturni ſignat q̄ hora erit mutatio aeris. Qn̄ aūt ps. i. gradꝰ triū planetaꝝ a q̄ꝫ veneris. ſ. ⁊ mercurij ⁊ lune erit in aliq̄ ſignoꝝ aque ⁊ diriget̄: in illo abūdabit pluuia adeo ꝙ nocebit pplo. Itē luna intrās ⁊c̄. hyſpalenſis ideꝫ niſi ꝙ ipſe dicit ſignat pluuiā ad modū ſigni in q̄ dies ſigni uel hore eſt Alkindus etiam ibidem niſi ꝙ ipſe addit leonem hora iouis aut etiam libram ſignificat pluuiam ⁊ ventū ſm̄ naturā ſigni ⁊ ꝙ erit de ſubſtanta iſtorum ſignorū erit. Similit̄ idē haomar niſi ꝙ ipſe dicit ſagictariū

hora mercurij ꝛ ibi dicebat̃ geminos hora mercurij. dicit etiã geminos leonẽ aut libram hora iouis subintrans vbiq; imbres ventos atq; fulgura signare credit̃. Ea etiã rursum scorpij signuȝ hora saturni ingressa ventos nũciat frigidos. nã ipsius in aquariuȝ uel pisces ingressus aera ꝑturbat ꝛ ꝑuertit. Item cũ luna intrat aquariũ ꝛc̃. Alkindus igit̃ sciendum ꝙ gs hec accipit̃ ꝑ gradu ꝛc̃.

Capitulũ quintũ De signo oriente ꝛ asupb.

Item hora transitus stelle de signo in signum: oriens certissimũ dinoscat̃: vnde si fuerit signũ aquatĩcũ designat pluuias: melius quidẽ signũ hui⁹ luna possidente pluuiarũ administrat ducatũ cuiuscũq; luna applicabit stella. quotiens enĩ luna eã cui applicat stellam sequit̃ inundatiões pluuiarũ innuit. Venus rursũ atq; mercurius quotiens vterq; alter signũ aquaticũ possidet ꝛ luna eis adiũcta imbres adauget nisi forte in maliuolo aspectu uel cõiunctione cõmoretur. Itẽ saturno transeunte de vno signo in aliud fiunt dyachintes q̊s arabes vocant assub: uel quedã alia signa de natura ignis. Item venus intrans cancrũ pluuiã facit. Item hora transitus ꝛc̃. hoc haomar versus finẽ illius capl'i Quottidianos ꝛc̃. Item saturno transeũte ꝛc̃. hoc in floribus hermetis. põt hic notari. s. tempus generationis cometarũ ꝛc̃. quere de hoc. Item venus intrans ꝛc̃. hoc Albumasar ꝛ plures alij ꝛc̃.

Capitulũ sextum.

Item luna in signo feminino si aspiciat planetã retrogradum in signo feminino statim pluet. Itẽ luna iuncta planete retrogrado aucta lumine signũ est pluuie. Item luna in signo ꝛc̃. Hyspalensis addit cũ luna fuerit in domo feminina ut orientalis uel occidentalis quarta ꝛ considerat eã planeta retrogradus i signo feminino necessario pluuia erit ꝛ videt̃ ꝙ ꝓpositio hec supponat aliquã aliã significationẽ planetarũ sicut ꝑ apertionẽ portarũ ꝛ huiusmodi. ꝛ sic cõtinuaret̃ cum dictis hyspaleusis ꝑcedentib⁹. Item luna iũcta ꝛc̃.

Capitulũ septimũ.

Scias iterũ ꝙ luna declinatione meridionali qñ applicatur cũ directis ꝛ est signatio siccitatis mouet̃ aer ad sũmũ frigidũ si fuerit minuens lumine. Et qñ fuerit in declinatione septẽtrionali ꝛ calor est in estate ꝛ applicat̃ cũ planetis retrogradis ꝛ erit addens lumine suo mouebit̃ diuersitas ventorũ ꝛ si fuerit minuẽs lumine minuet̃ illud. Itẽ si lune in scorpione opponit̃ mars pluuie abundabunt maxime si fuerit sol in aquario uel piscibus. Itẽ cum luna est in opposito aut cuȝ

venere in piscibus ariete libra ꝛ scorpione erunt lampades tonitrua ꝛ fulgura. Scias iterū ꝛc̄.hoc Alkindus in fine quarti capituli. Itē si lu ne in scorpione ꝛc̄. Itē cū luna ꝛc̄.

Capitulū octauū.

Item cū sol est in hemisperio australi ꝛ venus sub radijs eius si luna sibi applicet statim pluet. Item cū venus in scorpione uel aquario uel capricorno cōiungit͡qꝫ luna ei uel eā aspicit significat pluuiā multaꝫ. Similiter mercurius in statione aliquo triū p̄dictorū signoꝝ sic fit tribus planetis cōiunctis in aquario. Item cum luna mercurio adusto applicat aut de scorpione opponit̄ pluuiā. Item cuꝫ sol ꝛc̄. Itē cum venus ꝛc̄. Item cum luna mercurio ꝛc̄.

Capitulū nonū.

Luna igit̄ a marte discedens eadē die pluuias inuit in signo p̄cipue aquatico p singulos autem dies p signa que imbrib⁹ dicant̄ erit discretio sicut cancer scorpio aquari⁹ ꝛ leo: p̄cipue aquari⁹ ꝛ leo. Stelle iterū pluuiaꝝ significatiue venus mercuri⁹ ꝛ luna: potissimū venus ꝛ mars. venus iterū p̄dictoꝝ qd̄libet occupans dū ea in extremo signi uel medio cōmoret̄. Luna iterum signa aquatica p̄meando veneri applicans eadē die pluuiarū innuit redūdantiā. Uenus itidē ꝛ mercurius dū huiusmodi signa pambulant etiam luna sił'iter alteruter applicans ꝛ finē signi obtinens pluuias priorib⁹ tñ minores aduehent. Luna itidē ꝛ venus in signis aquaticis mercurio ab eis remoto pluuiarū habet iudiciū nec aliud dū mercuri⁹ ꝛ luna ad hui⁹modi signa p̄ueniūt licet venus in pluuioso nō ambulet. Luna in eisdē signis veneri ꝛ mercurio applicans dū similia gradiant̄ aut cū eadem discurrant donec luna ab eis separet̄ pluuias renouāt. Luna igit̄ a marte ꝛc̄. hoc haomar i fine ꝛ aliqua ibi ponunt̄ que sūt similia eis seu illis que sequūtur in illa ꝓpositione que sic incipit Item quottidianos imbres ꝛc̄.

Capitulū decimū De planetis pluuiosis.

Item ex cōiunctiōe saturni ꝛ iouis fit frigus. Item si sol saturnus ꝛ iupiter fuerint in aliquo signoruꝫ aquaticorū ꝛ cauda cū illis timendū est in illa parte signi de pluuiis multis cū torrentibus corrūpentib⁹ ciuitates ꝛ hoc cum adiuncti fuerint in hyeme etiam similiter in estate ꝛ erūt nubes grando aut aues equitantiū ꝛ hoc erit ſm māsionem lune cū illis. Et si fuerit sol cōiunctus ꝛ saturn⁹ ioue ꝛ marte i vno

signo aqueo erit signū pluuie, ꝛ torrentiū nociuarū ꝛ pluuiarū: ꝛ fortius qñ adiungeť cum sole ꝛ marte in signo aqueo sicut ostēdi tibi ꝛ aspiciet eos saturnꝰ ex q̃rto aut cōiungeť cū eis. si fuerit in signo. 10º inspice venerem qñ intrabit sub radijs sicut mulier sub viro. Itē ex cōiunctiōe saturni ꝛc̄. hoc in floribꝰ hermetis. Itē si fuerit sol iunctꝰ ꝛ saturnus ꝛc̄. hoc in 6º caº Alkindi. ꝛ nota si placet que sūt stelle significatiue aque. hoc dictū est prius iō nō est vis. ꝛc̄. Capitulū vndecimū.

Item temperātia aeris fit ex cōiunctiōe iouis ꝛ solis ꝛ hoc maxime cū cōiūctio illa fuerit in signis aeris. Itē ex cōiunctione solis ꝛ martis in signo bicorpeo ꝛ tpe veris fit tenebrositas aeris ꝛ infirmitates frequenter cōtingūt. Itē estiuo tpe cū sol in termino martis fit estus i hyemali siccitas ꝛ paucitas pluuiarū. Itē cū iupiter fuerit cōmixtus in aliqua virtute cū marte estiuo tpe in signis aquilonaribꝰ certissime pōt p̄dici ꝙ nubes ꝛ scintillatiōes ꝛ tonitrua fient in aere: ita etiā ut piculū sit hoībus futurū ꝑpter aeris pestilentiā ex nimiā coruscatiōe futura. Itē tēperantia aeris ꝛc̄. hoc in floribꝰ hermetis. Itē cum iupiter ꝛc̄. hoc Albertus in fine capituli de tonitruis ꝛ pōt notari causa si placet ꝛc̄. Capitulū. 12.

Item martis ꝛ veneris sub scorpione cōuentus pluuiam facit. Item venus in scorpione existens a marte respecta ꝑpter maria que scorpio habet pluuiarū: si vo martis caret respectu ex relicto ducatu nō multa imbriuꝫ erit vbertas. Item martis ꝛ veneris ꝛc̄. Item venus in scorpione hoc in libello qui incipit Cū multa ꝛc̄. Capitulū. 13.

Item scias loca applicationis mercurij cū tribus supiori bus ꝛ cū quo applicať ꝛ a quo sepatus fuerit. Si cum saturno erit ventus fortis cum tenebra magna ꝛ puluere. Si cum ioue significat ventū mitē absq3 pluuia. Si cum marte ventos calidos. Si cū sole ventū calidū cum corruptione. Si venus applicat cū saturno significat pluuiā ꝛ erit forte grando in ea paruus ꝛ. q. solis pluuie nō residēt in ea. Item qñ mercurius applicuerit cuꝫ marte erit pluuia interpallata ꝛ ventus ꝛ fulgur. Et qñ venus cum ioue erit pluuia larga ꝛ descendet ꝛ ꝑficiet. Qñ luna cum saturno significabit nubes nigras cōculcatas vna pars conculcans aliā. Qñ cum marte: nubes interscissas ꝛ gelu ꝛ fulgura ꝛ forte apparebit arcus nec erit pluuia cōmunis. Qñ vo luna cum venere ꝛ ioue: erūt nubes ꝛ ros multe vtilitatis. Qñ vo cū mercurio: erūt nubes pallide colores fumosi ꝛ ventus bonus cū pluuia. Item scias loca ꝛc̄. hoc

Alkindus in octauo capitulo. Item qñ mercurius cũ marte &c. hoc Alkindus octauo capitulo &c.

Sequit͂ sexta pars de hora pluuie & vbi & qñ fortior aut debilior & que sint loca apta ad hoc & de duratione eiusdem. Capitulũ primũ.



Cum planete erunt in sũmo ad significationem sup pluuiã & luna siĺiter i loco significationis & applicationis gradu ad gradũ de centris a sole & planetis cũ ascẽdentibus climatũ: & erit ascendẽs supra horizontẽ aliquorũ illud ẽ signũ hore pluuie in loco vbi sic ascendit. Et fortior significatio ẽ illi cui firmat luna illa hora i angulo terre sue dũ tñ fuerit cũ planetis significatorib⁹ in eqdistante equatori diei etiã si planeta sic ascẽdebat cũ luna supra horizonte ꝙ p horizontẽ fiat illa hora abscisio supra punctũ qđ ascendebat cũ luna in signorũ circulo etiã vbi luna fuerit in medio celi si sol sit in ascendente multiplicabit͂ res & qñ fuerit aliquis signatorũ in angulo terre aut orientali aut occidentali aut medio celi res durabunt donec cadant planete signatores. Durabunt etiã humores ꝙdiu sol & luna & signatores fuerint applicati pars eoꝝ parti. Et etiã res ꝭm numerũ planetarũ ad angulos illi⁹ terre tũc qñ ceciderit sol & luna & planete pars eorũ a parte de gradib⁹ applicationũ ꝙuis planete sol & luna manserint in angulis: nõ erit aliqs vbi applicuerint ad inuicẽ & cũ hoc fuerit eorũ pluuialis dignior est significatio cũ fuerit applicatio grad⁹ cum gradu & vnus planetarũ ad angulos nõ erũt vires ita fortes ꝫ minuet͂ multũ nisi fortificauerit hoc. Alia significatio aut ipsa met in seipsa &c. Cũ fuerit sol i hora pricipij significationũ in medio celi debilitabit͂ & minuet͂. Qñ erunt loca eleuata erit significatio fortior: & qñ depressa durabit humiditas donec compleant͂ nature & abscindant͂ planete a centris planetis: cũ fuerit in hora applicationis cũ gradu planete & luna cadentes ab angulis horizõti aliquorum debilitabit͂ significatio apud eos & tũc erunt nubes cum fuerit sol in horizonte orientis & luna & planete significatores in horizonte occidentis & in angulo est signum pluuiarum & horarũ suarum.

Item cū fuerit sol in horizonte occidentis ⁊ luna in horizonte orientis ⁊ aliquis planetarū in angulorū terre aut in medio celi in hora applicationis signū est pluuie. Scias debiles significationes nō significat in littorib⁹ maris ꝓpter multā depressionē nisi rores ⁊ nubes: ſʒ significant in locis electis ⁊ erit pluuia cū fuerit sol ⁊ luna ⁊ planete pars cū parte i centris pluuialib⁹ ꝑdictis in horis applicatiōis gradus cuʒ gradu ⁊ qñ fuerit aliquis planeta ⁊ signatores in aliquo angulorꝫ si sol tūc fuerit super zenith capitū debilior erit significatio: si fuerit significatio pluuialis in aliquo loco ⁊ nō sit i alio tñ locus a quo ventus venerit supra populū ostendit: vbi fuerat significatio respectu sui. Aer eni soluit partem frigidā humidā constrictā de parte calida. Qñ planete ⁊c̄. hoc Alkind⁹ caplo quinto paragrapho noiato ⁊c̄. Capitulū secundū.

Cum errauerit modus ꝓphetandi. i. iudicandi cū venere ⁊ marte: ꝓpheta ⁊ iudica cū ioue ⁊ mercurio. si eni fuerit humidi aut frigidi ⁊ fuerit inter eos applicatio de cētris ⁊ de sole ⁊ luna ⁊ cōcordauerint applicatiōes ꝑs parti ⁊ hora tpis de. 4° 7° 3° ⁊ sextili aut cōiunctione illa est hora pluuie ⁊ de deblitate ⁊ fortitudine ⁊ loco ꝓ retrogradationē pausationē applicationē ⁊c̄. indicabis sicut dictū est de venere ⁊ marte nisi ꝙ minus significāt q̄ʒ mars ⁊ ven⁹ ⁊c̄. Similiter aspice saturnum ⁊ solē si fuerint humidi calidi aut frigidi humidi ⁊ iudica ꝑ applicationes ⁊c̄. sicut fecisti cū ioue ⁊ mercurio ſʒ remissius significant q̄ʒ venus ⁊ mars iupiter ⁊ mercurius ⁊ significatio fortior est cū vni significationi addunt̄ alie. Itē significatio triū significatorū cōis est in omni loco ⁊ similiter. 4° 5° 6° 7° nā nūq̄ʒ fallit vſqʒ ad septem ⁊ sūt vires sue ꝑm elongationē loci ab equatore diei. scias ꝙ in locis in quib⁹ sūt aque fortior significationū forte te decipit in estate aut media in vere: ſʒ i hyeme debilior nūq̄ʒ fallit. in autūno forte ibidē poteris decipi quantū ad horam ſʒ in tpe generationis nō mentiet̄ quicq̄ʒ. Scias ꝙ signū rerū ⁊ pluuiarū est qđ sit hora cōiunctiōis vnde luminariū significatio pluuialis ⁊ illud certius omni mense aut hora oppositiōis solis q̄ mutat̄ temp⁹ de natura ad naturā. si eni fuerit significatio pluuiosa illud est fortius i omni quarta ꝙ fiat ad illud tempus. Cū errauerit ⁊c̄. hoc vbi supra cōsequentis ⁊ dependet hec ꝓpositio ex illa precedente. Si vis scire vim ⁊ debilitatem ⁊c̄. Capitulū tertiū.

Die illa ⁊ hora pluet cum luna in cardine ⁊ in aqueo applicat veneri ⁊ mercurio ⁊ durat q̄ʒdiu durat applicatio. Die illa ⁊c̄.
¶ Item cū fuerit luna applicās alicui planete aut ipsa separata

⁊ fuerit eoꝝ latitudo eqnoctialis: eadẽ die luna faciet opꝰ illiꝰ plãete. Cũ fuerit luna in aliq̃ angulo ꝝ hemisperij ⁊ planeta in ipso linee anguli eq distans cũ luna: aut in aliq̃ angulo eiusdẽ hemisperij faciet opꝰ illiꝰ planete. Cũ fuerit luna in oppositiõe alteriꝰ planete etiã fuerit eoꝝ latitudines ab ecliptica in diuersis ꝑtibꝰ eq̃les uel fere: luna faciet opꝰ eius. Cũ oriẗ luna aut occidit seu aliũ angulũ intrat ⁊ aliꝰ planeta sibi illũ angulũ attigerit ꝑpter varias latitudĩes licet etiã sint disiũcti p gradꝰ eq̃les tñ faciet opꝰ illiꝰ planete. Itẽ cũ fuerit luna applicãs ⁊c. hoc in aliquo antiquo auctore inueni: sꝫ hoc a magistro meo habui ⁊c.

Septima ps de mutatiõe aeris que ẽ p signalia supiora q̃ p methauro rũ sniam hñt cognosci. Et quedã alia signalia vulgariẗ approbata.

Capitulũ primũ De coloris circa eclypsim significatione.



I color lumiariũ hora eclypsis uel apparẽs circa luiaria fuerit niger uel tendẽs aliq̃liẗ ad viridez sigt ea q̃ sũt de nã saturni. Sꝫ albũ parũ tendens ad croceũ iouis. Si tenderit versus vermiliũ clarũ martj. Si croceus tendẽs ad colorẽ aureũ: splendidũ venerj. Si vo colores diuersi fuerint mercurij. In oibꝰ alijs sigtionibꝰ p colores hoc mõ iudicabis. Et hoc ẽ magnũ iuuamẽtũ ⁊ cognoscendũ planetã dñantẽ: ⁊ si in toto corpe lunaris eclypsati aut in oibꝰ ꝑtibꝰ q̃ sunt circa appuerit color signũ ẽ ꝙ accidẽs ab eclypsi erit i maiori pte regionũ cũ accidente ꝯcordantiũ: si vo versꝰ illã ꝑtẽ accidẽs erit i regionibꝰ cũ ascendẽte ꝯcordantibꝰ q̃ sũt versꝰ illã ꝑtẽ. Si color luiariũ hora eclypsis ⁊c. hoc extrahiẗ a Ptolemeo haly in. 9º. caº. 2ᶜ ꝑtis q̃driptiti ⁊c.

Capitulũ secundũ De comete significatiõe vbi ⁊ qñ

I Tẽ p cometas fiũt iudicia vnde accidẽs erit i regionibꝰ ꝯcordãtibꝰ cũ signo in q̃ appuerit ⁊ in cuiꝰ signi directo extiterit ⁊ p colorẽ eiꝰ ⁊ formã scies cũ q̃ planeta ꝯcordauerit p quẽ scies q̃lita tẽ accidẽtis ⁊ ẜm q̃litatis ṽtutis planete dñantis ibi erit virtꝰ accidẽtis. Tẽpus etiã duratiõis signalis corrñdet duratiõi accidentis: ⁊ ẜm haly aspice ad horas q̃ sũt inẗ signale ⁊ ascẽdẽs sicut fit in eclypsibꝰ ⁊ erit cito uel tarde ẜm cõpationẽ eiꝰ ad solẽ. vnde si i mane matutinali apparuerit erit cito. Si i vespe erit tarde ⁊ generaliẗ facias sicut i eclypsibꝰ. Itẽ p cometas ⁊c. hoc ab eisdẽ ibi supra.

Capitulũ tertiũ.

Item aspice ad signalia apparentia circa solē cū orit̄ p sciendo illa q̄ accidūt de die: uel dū accidit p sciēdo illa q̄ accidūt de nocte: ꝛ p sciendo ea q̄ multū durāt. Inspice in horis quib⁹ sol hꝫ ꝑticipationē cū luna de figura qꝛ q̄libet figura mōstrat ut plurimū statū q erit ab ipsa hora vsq₃ ad horā q̄ luna se ponat in figura p⁹ modū veniēte. Itē aspice ꝛc. hoc ex. 13° ca° 2ᵉ ꝑtis quadripartiti ꝛc.

Capitulū quartū De ꝓnosticatiōe aure p arcū uel angulū solis.

Cum sol orit̄ uel occidit clarus limpid⁹ sine nubib⁹ uel alia re ipsū coopiente sigt̄ serenū diē: si ꝛ circul⁹ ei⁹ fuerit diuersorū colorū uel trahēs ad vermiliū sicut ignis: aut q₃ sint radij venientes a sole uel q sūt circa eū de vermilio: aut q₃ sint nubes q̄ dicte sūt soles ab vna ꝑte ei⁹ ꝛ assimilent̄ colori nubis tendētis ad vermiliū ꝛ fuerint radij solis extensi ꝛ longi sigbūt ventos fortes ꝛ mouebunt̄ a ꝑte q̄ ipsa signalia apparebūt. Si vo sol niger ascēdit uel q₃ tendit ad viridē uel occiderit cū nubib⁹ aut habuerit ab ambab⁹ ꝑtib⁹ nubes q̄ dicte sūt soles uel radij qui de sole exeūt tenderint ad nigritudinē uel viridem sigbit aerē hyemalē ꝛ pluuias. Itē sol pur⁹ oriēs atq₃ nō feruēs serenū diē nūciat: pallid⁹ grandinē. Si vo occidit ꝑdie seren⁹ ꝛ orit̄ tantus certior fides erit serenitatis. Itē sol cōcau⁹ oriens pluuias ꝑdicit. Idē ventos cū aūt exorientē eū nubes rubescūt q₃ si etiā nigre rubentib⁹ interuenerint ꝛ puluias. Itē si oriētis aut occidētis radij vident̄ coire pluuias ꝛ si cirra occidentē rubescūt ambos serenitatē futuri diei spondēt. Si vo in exortu spargent̄ ꝑtim ad austrū ꝛ ꝑtim ad aq̄lonē licꝫ sit pura circa eū serenitas tn̄ pluuias cū vento sigbūt. Et si in ortu aut in occasu ꝯtracti curuant̄ radij imbres mōstrant̄. Itē si in occasu ei⁹ pluat aut radij in se nubes trahūt asperā in ꝓximū diē tempestatē sigbūt. Cuꝫ in oriente radij nō illustres eminebūt q₃ circa circūdati nō sint: pluuiaꝫ ꝓtendit. Si aūt exortū nubes globant̄ hyemē asperā denūciabunt si ab ortu repellunt̄ ꝛ ad occasū adhibēt serenitatē. Si nubes solari circūdāt quāto minus luminis relinquūt tāto rubedior tēpestas erit. Si vo etiā duplex orbis fuerit contractior q₃ si hoc in ortu uel in occasu ita ut rubescūt nubes maxima ostēdet̄ tēpestas ꝛ si non ambiūt sꝫ incūbant a q̄cūq₃ vento fuerit eū ꝑtendunt. Si aūt a meridie imbrē. Si oriens tingit̄ orbe ex qua ꝑte rose ruperit vent⁹ expectet̄ si totus defluxerit equalit̄ serenitatē dabit. Itē si in ortu longe radius ꝑ nubes porriget̄ ꝛ medius inanis erit pluuias sigt. Si ante ortuꝫ radij se ostendāt aquā ꝛ ventū: si

circa occidens candidus circulus erit nocti leuē tempestatē. Si nebula vehementiorē. Si candente sole ventū. Si autē circulus erit ex qua regione ruperit se sigt magnū ventū. Item sol in ortu suo maculosus uel sub nube latens pluuiā p̄sagit. Et si palleat tēpestuosū denūciat diē. Si cōcauus videt ita ut in medio fulgens radios ad austrū et aqlonē emittat tempestatē humidā et ventosaz p̄nūciant. Si pallidus in nigras nubes ad aqlonē accidat ventū p̄sagit. Sero rubens desigt mane serenuz. Si mane imbres denūciat ab aqlone fulgur tonitruū p̄tendit etc. Cū sol orit etc. hoc vbi supra. ¶ Notandū s̄m haly sup illo verbo sigt serenum hoc est qr hoc ostēdit q̄ est oi fumositati limpid9. Itē color diuersus in circulo solis est mercurialis et color tendēs ad vermiliuz ignis cū fuerit radij veniētes a sole uel q circū fuerint ē mercurialis. Itē nubes q̄ dicū tur soles sūt q̄ reuerberāt radios solis et qn̄ tendūt ad vermiliū sunt etiā fumi de natura martis. Siliter etiā radij longi extensi monstrant fūmū siccū et p̄pter hoc sigt oia ista ventos fortes a pte in q̄ apparuerint. Itē nigredo et viriditas q̄ fumositas ē de natura saturni. Itē nota q̄ tota significatio signaliū ē certa si cōcordauerint cū figuris p̄mis luminariū q̄ tales habeāt significatiōes et p oia sic intelliges. Itē Alkind9 fere idē in fine capl'i qnti. Itē ☉ pur9 etc. hoc extrahit a quodaz libro qui incipit De tempestiua q est de tempestatū p̄sagijs vsq̄ ad istā partē. Item sol i ortu etc. hoc in quodā extrauagante Sero rubens. Idem Albertus.

Capitulū quintum

Item aspice ad locum lune die tertia ante cōiunctionem uel oppositionem: et die tertia anteq̄ sit dimidiata i luce uel tertia die post has horas et clare fuerit et circū se nō tennerint rem aliquā demōstrat serenū et si subtilis vermilia et qd remanet de suo circulo siue luce sit clarū assimilando q̄ moueat significat motū ventoꝝ a parte qua declinat et si fuerit nigra uel viridis spissa significat aerē hyemalem et pluuias. Item si circulus clarus solus circa eam sit qui paulatiue destruat significat aeris claritatem et si fuerint duo uel tres significāt aerem hyemalē. Et si tenderit ad vermiliū fumum et sit intercisus significat aerem hyemalem venientem per ventos fortes: turbidus aut spissus significat etiam aerē hyemalem cum grandine minuto. tendens vo ad viridez cū nigro et fuerit intercisus significat etiā aerem hyemalem et quanto plures fuerint circuli s̄m hoc res quas dixim9 erunt multe. ¶ Itē luna q̄rta maxime obseruat egypt9. Si suspendēs exorta puro nitore fulserit serenitatē. Si rubicūda ventos: si nigra pluuias p̄tendit. In. 15. cornua ei9

obtusa pluuia erecta ⁊ infesta ventos sp̄ signāt q̄rta cū marie cornu ei⁹ acuminatū septētrionalē atq̄ȝ rigidū illū p̄sagit vētū: inferi⁹ austrū vtraq̄ȝ recta noctē ventosā. Si q̄rtā rutilus orbis cingebat ⁊ vētos ⁊ imbres p̄mouebit: apud varronē ita ē. Si q̄rta die luna erit directa magnā tempestatē p̄sagit ī mari nō coronā circa se habeat ⁊ eā sincerā q̄m illo mō ⁊ nō plenā lunā hyematurū ostēdit. Itē si in plenilunio p̄ dimidiū pura erit dies serenos siḡbit: si rutila ventos: si nigra imbres: si aliquo orbe nubes incluserit ventos qua se ruperit: si gemini orbes cinxerint maiorē tempestatē ⁊ maiorē ventū. Si tres aut magis inrupti aut distracti nascēs luna si cornu sup̄iori abstracto surget: pluuias decrescens dabit Si inferiore aut pleniluniū si ī media illa nigritia fuerit imbrē in plenilunio. Itē si plena circa se habebit orbē ex q̄ p̄te marie splendebit ex ea ventū ostēdet. Si in ortu cornua crassiora habuerit horridā tēpestatē. Si an̄ q̄rtā nō apparuerit vento flauonio flāte hyemalis toto mēse erit Si. 6ª vehementi⁹ ⁊ flāmea apparuerit asperas tēpestates p̄sagit. Sunt etiā ip̄si⁹ lune. 8. articuli quotiēs in angulos solis incidat plerisq̄ȝ intrat eos t̄m̄ obseruātib⁹ p̄sagia ei⁹ hoc ē. 1. 3. 7. 11. 19. 23. 27. ⁊ interluniū ⁊c̄. Itē aspice ad locū ⁊c̄. hoc ex. 13º caº 2ᶜ p̄tis q̄driptiti Ptolemei. ¶ Sciendū q̄ꝫ q̄n̄ circul⁹ solis ⁊c̄. monstrāt q̄ꝫ fumositas ē ⁊ p̄pter hoc siḡt serenū Itē intersio mōstrat motū ip̄si⁹ fluui⁹ iō siḡt vētos. Alkind⁹ fere idē dicit in fine q̄nti caᵗ ⁊c̄. Itē lunā q̄rtā ⁊c̄. hoc ī libro tēpestatū p̄sagijs vsq̄ȝ ad illā p̄tem Considera colores ⁊c̄. Capitulū sextū.

ITem cōsidera colores circuloꝝ q̄ sūt circa planetas ⁊ stellas fixas lucētes ⁊ s̄m hoc sicut p̄ri⁹ iudica. Inspice etiā ad stellas fixas specialit̄ ad illas q̄ multū adiūctate vna circa aliā magnitudinē ⁊ colores: vnde si apparuerint maiores ⁊ maioris lucis q̄ȝ sole ⁊ siḡnt cursū ventoꝝ a quacūq̄ȝ p̄te fuerint. Itē nebulose p̄prie sicut stella q̄ dicta ē p̄sepe ⁊ alie tales si assimilabunt̄ coop̄te in t̄pe sereno q̄ꝫ vix appareāt uel q̄ꝫ sint spissi siḡnt multas aquas. Itē ɔsidera ⁊c̄. hoc ex 13º caº secūde p̄tis q̄driptiti Ptolemei vsq̄ȝ ad illā Itē cū repēte. ¶ Sciēdū s̄m haly q̄ꝫ q̄libet stella trahit fumū q̄ ɔcordat cū nā sua. q̄n̄ igit̄ multus fum⁹ apparuit in p̄te alicui⁹ eaꝝ siḡt q̄ꝫ virt⁹ illi⁹ vincet. Itē stelle que sūt multe adiūctate sūt stelle geminoꝝ ⁊ scorpionis. Itē stelle nebulose de quib⁹ facit mentionē sūt in magnitudine sexta. Idē fere Alkind⁹ in fine q̄nti capl'i ⁊c̄. Capl'm. 7. De p̄nosticatiōe aure p̄ stellas fixas.

ITem cū repente stellaruȝ fulgur obscurat̄ ut illud neq̄ȝ nubila neq̄ȝ caligine accidat graues signat tēpestates. Si volitarie plures stelle videbunt̄ quo ferant̄ albescentes ventos ex his p̄tib⁹ nūciabūt aut cursitabūt certos. Si illud in plurib⁹ p̄tib⁹ fiet in-

constanti ventos et vndici. Si vo aliquā stellā errā incluserit orbis imbrē sicut et i signo cācri et stelle pue aselli appellate exiguū inter illas spaciū obtinētes nubeculā quā psepia appellāt hoc cū i celo sereno apparere desierit atrox hyems sequet. Si in alterā illarū aglonia caligo abstulerit auster zenith: si austrinā aglo. Itē cū repente etc. hoc in libro de psagijs tēpestatū etc. Capitulū. 8. De pnosticatiōe ventoꝝ p cometas.

Item stelle comate significāt siccitatē et vētos et qd inde accidet erit fm multitudinē harū rerū. Itē comete cū eas circuit nigredo et tenebre signt siccitatē fortē et ventos in qua pte apparuerint et ē duratio fm quātitatē luis tenebre: et si fuerit de ptib9 oppositis sigt vētos et pluuiā et nubis cū tonitruis et fulgure et cū fuerit in estate sigt pluuiā. siliter et i hyeme. ¶ Itē cursus stellaꝝ ex vno angulo sigt ventoꝝ cursū a pte illa et si cucurrerēt ex angulis diuersis significāt vētos iordiatos. Et de qttuor angul' signt diuersū aerē hyemalē ita q pueniet ad tonitrua et lampades et silia etc. Itē stelle comate etc. hoc a Ptolemeo ex. 13°. ca°. 2' ptis qdriptiti. fm haly comete fiūt oēs de fumo sicco et si apparuerint nebulose signat vētos multos et siccitatē aeris fm eaꝝ magnitudinē et durabit fz eaꝝ duratio nē. Itē comete etc. hoc Alkind9 i fine ca' qnti. Itē cursus stellarū etc. hoc Ptoleme9 in. 13°. ca° 2' ptis qdriptiti. Sciēdū fm haly q anguli sicut sūt inter septētrionē et occidēs et sic de alijs ut supra etc. Capitulū nonū.

Itē celū cū eqliter splendidū erit tūc i articulis tēpoꝝ que ppsuim9 autūnū serenū psagabit frigiduz. Item si ver et estas nō sine refrigerio aliq trāsierit in autūnū serenū ac densū minusq ventosū faciēt. autūni vo serenitatē ventosam hyemē facit. Itē celū etc. hoc in libro de psagijs Autūnū serenū etc. Itē si ver etc. hoc ibi supra.

Capitulū decimū De pnosticatione ventoꝝ p tonitrua.

Item si i signis hyemalib9 audiant tonitrua sicut in capricorno uel aquario tūc i initio veris et forte p totū annū plus vētabit q in alio āno. ¶ Itē cū in estate vehementi9 tonitruit q fulgurat ventos ex ea pte denūciat et eō si min9 tonuerit q fulgurat imbrē cū sereno celo fulgura erūt et tonitrua adhyemabit in hyeme acertissime: aut si ex oib9 qttuor ptib9 celi fulgurabit cū aglone tm̄ in posterū diē aquā ptēdit cū a septētrione ventū cū isestiuo tpe ab austro choro ul' fanonio serena fulgurauerit ventū et imbrē eisdē regionib9 demōstrat. Itē tonitrua matutina ventū signt imbrē meridianā. Itē si in signis hyemalib9 etc. Albert9 in cōpendio suo q incipit Passiōes etc. in ca°. Deinceps i fine

Itē cū in estate vehementi⁹ rc̄. hoc in libro de p̄sagijs tēpestatū vsq̧ huc Itē fm p̄nosticationē rc̄. Capl'm. 11. De diuersitate nubiū qd signt.

Tem cū nubes celo sereno in celū ferūť ex q̄cūq̧ pte illud fiet venti expectenť si in eodē loco globabunť appropinquante sole discutienť ⁊ hoc aqlone fiet vent⁹. Sz austro imbres p̄tendūt sole occidēte si ex vtraq̧ pte ei⁹ celū petēt tēpestatē sigbūt vehementi⁹ arcu ab oriēte in nocte aqua minať ab occidēte in posterū diē. Si nubes ⁊ vellera lane spargunť multo ab oriēte aquā in triduū p̄sagiūt: cū in cacuminibus montiū nubes ascenderint adhyemabit. Si hec cacumina pura fuerint asseuerabit. Itē nube grauida candidante q̄ vocāt albā grando iminebit celo q̄uis sereno nubila q̄uis pua p̄cellosū dabit: nebule aut mōtibus descendētes aut celo cadētes uel in vallib⁹ sedētes serenitatē p̄mittūt. Itē cū nubes celo sereno rc̄. hoc etiā ibi supra. Sciendū fm Ptolemeū in. 13°. ca° 2ᵉ ptis q̄driptiti q̄ nubes q̄ assimilanť floccis lane significant aliq̄n aerē hyemalē. Capitulū duodecimū.

Tem fm p̄nosticationē rusticoꝝ q̄n in hyeme remittiť frig⁹ expectanť niues nisi sūt nnbes obscure. Aliud aūt signū ē ⁊ verius vapor niuis future lucid⁹ est ⁊ pallid⁹ ⁊ videť mult⁹ ⁊ hoc est signū caritatis sue. Itē q̄nq̧ stat in aere diu sicut p. 8. dies ⁊ hoc est signū caloris. Itē fm p̄nosticationē rc̄. hoc fm Albertū ca°. illo Nix autē rc̄. Capl'm. 13. De p̄nosticatiōe ventoꝝ p diuersa signalia vulgi.

Tem tēpestuosa pluuia sp est i vento p̄cedente. Itē venti fortes fiūt p̄cipue in autūnis. Itē tēpus flati aqlonis plus i vere ⁊ minus in autūno. Itē incensū frig⁹ ⁊ imensus calor sūt cā abscisionis ventoꝝ ⁊ pluuia sequēs est etiā causa abscisiōis eorū ⁊ hoc est fm qd. Itē an̄ tonitrua sunt venti validi ⁊ fortes. Itē tēpestuosa pluuia rc̄. hoc Albert⁹ in ca° qd incipit In vtrisq̧ aut rc̄. Itē hoc supius scribebať. s. cū ventis ⁊ si placet sit vacuatio ventoꝝ fm Albertū in ca°. Dico aūt ventos. Itē intensū frig⁹ rc̄. Albert⁹ in ca°. Dico aūt ventos. Itē ante tonitrua rc̄. Albert⁹ ca°. Deinceps nr̄a rc̄. Ca. 14. De grādinis sigtiōe.



Uando i vere uel autūno grando de celo ceciderit: tunc p̄iculū iminet frugib⁹ dire gelideq̧ pruine ⁊ hoc raro falliť nisi sol p⁹ grandinē calidior aerē terramq̧ lustrauerit: grādo si media estate ceciderit circa solstitiuz estiuale signū est in supiori aeris regiōe frig⁹ esse p maximū. Pars inferior aeris calefacta solis radijs liquefacēt grandinē descendentē in imensa quātitate molas faceret menstruosas. Itē q̄n in vere rc̄. Albertus in ca°. grandines rc̄. Caplm. 15. De p̄nosticatiōe

aure p circulum celi siue iridē.

Tem arcus i diuersis tpib⁹ diuersa sigt in meridiē eni ortus magnā vim aquaꝝ mōstrat. Si vo circa occasū fuserit tonabit ⁊ leuiter pluet. Si ab oriēte uel circa surrexerit pmittit serenitatē. Itē arcus si apparuerit cū aere hyemali signat serenū ⁊ cō. Et colores etiā ɔsiderādi sūt sicut dictū ē pri⁹. Itē arc⁹ duplices pluuias nunciāt, a pluuijs serenitatē. Itē arcus in diuersis tpib⁹ ⁊c̃. Albert⁹ in ca° Restat vidē causas ⁊c̃. Itē arcus si apparuerit. hoc Ptoleme⁹ in vltimo ca° 2ᵉ ptis q̃dripititi. ¶ Sciendū ſm haly ꝙ cā hui⁹ est q2 in tpe sereno mōstrat additamentū fumositatis aquose: ⁊ in hyemalib⁹ sigt minutionez ⁊ ppter hoc sigt serenū. Item arcus duplices ⁊c̃.

Caplm. 16. Pronosticatio aure p colores nubiū.

Tem q̃druplex est nubes ɔtinēs ut frequenter forte tonitruū. s. nigra rubea viridis uel alba aliquantuluz nigra ⁊ spissa dat forte tonitruū specialit̃ si vapor intrinsecus sit mult⁹ ⁊ spissus. rubescēs aūt ex nigro ē nubes valde spissa de se ʒ vapor ignit⁹ iā resultat p ipsā ⁊ iō illa fortiorē frequēter dat ictū q̃ȝ nigra: virēs aūt cū nigro ⁊ rubore puo est pessima oīuȝ nubiū ⁊ timēda si directe sit circa ciuitatē aliquā ⁊ sigt ꝙ frequēter emittit fulmina magnoꝝ lapidū q deijciūt turres ⁊ edificia incendūt ⁊ hoīes. Albā aūt nō oȝ timere si enī fulmina cadāt sup edificia statim extinguūt̃ anq̃ȝ tangant ea nisi sint valde sicca ⁊ cremabilia. Itē colores coruscatiōis ut plurimū sūt videlicet rube⁹ clar⁹ ⁊ albus flāmeus ⁊ ruffus q̃ niuosus. prim⁹ timend⁹ q2 incedit. 2° spargit se ⁊ nō ledit nisi facile cremabilia. 3⁹ autē penetrabilis ē ⁊ talis frequēter scindit sil' ⁊ incēdit. Itē q̃druplex ⁊c̃. Albert⁹ in ca° Deinceps. Item colores ⁊c̃. ipse idem.

Capitulū. 17.

Tem signa antecedētia terremotū sūt frig⁹ ex vapore frigido ⁊ sonus ex motu subterraneo. sequētia aūt sunt caligo ⁊ tenebre circa solē ⁊ stellas p̃ter dispositionē nubiū. Itē signa ⁊c̃. Albertus in ca° terremot⁹ in fine.

Caplm. 18. De pnosticatiōe aure ex igne.

Tem ignes terreni pallidi ⁊ murmurātes tēpestatū nūcij sequūtur pluuie. Iā luceri⁹ fungi si flexu sese volitet flāma ventū ⁊ lumina cū sese flāmas elidūt aut vix accendit̃. Itē cū pendēte scintille coeternant̃ uel cū tollentib⁹ ollas carbo adheret aut cū cōtent⁹ est fauillā discutit scintillā ve emittit uel cū cinis in foco concrescit ⁊ carbo vehement̃ plucet ventoꝝ ⁊ aquaꝝ ē signo. Itē ignes ⁊c̃. hoc totū in libro de p̄sagijs ⁊c̃.

Caplm. 19. De pnosticatiōe aure ex mare.

Itē mare si trāquillū i portu cursitabit murmurabitve int̄ se ven tū p̄dicit si illud in hyeme imbrē littoraqꝫ ripe resonabūt tranquille asperā tēpestatē. Itē ipsi⁹ maris trāquill⁹ sonit⁹ spume dispersio aut aq̄ bullātes pulmōes re marini in pelago plurimorū dierū hyemē ptendūt sepe sil ētio intumescit inflatūqꝫ alteri⁹ solito iam intra se ventos eē fatet̄ ꝛ etiā quidā son⁹ montiū nemorūqꝫ mugit⁹ mutationes aure p̄tendūt arborū siue aura q̄ sentient̄ folia ludētia. Lanugo ppl'i aut spine volitās aquisqꝫ pluuie inatantes aut in cāpanis venturā tēpestatē p̄cedēs suus fragor celi ꝛ murmur nō dubiā significationē hn̄t. Itē mare ꝛc̄. in eodē libro p̄sagijs ꝛc̄. Capl'm. 20.

Item delphin trāquillo luligo volitās conche adherētes echini astringētes sese aut aerena subintrātes tēpestatis sūt signa. Rane q̄ꝫ vltra sonitū vocale ꝛ fulices matutino clangore. Itē mergia anates q̄ꝫ pluuias rostro purgātes ventū. Cetereqꝫ aquatice aues cōcursātes: grues i mediterraneo festinātes mergiqꝫ uel camelma ria aut stagna fugiētes: grues silētio p sublime volantes serenitatē sicut noctua in imbre garrula uel sereno tēpestatē: coruiqꝫ singultu quodam latrtanes seseqꝫ etiam cōcutientes si cōtumabūt. Si v̄o carptim vocem resoluebāt ventosū imbrē: gratuli sero a pabulo hyeme ꝛ albe aues cōgratulant̄: ꝛ cū terrestres volucres cōtra aquā clangorē dabūt p̄sidētes sese hyemē, sꝫ maxime cornix ꝛ hyrūdo cū iuxta aq̄s volitāt ut pēna se pe pcutiant quecūqꝫ in arborib⁹ habitāt fugitās in nidis suis ꝛ anseres cōtinuo clangore intēpestini idē. Ardea in medijs arenis tristis: nec mirū aquaticos volucres intantū p̄sagia sentire aeris ꝛ aque cum sint fere eiusdē complexionis. Item delphin ꝛc̄. vbi supra ꝛc̄.

¶ Item pecora exultantia ꝛ indecora lasciuia ludētia easdē significationes hn̄t: echones celū olefecrantes seqꝫ lambētes contra pilū turpes quoqꝫ porci Alcenos sibi manipulos feni laterātes segniterne etiā circa industriā ab aut formice cōcursantes aut oua p̄ferētes. Itē vermes terreni erūpentes trifoliū inhorrescere ꝛ foliū contra tēpestatem subrigere certū est: necnō in cibis ꝛ mensis nostris vasa quedaꝫ extulentiū addit̄ sudorē sup positorijs relinquētia duras tēpestates p̄nūciant. Itē cū sole ꝛ cordis ꝛ ptib⁹ corpis multis in sensib⁹ infinita p̄sagia apparebūt. Itē pecora ꝛc̄. In eodem libro vsqꝫ ad finē.

Repertoriū de mutatione aeris Finit.

Hyppocratis libellus de medicorū astrologia incipit: a Petro de abbano in latinū traductus.



Um legerē libros hyppocratis medicoꝝ optimi: iueni hūc ꝑuū ſʒ magne vtilitatꝫ librū: ⁊ valde neceſſe ē oib⁹ medicis. Qui hūc bñ ſcierit ſanitatē mortē uel vitā īfirmitatꝫ poterit ꝑnūciare. Jubet ꝗ hyppocras ut medic⁹ aſpiciat lunā qꝛ qñ plena eſt luīe: tūc creſcit ſanguis in hoīe ⁊ i oib⁹ aīalib⁹: ⁊ i mari ⁊ in cūctis reb⁹ mūdanis eoꝝ creſcit cōplexio. Qñ igit̄ infirm⁹ occūbit oꝫ lunā iſpicē. Nā ſi exeat a ꝯiūctiōe tūc creſcit egritudo ꝗuſqꝫ veniat ad graduꝫ oppoſitiōis. Et qñ fuerit i oppōe vide ſi ſit cū mal' planetꝫ: aut i loco malo. aut ſi aſpexerit dñm dom⁹ mortis: ⁊ ꝑ hoc poteris ſcire ſi īfirm⁹ mori debeat uel nō: uel ſi hēbit magnā īfirmitatē uel curā.

Signū arietis.

NUnc videam⁹ nām oiuꝫ ſignoꝝ iuxta principiū lune. Cū cuiqꝫ infirmitas accidat: ⁊ luna ſit i ariete cū ♂ aut cū ſole erit egritudo i capite ꝑpter nimiā caliditatē ☉. Et dolebit ei⁹ pulſ⁹ capitis. Habebit qꝫ febres calidas: ⁊ nō recedet ab eo caliditas. Patiet̄ qꝫ anxietatē: ⁊ vix loquet̄. In pectore qꝫ patiet̄ nimiuꝫ calorē: ⁊ dolorē patiet̄ i pulmōe: ⁊ hēbit vehemētiſſimū pulſū. Neceſſe erit ei minuere ſanguinē devena cordis: ⁊ vti reb⁹ frigidis: ⁊ cibo ⁊ potu minuētib⁹ calorē: ⁊ hec egritudo deueniet i freneſi. Et ſi in eo fuerit ſaturn⁹ aut ♂ morief ex hac egritudie infra tres dies a die ꝗ fuerit. ☽. cū. ☉. ꝑ ꝗrtū aſpectū: ⁊ plus ē ⁊ hoc ſi. ☽. addat ſuo lumini. Si. ☽. fuerit in ariete ⁊ eā aſpexerit īfortuna ex. 4ª ul' oppōe. Si fuerit ſol erit hec egritudo i capite: ⁊ iſta egritudo ducet eū extra vitatē ⁊ inſaniet: ⁊ nūc creſcit: nūc minuit̄ egritudo. Et ē ſilis illi q vidē nō pōt. Qui aūt neſcit aſtronomiā nō poterit ſcire ei⁹ egritudinē. Et ſi fuerit i diminutiōe ſui luīs: aut i diminutiōe graduū qñ reuertit̄ ad primū aſpectū ſaturni qñ eū dimiſit ⁊ ꝑ aliū aſpectū eū aſpexerit terminat̄ īfirmitas ſiue i bono ſiue i malo. Qđ ſi aſpexerit infortunā morief. Nota ꝙ. ☽. ⁊ dñs aſcendētis fortiſſime opant̄: ⁊ iō ſꝑ qđ ꝑmo aſpiciat̄ a iudicib⁹ loc⁹ ☽ ⁊ aſpect⁹ ei⁹: deiñ dñs aſcēdētꝫ: Sꝫ meliorabit̄ ſi non aſpexerit. Et qñ iuenit. ♃. aut. ♀. ꝑ aliquē aſpectū añqꝫ veniat ad ꝯiūctionē: erit infirmitas ex aliꝗ flegmate albo: ꝗ infirm⁹ primo ſentit grauedinē. Si. ☽. fuerit addēs ſuo lumini ⁊ gradib⁹ ⁊ fuerit ſol ⁊. ♂. i ariete erit infirmitas i capite ex flegmate albo: ⁊ exiet ſanguis de narib⁹: ⁊ oportebit eū vti frigidis ⁊ erit ei op⁹ facē medicinā vnde apoſtema maturet̄. Et ſi fuerit. ☽. cū. ♀. i loco. ☉. euadet infirm⁹ ſʒ pri⁹ habebit magnū ꝑiculū: iō mercuri⁹ ꝯcordat ſe cū. ♂. in vno negocio: ſʒ mās nō facit ſic cū ſaturno. ⁊ morief cū ſaturn⁹ erit in loco. ☉. Si fuerit iuppiter ibidē cū ea uel mercuri⁹ uel. ♀. hēbit infirmitatē diuerſā Si aūt aſpexerit eū. ☉. uel. ♂. in aliꝗ aſpectu op⁹ eſt ut des ei aliquam

leuē medicinā ꝛ leuē dietā: ꝛ qñqꝫ sedeat qñqꝫ se moueat ꝛ voluat: ꝛ fac eū sedere i aliq̄ loco vbi possit ꝑ totū vidē ꝛ balneo vtaꝛ: ꝛ sedeat plane vbiqꝫ ꝛ sicut velit: ꝛ da ei aquā bibere frigidā. Tauri.

CUm incidit ifirmitas ꝛ. ☽ .sit i tauro ꝛ aspiciat eā. ♂ ex. 4°. ista infirmitas ē ex sanguie: ꝛ sentit calorē ꝛ siccitatē ꝛ dolorē i nocte: ꝛ nō pōt dormire ꝛ hꝫ volūtatē bibendi vinū ꝛ res calidas Necessariū est ei minuere sanguinē: ꝛ dare medicinā q̄ reddat eū frigidū ꝛ humidū. Sꝫ si fuerit i ipso saturnꝰ cū. ☽ .aut venerit ad euꝫ ꝛ nō iuenerit fortunā morieꝛ vsqꝫ ad decem dies qñ cepit eū ifirmitas. Primo si fuerit. ☽ .addēs sui luie ꝛ gradibꝰ: ꝛ asperit eā. ♂ .ex. 7°. ul'. 8°. ꝛ. ☽ .fuerit ad saꝛnū ꝛ. ☿ .cū ea fnerit: erit infirmitas hec ex flegmate: ꝛ erit debilis eger ꝛ diruptꝰ ꝛ vix poterit loq: ꝛ erit stomachꝰ indigestus: ꝛ nō poterit digerē cibaria ꝛ intus hēbit calorē. Et necesse ē ei medicina laxatiua. Et cū. ☾ .ꝯuenerit ad oppositū locū ifirmabiꝛ graueꝛ ꝛ morieꝛ nisi fuerit. ☽ .fortunata: ꝛ sic euadet vsqꝫ ad. 4. dies. Qñ aliqs ifirmabiꝛ si luna fuerit in tauro ꝛ. ♂ . ꝛ. ☉ . cū ea infirmitas erit i pectore ꝛ maxie de nocte: ꝛ erit ei lingua cōbusta pre nimio calore quē patieꝛ in ore ꝛ i oculis: ꝛ hēbit fluxū ventris ꝛ multū sitiens: ꝛ erit balbutiēs. Et necesse ē ei medicina cōstrictiua ꝛ sanguis minutio: ꝛ dieta eiꝰ sit frigida: ꝛ a calidis caueat. Et qñ luna fuerit in trino aspectu ad. ☉. si minuiꝛ egritudo euadet: ꝛ si augmentabiꝛ morieꝛ. Qñ fuerit in oppōe solis si iuenerit iouem nō morieꝛ. Et si est infortunata morieꝛ. Geminorū.

SI luna fuerit i geminis cū aliqs icipit infirmari ꝛ fuerit in. 4°. aspectu saꝛni uel oppōe erit ifirmitas illa ex tristicia: uel quia amisit de rebꝰ uel qꝛ habuit nimiā cogitationeꝫ de aliq̄ negocio. Febris ,erit efimera uel putrida: ꝛ dolebit ꝑ totuꝫ corpꝰ: ꝛ patieꝛ magnū intus ꝛ in epate dolorē hēbit hec infirmitas ꝑ decē dies. Cū fuerit. ☽ .in geminis augēs numero ꝛ luie: ꝛ asperit eā mars. 8°. ul' 7°. erit infirmitas febris ex colera rubea: ꝛ pulsus velox flebotometur: ꝛ dieta eiꝰ sit frigida. Et si fuerit luna ipedita a saꝛno ꝛ infortunata cū eo morieꝛ qñ ꝯuenerit luna ad oppositū loci i q̄ erat qñ incepit infirmari. Si fuerit fortunata euadet pꝰ diuturnā infirmitatē. Si aūt fuerit. ☽ .in geminis erit infirmitas ex humidate. Et si fuerit saturnꝰ cū ea erit i capite ꝛ nō minuaꝛ: ꝛ caue ne vtaꝛ frigidis ꝛ humidis sꝫ vtaꝛ tꝑatis. Et cū ꝯuenerit. ☽ .ad oppositū. ☉ . ꝛ fuerit cū fortunis euadet si nō morieꝛ. Si asperit eā fortuna ex bono aspectu viuet: sꝫ mutabiꝛ i aliā egritudinē sꝫ qñ dimiserit istā formā q̊usqꝫ venerit i aliā oppositionē loci in q̄ erat: erit inf.rmitas occulta ꝛ difficilis ad cognoscēdū donec ꝑueniat. ☽ .ad quartū aspectū uel oppositū: ꝛ si fuerit cū fortuna euadet ꝛ ecōuerso. Si

aũt fuerit mars ⁊. ☉ .⁊. ☽ .i geminis patieť infirmitatē magnā ex calore ⁊ lachrimabit ei⁹ vnus ocul⁹ ⁊ forsan fiet frenetic⁹: ⁊ multũ timebit: ⁊ añ eũ apparebũt diuerse figure: ⁊ pulsus ei⁹ vix ĩuenieť: ⁊ pulsus capitis dolebit ei. Caue igiť ne minuas eũ: ⁊ da ei leuē dietā: ⁊ paruz sit in loco tpato: ⁊ cũ puenerit ad q̃rtũ aspectũ morieť infirm⁹ si fuerit luna in fortuna. Si aũt fortuna euadet. Caue g̃ ne des ei farmatiā sz vtať leui dieta in balneo.

Cancri

SI fuerit. ☽ .i cancro qñ alicui infirmitas accidit ⁊ aspexerit eā saturn⁹ ex. 4º. uel. ?º aspectu accidit ei frig⁹ post calorem sicut in exitu balnei ⁊ nõ sentit dolorē: doletq̃ ei pect⁹ ⁊ hẽbit tussim ⁊ paruũ calorē. pulsus q̃z nõ ĩuenieť nisi mediocris: ei dolēt lũbi: ⁊ opus ē ei medicina ad pect⁹ purgandũ ⁊ tussim exprimendā. Si võ nõ fuerit cũ luna aliq̃ fortuna: nec aspexerit eaz fortuna donec pueniat ad. 4. aspectũ uel ad oppositũ loci in q̃ incepit ĩfirmitas morieť ĩfra. 10. dies. Si aũt aspexerit eā viuet uľ multũ grauabiť. Si aũt aspexerit eam mars ex. 4º. uel opposito fiğt vomitũ ⁊ eructationē ⁊ malā dispositionez stomachi. Deť ei frigida: ⁊ medicina stomachi restrictiua. Et si nõ aspexerit eā fortuna morieť añq̃ pueniat ad q̃rtũ aspectũ. Si aũt fuerit vacua curs⁹ ĩfirmitas ei⁹ erit ex repletiõe ⁊ ex nimio potu ex q̃ vene sũt nimis plene. hz volũtatē sedēdi i altũ: ⁊ discoopit: ⁊ loquētē vult audire: ⁊ irasciť cito ⁊ grauiť se hz i nocte. vtať reb⁹ tpatis: qñ veniet ad oppositũz euadet. Si aspexerit. ☽ .fortuna. sz si nõ ⁊ fuerit in aspectu marti uel. ☉ . absq̃ auxilio fortũa℞ recadet: ⁊ cadet i acutā febrē ⁊ puls⁹ ei⁹ repieť vno mõ. In p̃ncipio eni minutio ē necessaria. Si aũt ad. 45. grad⁹ fuerit aspect⁹ fortuna℞ alleuiať: ⁊ eo⁹. uel ad. 90. uel ad. 180. ⁊ magis affligit eũ ĩfirmitas i nocte q̃ i die: ⁊ parũ q̃escit ⁊ clamat ⁊ anxiať. Si fuerit fortuna i oppõe euadet: ⁊ si ĩfortũa mutať i aliaz egritudinē ⁊ recadit. Et si debet euadē euadet qñ. ☽ .venerit ad locũ i q̃ fuit i initio ĩfirmitatis. Et si fuerit tũc fortunata euadet ⁊ eo⁹. Si aũt. ♃ .⁊ satn⁹ fuerit cũ ea i. 3ª erit morbus ꝯposit⁹ ex hũorib⁹ frigidis ⁊ ťminabiť i die. 4. Si aũt. ☽ .fuerit i cãcro ⁊ satn⁹ ⁊ mars ⁊. ♀ .fuerit cũ ea ĩfirmitas actiõe uel deblitate. Da ei res ꝯfortatiuas cũ puenerit ad. 4. aspectũ uel oppositũ: ⁊ si fuerit fortũata euadet ⁊ eo⁹. siliť i oppõe. Sz si fuerit ĩfortunata tũc determinať. Et si fuerit ei fortuniũ euadet cũ. ☽ .venerit ad locũ i q̃ ĩcepit ĩfirmitas.

Leonis

CUm fuerit luna i leõe ⁊ aspiciat eā. s. ex. 4º. uel oppõ erit infirmitas ex humoribus corruptis uel flegmate vitreo: ⁊ malā habebit dispositionē stomachi. vnde nocet ⁊ sentiet dolorem capitis: ⁊ erit calor interius fortis: ⁊ exterius frigiditas ⁊ erit nimiũ constipatus: ⁊ erit infirmitas longa. Et cum luna puenerit ad q̃rtũ aspectũ: ⁊ si nõ aspexerit eā morieť uel augmẽtabiť ĩfirmitas: et

si fuerit fortuna euadet. Si fuerit. ☽ in leone ⁊ aspexerit eã mars i q̃rto aspectu uel oppositiõe erit ĩfirmitas ex abũdãtia sanguis ⁊ collere: ⁊ febris tertiane uel acute. Et si aspexerit eã fortuna euadet p⁹magnã infirmitatẽ: ⁊ magnã fatigationẽ. Et male morieť qñ puenerit ad oppositionẽ leonis. silr̃ ĩn. 4°. aspectu. Luna vo i leone in. 4°. aspectu. ☉ .uel mart eristẽte. hẽbit magnũ calorẽ in pectore: ⁊ extrema ei⁹ frigescent: ⁊ hẽbit dolorẽ capitis. Opus ẽ ei minutio si põt qñ luna ẽ in illo signo. Sꝫ si in illo signo nõ põt minuere dimittat donec venerit in medietate sui luis. Unge sibi pedes vnctiõe q̃ tollat sibi frigiditatẽ. Si aũt. ♂ .uel. ☉ .fuerit cũ ea in. 4°. erit ĩfirmitas ex calore cordis: ⁊ qñ puenerit ad. 4. aspectũ si fuerit fortuna euadet: si infortuna morieť: uel recidiuabit ulr̃ mutabiť in aliã infirmitatẽ. Qñ vo. ☽ .recedit de vno loco de locis q̃ diximꝰ ⁊ in uenerit iouẽ i itinere aut. ♀ .añq̃ꝫ veniat ad. 4. aspectũ op⁹ est cõponere balneũ: ⁊ i alto loco sedẽ. Sꝫ si ĩpediat eã saturn⁹ impedit renes ⁊ vesicã Si aũt fuerit mercuri⁹ in. 4°. cũ illis sigt̃ turbationẽ sensus ⁊ infirmitateꝫ aie. Cũ puenerit. ☽ .ad. 4. aspectũ si allenieť infirmitas euadet: si augeť morieť. Silr̃ ĩn oppõe ⁊ in. 4°. aspectu ⁊ i eodẽ signo.

Uirginis.

SI. ☽ .fuerit i ṽgine ⁊ saturn⁹ aspexerit ex. 4°. uel oppõe in initio ĩfirmitat: patieť i stomacho ⁊ i vẽtre ⁊ i intestinis ⁊ hẽbit apostema merc̃. ⁊ erit ĩfirmitas occulta q vix poterit q̃spiã eã cognoscere nisi sit astronom⁹. Utať reb⁹ frigidis ⁊ tpatis ⁊ op⁹ ẽ ei ut sanet apostema: ita q nõ apiať ista ĩfirmitas futura ⁊ longa. Si vo fortuna eã aspexerit euadet p⁹ multos dies. Si ĩfortuna morieť ĩfra. 40 dies. Cũ. ☽ .fuerit ĩ. 5°. ⁊ aspexerit eã mars ex. 4°. uel oppõe erit ĩfirmitas cũ magno calore interi⁹ ex abũdautia colere: ut sũt disinterie uel fluxus vẽtris: ⁊ flux⁹ ẽ ei fortis: ⁊ qñq̃ꝫ nõ inueniť anxietatẽ magnã patiť. hẽbit etiã malũ stomachũ. Est g̃ ei necessaria medicina stiptica ↄfortãs: vtať q̃ꝫ reb⁹ leuib⁹. Deť q̃ꝫ ei medicina leuis. Si aũt aspexerit eã fortuna euadet ĩfra. 3. dies: si ĩfortuna morieť. Cũ fuerit. ☽ .cursu vacua sigt̃ fluxuꝫ vẽtris ⁊ diarie ⁊ lieterie: ⁊ ĩpedimẽtũ vesice uel strãguiria ⁊c̃. Si ãt fuerit cũ ea. ♂ .uel. ☉ .uel. ♃ .tũc erit ĩfirmitas acutior ⁊ fortior cũ ptubatiõe sens⁹ ⁊ vix loqueť. Op⁹ est ei medicina q̃ paulati fluxũ vẽtris restringat. Cũ ãt puenerit ad. 4. aspectũ uel oppositũ liberabiť p auxiliũ fortunaꝝ: ⁊ g̃uabiť uel morieť p ĩpedimẽtũ maloꝝ. Si aũt saturn⁹ ⁊. ♀ .⁊. ☿ fuerint cũ ea i initio ĩfirmitatis erit ĩfirmitas ⁊ durabit donec iterũ reuertať ad virginẽ uel ad. 4. aspectũ ei⁹.

Libre.

SI. ☽ .fuerit i libra: ⁊ aspexerit eã satn⁹ ex. 4°. uel oppõe erit ĩfirmitas in capite ⁊ in pectore et pulmone. Et est maior infirmitas si fuerit luna decrescens: et dolebit ei⁹ frons et tempora: et erit ex repletione: et sternutabit multuꝫ: habebit q̃ꝫ febres leues. Opus

est ei medicina tẽperata: ⁊ cibo ⁊ poto leui vtat̃. Si autẽ aspexerit eam mars ex malo espectu moriet̃: ⁊ si nõ: viuet. Et cũ puenerit ad q̃rtũ aspectũ liberabit̃ p aspectũ fortunarũ ⁊ p aspectũ malorũ grauabit̃ uel moriet̃. Si aũt aspexerit eã mars ex. 4ᵒ uel oppositiõe: erit infirmitas ex sanguie: ut aposteã uel pleuresis ul' piplemoniã: ⁊ habebit magnas febres ⁊ pulsus erũt vehemẽtes: ⁊ in nocte videt pessimas visiões. Est eni ei necessaria minutio sanguis: ⁊ est ei opus medicina leuis: ⁊ calor parũ vehemens: ⁊ vigilie ⁊ turbatio mentis. ⁊ si nõ aspexerit fortuna moriet̃ infra. 20. dies. Si autẽ aspexerit fortuna euadet cũ puenit luna ad oppositionẽ sui loci. Cũ autẽ fuerit in cursu vacua habebit dolorẽ in pedibus ⁊ dolorẽ interius: ⁊ oculos graues: ⁊ balbutiet cũ loquit̃. Erit ei medicina necessaria ⁊ dieta frigida ⁊ humida: ⁊ minutio sanguis. Cũ autẽ puenerit ad q̃rtũ aspectũ uel oppositũ liberabit̃ p fortunas: ⁊ aggrauabitur p mala. Si aũt mars ⁊ sol eã aspexerit ex oppositiõe hec infirmitas erit valde magna: ⁊ grauabit̃ magis in capite. Et si fuerit mercuriꝰ in. 6. lachrymabũt sibi oculi: ⁊ patiet̃ dolorẽ in capite. Et medicina laxatiua ẽ ei necessaria. Cũ autẽ puenerit ad iouẽ uel venerẽ in diebꝰ creticis alleuiabit̃ ⁊ euadet: alioquin grauabit̃ ⁊ moriet̃.

Scorpionis.

SI luna fuerit in scorpione ⁊ aspexerit eã saturnꝰ ex. 4. uel oppositiõe erit infirmitas ex sanguie putrefacto ⁊ de veneno. Et si nõ fuerit luna i diminutiõe luminis ⁊ aspexerit eã infortuna moriet̃. Et si fuerit crescẽs in suo lumine ⁊ gradibꝰ ⁊ fortuna aspexerit eã viuet. Cũ autẽ luna fuerit in. 7º. ⁊ mars cũ ea ⁊ iupiter aspexerit eã ex. 4. habebit febrẽ validã. vnde necessaria ẽ ei medicina laxatiua tpata. Et cũ puenerit luna ad cõiunctionẽ iouis euadet. Cũ aũt fuerit luna in cursu vacua erit infirmitas leuis in pncipio ⁊ p nullo habebit: ⁊ augmẽtabit̃ ⁊ mutabit̃ in aliã egritudinẽ ut ipedimentũ vesice ⁊ iliorũ ⁊ hemoroidarũ: ⁊ nascent̃ ei pustule i naribꝰ. Cũ aũt lũa puenerit ad tertiũ aspectũ patiet̃ febrẽ calidã: ⁊ cũ puenerit ad solẽ si nõ obuiabit̃ ei fortuna moriet̃. Si aũt cõtulerit ei fortuna nascet̃ ei apostema i ipocũdrijs ⁊ liberabit̃. Cũ fuerit luna i scorpiõe ⁊ mars cũ ea aut saturnꝰ. primo habebit infirmus febres calidas ex flegmate salso: fac ut in die vadat ad sellã: ⁊ non minuas ei sanguinẽ. Circa eũ ut decet cũ diebꝰ creticis. Si aspexerit eã fortuna erit crisis ad bonũ ⁊ ecõuerso. Si aũt in. 4º. uel. 7º. uel. 10º. fuerit fortuna liberabit̃.

Sagictarij.

CUm fuerit luna in sagictario ⁊ aspexerit eã saturnꝰ ex. 4º. uel. 7º. erit infirmitas ex flegmate: ⁊ hꝫ calorẽ in toto corpe: sꝫ pedes erũt ei frigidi. Durabit hec ifirmitas vsq3 dũ luna iũgat̃ satur

no nisi aspexerit eam fortuna: qꝛ si aspexerit durabit vsqꝫ qꝺ veniat ad oppositū loci in quo fuerat. Cū vo luna fuerit in. 8º. ꝛ aspexerit eā mars ex. 4º. aspectu uel opposito: ꝛ fuerit aucta lumine ꝛ numero erit hec infirmitas occulta: ꝛ medicus eā scire nō poterit ꝛ dolebit ei caput: ꝛ totum corpus: ꝛ ita accidit ei: qꝛ multum fuit in balneo: ꝛ nimiū se calefecit: ꝛ nimiū introiuit in pectus suū ꝛ in caput ꝛ alijs multuꝫ voluit ꝛ afellat. Opus ē ei medicina cōstipatiua. Utat̄ syrupi ꝛ leuibꝰ preacetosis: ꝛ vomet ꝛ patiet̄ fluxū nisi fortune aspexerint ipsā in. 4º. uel. 7º. uel. 10º. uel. 11º. ꝛ. 24. die euadet. Si infortuna moriet̄. Cū autē luna fuerit in. 8º cū ioue ꝛ venere erit infirmitas ex reumate: ꝛ patiet̄ sitim ꝛ dolorem pectoris: ꝛ euadet cū venerit ad q̄rtū aspectū erit ei medicina mollificatiua necessaria. Caue ne balneat̄.

Capricorni.

Cum luna fuerit in capricorno ꝛ aspexerit eā saturnus ex 4º uel. 7º ꝛ fuerit decrescens gradibꝰ ꝛ lumine erit infirmitas ex nimia fatigatione sudorū: frigus post accepit euꝫ calor ē nimis clausꝰ ꝛ opillatus: ꝛ sternutat multū: frons ꝛ pectꝰ eius dolent. habet quoqꝫ febres ex sanguine. Utatur rebus temperatis ꝛ sirupo tēperato. Et si aspiciet eaꝫ fortuna euadet post longā egritudinē: ꝛ si non aspexerit moriet̄ vsqꝫ ad tres dies. Cū autē luna fuerit in nono ꝛ aspexerit eā mars ex. 4º. uel. 7º. significat abundantiā colere ꝛ malā digestionē stomachi: ꝛ dispositionē stomachi. Unde veniet ei vomitus: ꝛ fluxus ventris ꝛ disinteria: ꝛ ardebit ei stomachus: ꝛ inflāmabit̄ ꝛ habebit magnā febrē: ꝛ sudabit multum. Opus est ei medicina frigida: sꝫ pulsus nō inuenieṫ vniꝰ maneriei. Si aspiciant eā fortune euadet. Si nō morieṫ vsqꝫ. 15. dies. Cum fuerit sol cū marte ꝛ aspexerit eā cū luna augebit calorē ꝛ infirmitatē. Erit aūt hec infirmitas ex nimia fatigatiōe ꝛ calefactione ad ignē: ꝛ accepit euꝫ ex colera citrina: ꝛ ꝑ auxiliū fortunarū euadet: ꝛ ꝑ impedimentū malorū morieṫ. Caueas a balneo ꝛ sup̱ ipsū nō fundat̄ aqua frigida.

Aquarij.

Cum luna fuerit in aquario addens suo lumine ꝛ gradibus: ꝛ aspexerit eā. s. ex. 4º uel. 7º. infirmitas erit ex nimio labore: ꝛ perdet sanguinē: ꝛ hec infirmitas q̄nqꝫ crescet q̄nqꝫ minueṫ: ꝛ est timendū de eo ꝛ q̄n luna ꝑuenerit ad oppositionē si alleuiabit̄ viuet. Si augmētabit̄ viuet vsqꝫ ad. 42. dies. Et si fuerit cursu vacua erit infirmitas fortis in principio: ꝛ dolebit interius ꝛ erit infirmitas lōga. habebit quoqꝫ febrē calidā ꝛ multā patiet̄ anxietatē. Sꝫ q̄n lūa ꝑuenerit ad solē si aspiciēt eā fortune euadet: si mala: morieṫ. Aspice lunaꝫ q̄n

egredit̃ a sub radijs si inuenerit fortunã anteq̃ꝫ ꝑuenerit ad locũ in quo incepit infirmari euadet infirmus: si non: morieẽ. Cũ autẽ saturnus uel mercuri⁹ fuerit cũ ea in. 10. erit ĩfirmitas de colera nigra. Et si luna fuerit addens sui lumine ⁊ gradib⁹ euomet. Et si aspexerit eã fortuna añq̃ꝫ ꝑueniat ad oppositũ loci sui euadet.

Pisces.

Um luna fuerit in pisce addẽs in numero: ⁊ saturn⁹ aspexerit eam ex. 4°. uel. 7° erit infirmitas ex frigido: ⁊ patietur in capite ⁊ in ventre. Opus ẽ ei medicina calida. Si aspexerit eã fortuna euadet: sꝫ dolebũt ei mẽbra cũ luna fuerit in. 11. addens sui lumine ⁊ numero ⁊ mars aspexerit eã ex. 4° erit infirmitas ex nimia repletiõe sanguis ⁊ colere. Et opus est ei ut minuat̃ sangnis: ⁊ minorẽ dolorẽ habebit ĩ nocte q̃ꝫ in die: ꝙ si non aspexerit eam fortuna in loco in quo accepit eum infirmitas morieẽ. Et qñ ꝑuenerit luna ad locũ ĩ quo erat: si venus aut iupiter fuerit cum ea euadet: si autẽ fuerit mars cum ea erit infirmitas ex colera ⁊ sanguie: ⁊ ꝑ auxiliũ fortunarũ ad lunã liberabit̃: ⁊ ꝑ nocumentum malorũ morieẽ.

Hyppocratis libellus de medicorũ astrologia finit: a Petro de abbano in latinũ traduct⁹. Impressus est arte ac diligentia mira Erhardi Ratdolt de Augusta Imperante inclyto Johanne Mocenico duce Venetorũ: Anno salutifere incarnationis. 1485.

Venetijs


BIBLIOTECA
XV
NAZIONALE CENTRALE
FIRENZE

